

EXPLICITAREA RECURENȚELOR FUNDAMENTALE

Tutorial redactat de Silviu Boga, mail: silviumath@yahoo.com

Cuprins:

- Recurența telescopică aditivă
- Progresiile aritmetice
- Recurența telescopică multiplicativă
- Progresiile geometrice
- Recurența liniară neomogenă de ordin I, cu coeficienți variabili
- Recurența liniară neomogenă de ordin I, cu coeficienți constanți
- Recurența liniară omogenă de ordin II, cu coeficienți variabili
- Recurența liniară omogenă de ordin II, cu coeficienți constanți
- Recurența liniară neomogenă de ordin II, cu coeficienți constanți
- Recurențe liniare omogene de ordin superior, cu coeficienți constanți
- Recurențe liniare neomogene de ordin superior, cu coeficienți constanți
- Recurența omografică, cu coeficienți variabili
- Recurența omografică, cu coeficienți constanți

Notă:

- click pe titlul din cuprins pentru hyperlink spre fiecare recurență
- click pe numărul paginii pentru a reveni la cuprins

EXPLICITAREA RECURENȚELOR FUNDAMENTALE

La fiecare din recurențele următoare - fundamentale datorită prezenței lor în numeroase raționamente matematice – am prezentat, pe *cazul general* dar și pe un *exemplu*, procedura optimă de explicitare. Prin rezolvarea *temei de aprofundare*, cititorul interesat se va putea apoi rapid acomoda cu judecățile expuse.

1. Recurența telescopică aditivă

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + a_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} - \text{șir explicit dat} \end{cases}$$

Explicitare

Din relația de recurență, cum $x_{n+1} - x_n = a_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^*$, prin particularizare și sumare are loc supranumita *reducere telescopică* și explicitarea este astfel finalizată:

$$x_2 - x_1 = a_1$$

$$x_3 - x_2 = a_2$$

$$x_4 - x_3 = a_3$$

.....

$$x_{n-1} - x_{n-2} = a_{n-2}$$

$$x_n - x_{n-1} = a_{n-1}$$

$$\stackrel{(+)}{\Rightarrow} x_n - x_1 = \sum_{k=1}^{n-1} a_k \Rightarrow x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k$$

În aplicațiile curente suma iterată $\sum_{k=1}^{n-1} a_k$ se va constata de regulă calculabilă.

Se rețin formulele de calcul pentru principalele sume iterate, ele fiind deosebit de utile în procesele de explicitare ce vor urma:

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{(I)}$$

$$\sigma_2 = \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{(II)}$$

$$\sigma_3 = \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad \text{(III)}$$

$$\pi = \sum_{k=0}^n a^k = 1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \quad \text{(IV)}$$

La fel de utilă se va dovedi în acest sens și procedura de descompunere a fracțiilor raționale în supranumite sume de fracții simple (*metoda coeficienților nedeterminați*), care va facilita calculul unor sume iterate $\sum_{k=1}^n t_k$ cu termenul general,

$$t_k = \frac{f(k)}{g(k)}, \text{ fracții având } f(k) \text{ și } g(k) \text{ expresii polinomiale.}$$

Din această categorie de sume cel mai simplu de calculat sunt $\sum_{k=1}^n t_k$ cu

$$t_k = \frac{1}{(ak+b)(ak+a+b)}. \text{ În astfel de cazuri se va observa cu ușurință că identificarea}$$

$$\frac{1}{(ak+b)(ak+a+b)} = \frac{A}{ak+b} + \frac{B}{ak+a+b} \text{ conduce la descompunerea termenului}$$

$$\text{general sub forma } \frac{1}{(ak+b)(ak+a+b)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{ak+b} - \frac{1}{ak+a+b} \right).$$

De remarcat că aici descompunerea poate chiar ocoli metoda coeficienților nedeterminați, observând pur și simplu $\frac{1}{ak+b} - \frac{1}{ak+a+b} = \frac{a}{(ak+b)(ak+a+b)}$, deci

$$t_k = \frac{1}{(ak+b)(ak+a+b)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{ak+b} - \frac{1}{ak+a+b} \right).$$

Această exprimare a termenului general t_k , aplicată succesiv, va pune în evidență cunoscuta reducere telescopică prin care de altfel se va și finaliza calculul sumei, după cum ilustrează și următorul exemplu:

$$S_n = \frac{1}{7 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 15} + \frac{1}{15 \cdot 19} + \dots + \frac{1}{(4n+3) \cdot (4n+7)}$$

Soluție Se observă termen general $t_k = \frac{1}{(4k+3)(4k+7)}$, $k \in \overline{1; n}$, apoi

$$\frac{1}{4k+3} - \frac{1}{4k+7} = \frac{4}{(4k+3)(4k+7)} \Rightarrow t_k = \frac{1}{(4k+3)(4k+7)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4k+3} - \frac{1}{4k+7} \right) \text{ din}$$

care, prin particularizare și sumare, apare reducerea telescopică ce finalizează calculul,

$$t_1 = \frac{1}{7 \cdot 11} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{11} \right)$$

$$t_2 = \frac{1}{11 \cdot 15} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{15} \right)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$t_n = \frac{1}{(4n+3) \cdot (4n+7)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4n+3} - \frac{1}{4n+7} \right),$$

obținându-se la final

$$S_n = \sum_{k=1}^n t_k = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{15} \right) + \dots + \left(\frac{1}{4n+3} - \frac{1}{4n+7} \right) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{4n+7} \right) = \frac{n}{7(4n+7)}$$

Acestea fiind prezentate, revin la recurența telescopică aditivă, cu parcurgerea algoritmului de explicitare pe un caz concret.

Exemplu Explicitez șirul generat de recurența $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + n(n+1), & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$

Soluție $x_{n+1} - x_n = n(n+1), (\forall)n \in \mathbb{N}^*$ și astfel

$$x_2 - x_1 = 1 \cdot 2$$

$$x_3 - x_2 = 2 \cdot 3$$

$$x_4 - x_3 = 3 \cdot 4$$

.....

$$x_{n-1} - x_{n-2} = (n-2) \cdot (n-1)$$

$$x_n - x_{n-1} = (n-1) \cdot n$$

$$\stackrel{(+)}{\Rightarrow} x_n - x_1 = \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) \text{ și cum } x_1 = 1 \Rightarrow x_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1), \text{ sumă care este}$$

ușor calculabilă cu ajutorul formulelor sumelor remarcabile anterior prezentate,

$$\text{respectiv } x_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2}, \text{ etc.}$$

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + (2n+1), & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + n(n+1)(2n+1), & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{1}{n(n+1)}, & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{1}{4n^2-1}, & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{1}{n^2+5n+6}, & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{1}{4n^2+8n+3}, & (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

2. Progresiile aritmetice

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + r, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ r = \text{constantă dată numită rație} \end{cases}$$

Explicite Fiind recurență telescopică aditivă, prin raționamente analoge celor descrise anterior se va obține cunoscuta formulă $x_n = x_1 + (n-1) \cdot r$ ce determină direct termenul general al progresiei aritmetice în funcție de primul termen și rație. Prin intermediul acestei formule se vor deduce imediat și alte relații utile în aplicațiile referitoare la progresii aritmetice, dintre acestea remarcându-se $r = \frac{a_p - a_q}{p - q}$ și

$S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{n(x_1 + x_n)}{2}$. În ceea ce privește explicitarea recurenței, desigur că în astfel de situații este mai comod a se reține formula și aplica direct exprimarea termenului general al progresiei dar consider totuși instructivă parcurgerea integrală a raționamentului de explicitare.

Exemplu Explicitez șirul generat de recurența $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 3, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$

Soluție Având $x_{n+1} - x_n = 3, (\forall)n \in \mathbb{N}^*$, din suita de egalități

$$x_2 - x_1 = 3$$

$$x_3 - x_2 = 3$$

$$x_4 - x_3 = 3$$

.....

$$x_{n-1} - x_{n-2} = 3$$

$$x_n - x_{n-1} = 3$$

$$\stackrel{(+)}{\Rightarrow} x_n - x_1 = \underbrace{3 + 3 + 3 + \dots + 3}_{\text{de } (n-1) \text{ ori}}, \text{ deci } x_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1, \text{ rezultat la care}$$

se putea ajunge și pe cale directă, $x_n = x_1 + (n-1) \cdot r = \dots = 3n - 1$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + 2, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n + 7, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n - 3, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 5 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x_{n+1} = x_n - 8, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 9 \end{cases}$$

3. Recurența telescopică multiplicativă

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot a_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} - \text{șir explicit dat} \end{cases}$$

Explicite Procedura este asemănătoare cu cea de la recurența telescopică aditivă, de această dată însă eliminările ce conduc la aflarea expresiei termenului general al șirului apar la efectuarea produsului iterat corespunzător exprimărilor particulare, respectiv din $x_{n+1} = x_n \cdot a_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} = a_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^*$ și astfel din

$\frac{x_2}{x_1} = a_1, \frac{x_3}{x_2} = a_2, \frac{x_4}{x_3} = a_3, \dots, \frac{x_n}{x_{n-1}} = a_{n-1} \Rightarrow x_n = x_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} a_k$, produs care în aplicațiile propuse se va restrânge, uneori prin simplificări telescopice, altele prin exprimări combinatorice adecvate.

Exemplu Explicitez șirul generat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot \frac{n^2}{(n+1)(n+2)}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Soluție Cum $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)}, (\forall)n \in \mathbb{N}^*$, prin particularizare se obține

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{1^2}{2 \cdot 3}, \frac{x_3}{x_2} = \frac{2^2}{3 \cdot 4}, \frac{x_4}{x_3} = \frac{3^2}{4 \cdot 5}, \dots, \frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)}$$
 și observând simplificarea

telescopică $\frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_3}{x_2} \cdot \frac{x_4}{x_3} \cdot \dots \cdot \frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{1^2}{2 \cdot 3} \cdot \frac{2^2}{3 \cdot 4} \cdot \frac{3^2}{4 \cdot 5} \cdot \dots \cdot \frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)}$, cu ajutorul exprimării

factoriale, $\frac{x_n}{x_1} = \frac{2 \cdot [(n-1)!]^2}{n! \cdot (n+1)!}$, rezultă în final $x_n = \frac{2}{n^2(n+1)}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

a)
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot \frac{n}{n+1}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot \frac{n(n+1)}{(n+2)^2}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot \frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 4n + 3}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot \left(1 - \frac{1}{2n}\right), (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

4. Progresiile geometrice

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n \cdot q, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ q = \text{constantă dată numită rație} \end{cases}$$

Explicitare Acestea fiind generate tot de recurența telescopică multiplicativă, prin raționament analog $\frac{x_{n+1}}{x_n} = q, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_3}{x_2} \cdot \frac{x_4}{x_3} \cdot \dots \cdot \frac{x_n}{x_{n-1}} = \underbrace{q \cdot q \cdot q \cdot \dots \cdot q}_{\text{de } (n-1) \text{ ori}}$, din

care se deduce imediat cunoscuta formulă $x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$.

Exemplu Explicitați șirul generat de recurența $\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$

În acest caz $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 2, (\forall)n \in \mathbb{N}^*, \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_3}{x_2} \cdot \frac{x_4}{x_3} \cdot \dots \cdot \frac{x_n}{x_{n-1}} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{\text{de } (n-1) \text{ ori}} \Rightarrow x_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

a) $\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_{n+1} = 10x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 7 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x_{n+1} = -2x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 5 \end{cases}$

5. Recurența liniară neomogenă de ordin I, cu coeficienți variabili

$$\begin{cases} x_{n+1} = a_n x_n + b_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*} - \text{șiruri explicit date} \end{cases}$$

Explicitare Explicitarea acestei recurențe se va baza pe transformarea ei într-o recurență telescopică aditivă. Într-adevăr, introducând substituția $a_n = \frac{y_n}{y_{n+1}}, y_1 = 1$,

relația de recurență devine $x_{n+1} = \frac{y_n}{y_{n+1}} \cdot x_n + b_n$, deci $x_{n+1} \cdot y_{n+1} = x_n \cdot y_n + b_n \cdot y_{n+1}$.

Astfel, $x_{n+1} \cdot y_{n+1} - x_n \cdot y_n = b_n \cdot y_{n+1}, (\forall)n \in \mathbb{N}^*$ și particularizând

$$x_2 \cdot y_2 - x_1 \cdot y_1 = b_1 \cdot y_2$$

$$x_3 \cdot y_3 - x_2 \cdot y_2 = b_2 \cdot y_3$$

.....

$$x_n \cdot y_n - x_{n-1} \cdot y_{n-1} = b_{n-1} \cdot y_n$$

$$\stackrel{(+)}{\Rightarrow} x_n \cdot y_n - x_1 \cdot y_1 = \sum_{k=1}^{n-1} b_k \cdot y_{k+1},$$

pentru finalizarea explicitării mai fiind necesară doar determinarea șirului $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ introdus de substituția efectuată. Cum însă $\frac{y_1}{y_2} = a_1, \frac{y_2}{y_3} = a_2, \frac{y_3}{y_4} = a_3, \dots, \frac{y_n}{y_{n+1}} = a_n$, și

$$y_1 = 1, \text{ se obține imediat } y_{n+1} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n a_k}, \quad x_n = \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_k \right) \cdot \left(x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{b_k}{\prod_{i=1}^k a_i} \right), \quad (\forall) n \geq 2. \text{ Evident}$$

că în aplicații este de preferat parcurgerea integrală a raționamentului expus.

Exemplu Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = n \cdot x_n + n!, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Soluție Notând $n = \frac{y_n}{y_{n+1}}, y_1 = 1 \Rightarrow x_{n+1} = \frac{y_n}{y_{n+1}} \cdot x_n + n! \Rightarrow x_{n+1} \cdot y_{n+1} = x_n \cdot y_n + n! \cdot y_{n+1}$ și

astfel $x_{n+1} \cdot y_{n+1} - x_n \cdot y_n = n! \cdot y_{n+1}, (\forall) n \in \mathbb{N}^*$. Dar din notația aplicată, $n = \frac{y_n}{y_{n+1}}$, cum

$$\frac{y_1}{y_2} = 1, \frac{y_2}{y_3} = 2, \dots, \frac{y_n}{y_{n+1}} = n \Rightarrow y_{n+1} = \frac{1}{n!}, \text{ deci } x_{n+1} \cdot y_{n+1} = x_n \cdot y_n + 1, \text{ care conduce}$$

imediat la $x_n \cdot y_n = x_1 \cdot y_1 + (n-1)$ și în final $x_n = n!$

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

a)
$$\begin{cases} x_{n+1} = n \cdot x_n + (n+1)!, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_{n+1} = n \cdot x_n + (n+2)!, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x_{n+1} = n^2 \cdot x_n + (n!)^2, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{n} \cdot x_n + \frac{1}{n!}, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

6. Recurența liniară neomogenă de ordin I, cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot x_n + b, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ a, b = \text{constante date} \end{cases}$$

Explicitare Fiind la fel cu recurența anterioară, i se poate aplica pentru explicitare același raționament, obținând la final pentru x_n o expresie exponențială care admite restrângere în forma $x_n = A \cdot a^n + B$. Această observație permite scurtarea căii de explicitare a acestor recurențe, coeficienții A și B putând fi rapid determinați din sistemul primilor doi termeni ai șirului.

Exemplu Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 3, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Soluție Având $x_n = A \cdot 2^n + B$, cum $x_1 = 1$ și $x_2 = 2x_1 + 3 = 5$, din sistemul

$$\begin{cases} 2A + B = 1 \\ 4A + B = 5 \end{cases} \text{ se deduce imediat } A = 2 \text{ și } B = -3, \text{ deci } x_n = 2^{n+1} - 3$$

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

a) $\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n + 5, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_{n+1} = 5x_n + 2, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n - 3, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x_{n+1} = -5x_n + 3, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$

7. Recurența liniară omogenă de ordin II, cu coeficienți variabili

$$\begin{cases} x_{n+2} = a_n \cdot x_{n+1} + b_n \cdot x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1, x_2 = \text{termeni inițial dați} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*} - \text{șiruri explicit date} \end{cases}$$

Explicitare Voi prezenta doar un rezultat parțial legat de explicitarea acestui tip de recurență. Acesta este conținut de afirmația: *dacă ecuația $t^2 - a_n \cdot t - b_n = 0$ admite o rădăcină care nu depinde de $n \in \mathbb{N}^*$ atunci recurența devine explicitabilă.* Într-adevăr, dacă supranumita *ecuație caracteristică a recurenței* are rădăcinile $t_1 = \alpha$ și $t_2 = \beta_n$ atunci $\alpha + \beta_n = a_n$ și $\alpha \cdot \beta_n = -b_n$. În acest caz vom obține $x_{n+2} = (\alpha + \beta_n) \cdot x_{n+1} - \alpha\beta_n \cdot x_n \Leftrightarrow x_{n+2} - \alpha x_{n+1} = \beta_n \cdot (x_{n+1} - \alpha x_n)$, recurență telescopică multiplicativă care va permite determinarea $x_{n+1} = \alpha x_n + y_n$, obținând

$y_1 = x_2 - \alpha x_1$, $y_n = (x_2 - \alpha x_1) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \beta_k$, $(\forall)n \geq 2$. Dar recurența $x_{n+1} = \alpha x_n + y_n$ a fost și ea tratată anterior și particularizată pe această situație conduce în final la forma

$$\text{explicită } x_n = \alpha^{n-1} \cdot \left[\frac{x_2}{\alpha} + (x_2 - \alpha x_1) \sum_{k=2}^{n-1} \frac{\prod_{i=1}^{k-1} \beta_i}{\alpha^k} \right], (\forall)n \geq 3.$$

Exemplu: Explicitați șirul dat de recurența $\begin{cases} nx_{n+2} = 2(2n+1)x_{n+1} - 4(n+1)x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$

Ecuația caracteristică $nt^2 - 2(2n+1)t + 4(n+1) = 0$ are rădăcinile $t_1 = 2$, $t_2 = \frac{2(n+1)}{n}$,

deci suntem în condiții favorabile explicitării. Folosind cunoscutele relații dintre rădăcinile și coeficienții ecuației de gradul doi, relația de recurență se va scrie în

forma $x_{n+2} = \left[2 + \frac{2(n+1)}{n} \right] \cdot x_{n+1} - \frac{4(n+1)}{n} \cdot x_n$ din care $\frac{x_{n+2} - 2x_{n+1}}{x_{n+1} - 2x_n} = \frac{2(n+1)}{n}$.

De aici se va repeta raționamentul întâlnit la recurența telescopică multiplicativă, obținând $x_{n+1} - 2x_n = n \cdot 2^{n-1}$. Dar recurența $\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + n \cdot 2^{n-1} \\ x_1 = 1 \end{cases}$ este de tip cunoscut, de această dată procedura de explicitare finalizând cu $x_n = (n^2 - n + 4) \cdot 2^{n-3}$, $(\forall)n \geq 3$

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

$$a) \begin{cases} nx_{n+2} = 3(2n+1)x_{n+1} - 9(n+1)x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 5 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} n^2x_{n+2} = 2(2n^2 + 2n + 1)x_{n+1} - 4(n+1)^2x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} n^3x_{n+2} = 2(2n^3 + 3n^2 + 3n + 1)x_{n+1} - 4(n+1)^3x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 5 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} n^2x_{n+2} = 2(2n^2 + 3n + 2)x_{n+1} - 4(n^2 + 3n + 2)x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 5 \end{cases}$$

8. Recurența liniară omogenă de ordin II, cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+2} = a \cdot x_{n+1} + b \cdot x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1, x_2 = \text{termeni inițial dați} \\ a, b = \text{constante date} \end{cases}$$

Explicitare La fel ca și cea de ordinul I cu coeficienți constanți, și această recurență va permite explicitare imediată, considerente de la recurența anterioară punând în evidență următoarele două situații posibile:

I) Ecuația caracteristică $t^2 - a \cdot t - b = 0$ are rădăcini egale $t_1 = t_2 = \alpha$.

În acest caz termenul general este de forma $x_n = (nA + B) \cdot \alpha^n$

II) Ecuația caracteristică $t^2 - a \cdot t - b = 0$ are rădăcini distincte $t_1 = \alpha, t_2 = \beta$.

În acest caz termenul general este de forma $x_n = A \cdot \alpha^n + B \cdot \beta^n$

În ambele situații coeficienții A și B se determină din sistemul celor doi termeni inițial dați.

Exemplu (cazul $t_1 = t_2$) Explicitez șirul dat de recurența $\begin{cases} x_{n+2} = 6x_{n+1} - 9x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 7 \end{cases}$

Ecuația caracteristică conduce la $t_1 = t_2 = 3$, deci $x_n = (nA + B) \cdot 3^n$ și din sistemul termenilor inițiali, $\begin{cases} (A + B) \cdot 3 = 2 \\ (2A + B) \cdot 3^2 = 7 \end{cases}$, obținem $A = \frac{1}{9}, B = \frac{5}{9}, x_n = (n + 5) \cdot 3^{n-2}$

Exemplu (cazul $t_1 \neq t_2$) Explicitez șirul dat de recurența $\begin{cases} x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 4, x_2 = 5 \end{cases}$

De această dată ecuația caracteristică are rădăcinile $t_1 = 2, t_2 = 3$, deci

$$x_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n \text{ cu } \begin{cases} 2A + 3B = 4 \\ 4A + 9B = 5 \end{cases}, \text{ rezultând } A = \frac{7}{2}, B = -1, x_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 3^n.$$

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

I) Cazul $t_1 = t_2$

a) $\begin{cases} x_{n+2} = 4x_{n+1} - 4x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_{n+2} = 10x_{n+1} - 25x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x_{n+2} = 4x_{n+1} - x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 9x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$

II) Cazul $t_1 \neq t_2$

a) $\begin{cases} x_{n+2} = 7x_{n+1} - 12x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_{n+2} = 7x_{n+1} - 10x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x_{n+2} = 5x_{n+1} - 2x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x_{n+2} = 7x_{n+1} - 3x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 5 \end{cases}$

9. Recurența liniară neomogenă de ordin II, cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+2} = a \cdot x_{n+1} + b \cdot x_n + c, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1, x_2 = \text{termeni inițial dați} \\ a, b, c = \text{constante date} \end{cases}$$

Explicitează Această recurență se reduce imediat la tipul anterior, observând

$$\begin{cases} x_{n+2} = a \cdot x_{n+1} + b \cdot x_n + c \\ x_{n+3} = a \cdot x_{n+2} + b \cdot x_{n+1} + c \end{cases} \Rightarrow (x_{n+3} - x_{n+2}) = a \cdot (x_{n+2} - x_{n+1}) + b \cdot (x_{n+1} - x_n), \text{ care este}$$

de forma $y_{n+2} = a \cdot y_{n+1} + b \cdot y_n$ cu $y_n = x_{n+1} - x_n$. Se obține astfel $x_{n+1} - x_n = y_n$, recurență telescopică aditivă ce va permite finalizarea explicitării. Analizând forma explicită finală vom constata că și această recurență are termenul general de un tip bine determinat, tot în funcție de rădăcinile ecuației caracteristice, aceasta fiind și de această dată tot $t^2 - a \cdot t - b = 0$. Astfel, vom deosebi situațiile:

I) Ecuația caracteristică $t^2 - a \cdot t - b = 0$ are rădăcini egale $t_1 = t_2 = \alpha$.

În acest caz termenul general este de forma $x_n = (nA + B) \cdot \alpha^n + C$

II) Ecuația caracteristică $t^2 - a \cdot t - b = 0$ are rădăcini distincte $t_1 = \alpha, t_2 = \beta$.

În acest caz termenul general este de forma $x_n = A \cdot \alpha^n + B \cdot \beta^n + C$

Coefficienții A, B și C sunt imediat determinabili din sistemul celor doi termeni inițial dați și al celui de al treilea, obținut din recurență.

Exemplu(cazul $t_1 = t_2$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+2} = 4x_{n+1} - 4x_n + 3, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$$

În acest caz ecuația caracteristică $t^2 - 4t + 4 = 0$ conduce la $t_1 = t_2 = 2$, deci $x_n = (nA + B) \cdot 2^n + C$ și din sistemul termenilor inițiali, inclusiv $x_3 = 4x_2 - 4x_1 + 3 = 7$, se obțin $A = \frac{3}{4}, B = -\frac{7}{4}, C = 3, x_n = (3n - 7) \cdot 2^{n-2} + 3$.

Exemplu (cazul $t_1 \neq t_2$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n + 3, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$$

De această dată ecuația caracteristică are rădăcinile $t_1 = 2, t_2 = 3$, deci $x_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n + C$. Având $x_3 = 5x_2 - 6x_1 + 3 = 7$, din sistemul celor trei termeni cunoscuți obțin $A = -1, B = \frac{1}{2}, C = \frac{3}{2}, x_n = \frac{3^n - 2^{n+1} + 3}{2}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

I) Cazul $t_1 = t_2$

a)
$$\begin{cases} x_{n+2} = 4x_{n+1} - 4x_n + 5, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_{n+2} = 10x_{n+1} - 25x_n + 3, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 4x_{n+2} = 4x_{n+1} - x_n + 7, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 9x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n + 1, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$$

II) Cazul $t_1 \neq t_2$

a)
$$\begin{cases} x_{n+2} = 7x_{n+1} - 12x_n + 2, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 3 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_{n+2} = 7x_{n+1} - 10x_n + 1, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 3 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 2x_{n+2} = 5x_{n+1} - 2x_n +, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x_{n+2} = 7x_{n+1} - 3x_n + 4, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2, x_2 = 5 \end{cases}$$

10. Recurențe liniare omogene de ordin superior, cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+p} = a_1 \cdot x_{n+p-1} + a_2 \cdot x_{n+p-2} + \dots + a_{p-1} \cdot x_{n+1} + a_p \cdot x_n, (\forall)n \in \mathbb{N}^*, p \geq 3 \\ x_1, x_2, \dots, x_p = \text{termeni inițial dați} \\ a_1, a_2, \dots, a_p = \text{constante date} \end{cases}$$

Explicite Determinarea explicită a unor astfel de șiruri se va face la fel ca și la suratele lor mai mici prezentate anterior, pașii de parcurs fiind următorii:

- se rezolvă *ecuația caracteristică* $t^p = a_1 \cdot t^{p-1} + a_2 \cdot t^{p-2} + \dots + a_{p-1} \cdot t + a_p$;
- se clasifică rădăcinile distincte după ordinul de multiplicitate;
- dacă $t_1 \in \mathbb{C}$ este rădăcină simplă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $A \cdot t_1^n$;
- dacă $t_2 \in \mathbb{C}$ este rădăcină dublă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $(nB + C) \cdot t_2^n$;
- dacă $t_3 \in \mathbb{C}$ este rădăcină triplă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $(n^2D + nE + F) \cdot t_3^n$, etc.

Coeficienții A, B, C , etc. se obțin din sistemul termenilor inițiali ai recurenței.

Exemplu Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+3} = 7x_{n+2} - 16x_{n+1} + 12x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 5 \end{cases}$$

În acest caz ecuația caracteristică este $t^3 - 7t^2 + 16t - 12 = 0$, cu $t_1 = 3$ rădăcină simplă și $t_2 = t_3 = 2$ rădăcină dublă, deci termenul general al șirului va avea forma $x_n = A \cdot 3^n + (nB + C) \cdot 2^n$. Din sistemul termenilor inițiali se determină coeficienții, $A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{4}, C = \frac{1}{4}$ și se obține $x_n = 3^{n-1} + (1-n) \cdot 2^{n-2}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+3} = 8x_{n+2} - 21x_{n+1} + 18x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 5, x_3 = 6 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x_{n+3} = x_{n+2} + 16x_{n+1} + 20x_n, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 4, x_2 = 5, x_3 = 3 \end{cases}$$

11. Recurențe liniare neomogene de ordin superior, cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+p} = a_1 \cdot x_{n+p-1} + a_2 \cdot x_{n+p-2} + \dots + a_{p-1} \cdot x_{n+1} + a_p \cdot x_n + b, (\forall)n \in \mathbb{N}^*, p \geq 3 \\ x_1, x_2, \dots, x_p = \text{termeni inițial dați} \\ a_1, a_2, \dots, a_p, b = \text{constante date} \end{cases}$$

Explicite La fel ca la recurența neomogenă de ordin doi cu coeficienți constanți:

- se rezolvă *ecuația caracteristică* $t^p = a_1 \cdot t^{p-1} + a_2 \cdot t^{p-2} + \dots + a_{p-1} \cdot t + a_p$;
- se clasifică rădăcinile distincte după ordinul de multiplicitate;
- dacă $t_1 \in \mathbb{C}$ este rădăcină simplă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $A \cdot t_1^n$;
- dacă $t_2 \in \mathbb{C}$ este rădăcină dublă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $(nB + C) \cdot t_2^n$;
- dacă $t_3 \in \mathbb{C}$ este rădăcină triplă, ea se va prezenta în exprimarea termenului general x_n aditiv sub forma $(n^2D + nE + F) \cdot t_3^n$, etc.
- se introduce coeficientul termen liber G .

Coeficienții A, B, C, \dots, G se obțin din sistemul termenilor inițiali ai recurenței.

Exemplu Explicitez șirul dat de recurența $\begin{cases} x_{n+3} = 7x_{n+2} - 16x_{n+1} + 12x_n - 1, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = x_2 = x_3 = 1 \end{cases}$

Ecuția caracteristică este $t^3 - 7t^2 + 16t - 12 = 0$, cu $t_1 = 3$ rădăcină simplă și $t_2 = t_3 = 2$ rădăcină dublă, deci termenul general al șirului va avea forma $x_n = A \cdot 3^n + (nB + C) \cdot 2^n + D$. Din sistemul termenilor inițiali și $x_4 = \dots = 2$ se obține $A = \frac{1}{6}, B = -\frac{1}{4}, C = \frac{1}{4}, D = \frac{1}{2}$, $x_n = \frac{3^{n-1} + (1-n) \cdot 2^{n-1} + 1}{2}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicați următoarele recurențe:

$$a) \begin{cases} x_{n+3} = 8x_{n+2} - 21x_{n+1} + 18x_n - 10, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 2 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x_{n+3} = x_{n+2} + 16x_{n+1} + 20x_n - 15, n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0 \end{cases}$$

12. Recurența omografică cu coeficienți variabili

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{a_n \cdot x_n + b_n}{c_n \cdot x_n + d_n}, (\forall) n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (d_n)_{n \in \mathbb{N}^*} - \text{șiruri explicit date} \end{cases}$$

Explicare La aceste recurențe vom analiza următoarele două cazuri:

I) Cazul $b_n = 0$

După cum ușor se va observa, această particularitate permite totdeauna finalizarea explicitării. Într-adevăr $x_{n+1} = \frac{a_n \cdot x_n}{c_n \cdot x_n + d_n} \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{d_n}{a_n} \cdot \frac{1}{x_n} + \frac{c_n}{a_n} \Rightarrow$ notând

$\frac{1}{x_n} = y_n$ recurența ia forma $y_{n+1} = A_n \cdot y_n + B_n$ care este explicitabilă.

II) Cazul $b_n \neq 0$

Un rezultat parțial în astfel de situații este următorul:

- introduc substituția $c_n x_n + d_n = y_n \Rightarrow$ recurența ia forma $y_{n+1} \cdot y_n = A_n \cdot y_n + B_n$
- introduc substituția $y_n = \frac{z_{n+1}}{z_n}, z_1 = 1 \Rightarrow$ recurența ia forma $z_{n+2} = A_n \cdot z_{n+1} + B_n \cdot z_n$

cu $z_1 = 1$ și $z_2 = \dots = c_1 \cdot x_1 + d_1 \Rightarrow$ dacă ecuația caracteristică $t^2 - A_n \cdot t - B_n = 0$ are o rădăcină nedependentă de $n \in \mathbb{N}^*$ atunci z_n devine determinabil prin

procedură descrisă anterior și astfel $x_n = \frac{y_n - d_n}{c_n} = \frac{z_{n+1} - d_n \cdot z_n}{c_n \cdot z_n}$.

Exemplu ($b_n = 0$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n}{n! \cdot x_n + n} \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Cu $y_n = \frac{1}{x_n}$ recurența devine $y_{n+1} = ny_n + n!$, $y_1 = 1$ (explicitată anterior) $\Rightarrow y_n = n!$

și astfel $x_n = \frac{1}{n!}$.

Exemplu ($b_n \neq 0$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{a_n x_n + b_n}{c_n x_n + d_n} \\ x_1 = 1 \end{cases}$$
 cu coeficienții

$a_n = n!(-n^2 + 3n + 2)$, $b_n = -n^3 + 3n^2 - 2n - 4$, $c_n = (n!)^2 \cdot n \cdot (n + 1)$, $d_n = n! \cdot n^2 \cdot (n + 1)$
Deși această exprimare apare de-a dreptul descurajantă, parcurgând drumul indicat se va ajunge la aceeași recurență $z_{n+1} = nz_n + n!$, $z_1 = 1$ din care se va obține $z_n = n!$,
 $y_n = n + 1$ și în final $x_n = \frac{1}{n!}$

Temă de aprofundare La această secțiune, ca exercițiu de virtuozitate, propun cititorului să-și construiască singur o aplicație care să permită explicitare și bineînțeles, să o și rezolve !

13. Recurența omografică cu coeficienți constanți

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{a \cdot x_n + b}{c \cdot x_n + d}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = \text{termen inițial dat} \\ a, b, c, d - \text{constante date} \end{cases}$$

Explicitare Fiind particularizare a celei anterioare, se vor parcurge raționamente analoge, conform cu fiecare din situațiile:

I) Cazul $b = 0$

Având $x_{n+1} = \frac{a \cdot x_n}{c \cdot x_n + d} \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{d}{a} \cdot \frac{1}{x_n} + \frac{c}{a} \Rightarrow$ notând $\frac{1}{x_n} = y_n$ recurența ia forma $y_{n+1} = A \cdot y_n + B$ care este explicitabilă. În această situație termenul general se va obține de forma $x_n = \frac{a^n}{\alpha \cdot d^n + \beta \cdot a^n}$, cu coeficienții α și β determinabili din sistemul primilor doi termeni, observație care poate scurta sensibil explicitarea.

II) Cazul $b \neq 0$

În această situație:

- introduc substituția $cx_n + d = y_n \Rightarrow$ recurența ia forma $y_{n+1} \cdot y_n = A \cdot y_n + B$
- introduc substituția $y_n = \frac{z_{n+1}}{z_n}, z_1 = 1 \Rightarrow$ recurența ia forma $z_{n+2} = A \cdot z_{n+1} + B \cdot z_n$

cu $z_1 = 1$ și $z_2 = \dots = c \cdot x_1 + d \Rightarrow$ determin $z_n \Rightarrow$ determin $y_n = \frac{z_{n+1}}{z_n}$ și finalizez,

obținând $x_n = \frac{y_n - d}{c} = \frac{z_{n+1} - d \cdot z_n}{c \cdot z_n}$. De această dată forma termenului general

va fi decisă de ordinul de multiplicitate a rădăcinilor ecuației $t^2 - A \cdot t - B = 0$,

respectiv $x_n = \frac{n \cdot \alpha + \beta}{n + \gamma}$ când $t_1 = t_2$ și $x_n = \frac{\alpha \cdot t_1^n + \beta \cdot t_2^n}{t_1^n + \gamma \cdot t_2^n}$ când $t_1 \neq t_2$, coeficienții

α, β, γ fiind determinabili din sistemul primilor trei termeni.

Exemplu ($b = 0$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n}{3x_n + 5}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Obțin $\frac{1}{x_{n+1}} = 5 \cdot \frac{1}{x_n} + 3 \Rightarrow x_n = \frac{1}{A \cdot 3^n + B}$, etc.

Exemplu ($b \neq 0, t_1 = t_2$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5x_n - 1}{4x_n + 1} \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Aplicarea substituțiilor $cx_n + d = y_n, y_n = \frac{z_{n+1}}{z_n}, z_1 = 1$, va conduce la recurență omogenă de ordin doi. Se obțin rădăcini ale ecuației caracteristice $t_1 = t_2 = 3$, etc.,

cu finalizarea $x_n = \frac{n+2}{2n+1}$.

Exemplu ($b \neq 0, t_1 \neq t_2$) Explicitez șirul dat de recurența
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{7x_n - 4}{5x_n - 2} \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

Aplicarea substituțiilor $cx_n + d = y_n, y_n = \frac{z_{n+1}}{z_n}, z_1 = 1$, va pune în evidență recurență omogenă de ordin doi. Se vor obține rădăcini ale ecuației caracteristice

$t_1 = 2, t_2 = 3$, etc., cu finalizarea $x_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n - 5 \cdot 2^{n-2}}$.

Temă de aprofundare Procedând analog, explicitați următoarele recurențe:

I) Cazul $b = 0$

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{x_n}{5x_n + 2}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{2x_n}{3x_n + 7}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

II) Cazul $b \neq 0, t_1 = t_2$

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{5x_n + 3}{3x_n - 1}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{3x_n - 1}{x_n + 1}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

III) Cazul $b \neq 0, t_1 \neq t_2$

$$\text{a) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{4x_n - 1}{2x_n + 1}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_{n+1} = \frac{5x_n - 2}{x_n + 2}, (\forall)n \in \mathbb{N}^* \\ x_1 = 3 \end{cases}$$