

**Geometrie Diferențială: 26 Mai 2021**

**Mircea Crâșmăreanu**



# Cuprins

Introducere	v
1 Noțiunea de curbă. Geometria unei curbe	1
2 Reperul Frenet și curburi	9
3 Teorema fundamentală a curbelor	19
4 Ecuațiile Frenet	25
5 Noțiunea de suprafață. Geometria unei suprafețe	31
6 Planul tangent și normala	35
7 Forma I-a fundamentală	43
8 Geometria intrinsecă a unei suprafețe	49
9 Forma a II-a fundamentală	57
10 Curbura normală. Curburi principale. Curbura medie și totală	63
11 Derivata covariantă pe o suprafață. Simbolii Christoffel	69
12 Teorema Egregium și teorema fundamentală a suprafețelor	77
13 Curbe pe o suprafață: reperul Darboux	85
14 Geodezice	89
15 Conexiuni liniare	97
16 Torsiunea și curbura unei conexiuni liniare	101
17 Formule Ricci de comutare	107
18 Seminar 8 (2021): Varietăți diferențiabile	113
19 Seminar 9 (2021): Funcții diferențiabile	119

<b>20 Seminar 10 (2020): Spațiul tangent și spațiul cotangent</b>	<b>125</b>
<b>21 Seminar 11 (2020): Fibratul tangent și fibratul cotangent</b>	<b>131</b>
<b>22 Seminar 12 (2020): Aplicația liniară tangentă și aplicația liniară cotangentă</b>	<b>137</b>
<b>23 Seminar 13 (2020): Algebra Lie a câmpurilor vectoriale</b>	<b>143</b>
<b>24 Seminar 14 (2020): Fluxul unui câmp vectorial</b>	<b>147</b>
<b>Bibliografie</b>	<b>151</b>
<b>Index</b>	<b>152</b>

# Introducere

Deși pare paradoxal având în vedere istoria bogată a subiectului, a compune o nouă carte de "Geometrie a curbelor și suprafețelor" nu este un lucru facil. Chiar acest trecut glorios apasă cu o responsabilitate sporită pe umerii celui ce își propune o nouă scriere. Astfel, există câteva monografii excelente în domeniu și de o parte din ele ne-au servit ca punct de plecare și manieră de abordare. Faptul că ne-am încumetat la o nouă redactare se datorează și aspectului important că unele din aceste tratate sunt greu accesibile studenților precum și necesității de a face o selectare foarte drastică a materialului necesar în conformitate cu numărul de ore alocate Cursului: 4 ore curs/3 ore seminar. Astfel, deși am prezentat partea clasică a teoriei, a trebuit să facem un veritabil mixaj de subiecte, tehnici, exemple, și în ideea unei oferte editoriale rezonabile (100 de pagini). De asemenea, am ațintit și o privire spre partea de abordare cu ajutorul calculatorului a unor chestiuni computaționale. Sunt incluse un mare număr de probleme (130) cu grade diverse de dificultate!

Un proiect de o asemenea amploare a beneficiat din plin de sprijinul a mai multor colegi. Suntem datori cu mulțimi domnișoarei asistent doctor Adina Balmuș, care, cu deosebită generozitate, a corectat anumite greșeli, erori, omisiuni. Mulțumim colegului conferențiar doctor Marian-Ioan Munteanu pentru disponibilitatea de a ne ajuta în diverse aspecte ale tehnoredactării.



# Cursul 1

## Noțiunea de curbă. Geometria unei curbe

ACEST CURS RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

$Q_1$ : Ce este o curbă ?

$Q_2$ : Ce înseamnă geometria unei curbe ?

-----

Fixăm numărul natural  $n \geq 2$ . Scena întregii materii a acestui Curs va fi spațiul  $n$ -dimensional  $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$  unde în acest produs cartezian avem  $n$  factori. Dat  $i \in \{1, \dots, n\}$  avem *proiecția*  $\pi^i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\pi^i(\bar{x}) = \pi^i(x^1, \dots, x^n) = x^i$ .

**Definiția 1.1** i) Numim *curbă parametrică* sau *curbă parametrizată* în  $\mathbb{R}^n$  o aplicație  $\bar{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  unde:

i1)  $I = (a, b)$  este un interval real deschis,

i2)  $\bar{r}$  este o funcție netedă adică pentru orice  $i \in \{1, \dots, n\}$  aplicația  $x^i = \pi^i \circ \bar{r} : I \rightarrow \mathbb{R}$  este diferentiabilă de clasă  $C^\infty$  (netedă).

ii) Mulțimea  $C \subset \mathbb{R}^n$  o numim *curbă în  $\mathbb{R}^n$*  dacă există o curbă parametrică  $\bar{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  așa încât  $C = \bar{r}(I)$ . Spunem că  $\bar{r}$  este o *parametrizare* a lui  $C$  și notăm:

$$C: \bar{r} = \bar{r}(t), \quad t \in I. \tag{1.1}$$

$t$  se numește *parametru pe curba  $C$*  iar punctul  $P = \bar{r}(t)$  al curbei îl notăm simplu  $P(t)$  sau încă  $P(\bar{r}(t))$ . Relația (1.1) o numim *ecuația parametrică a curbei  $C$* .

**Observații 1.2** i) Este posibil ca intervalul  $I$  să nu fie deschis; atunci vom presupune existența perechii  $(J, \bar{R})$  cu  $J$  interval real deschis conținând  $I$  și  $\bar{R} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  netedă așa încât  $\bar{r}$  este restricția la  $I$  a lui  $\bar{R}$ . Mai spunem că  $C = \bar{r}(I)$  este *arc al curbei  $\bar{C} = \bar{R}(J)$* .

Spre exemplu, domeniul de definiție al *cercului unitate*  $S^1$  pentru o parametrizare injectivă nu este deschis:

$$S^1 : \bar{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi) \tag{1.2}$$

și bineînțeles că avem  $\bar{R}(t) = (\cos t, \sin t)$  netedă pe  $J = \mathbb{R}$ .

ii) Dacă  $n = 2$  atunci spunem că  $C$  este o *curbă în plan* iar pentru  $n = 3$  spunem că  $C$  este o

curbă în spațiu. Dacă  $C$  este o curbă în spațiu dar situată într-un plan  $\pi$  atunci vom spune că  $C$  este o curbă plană.

**Exemple 1.3** i) Dreapta  $d$  conținând punctul  $M(\bar{r}_0)$  și având vectorul director  $\bar{a} \neq \bar{0}$  este (conform Cursului Geometrie 1):

$$d : \bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (1.3)$$

ii) Axa  $Ox$  din  $\mathbb{R}^3$  este o curbă în spațiu. Trei parametrizări pentru această curbă sunt:

$$Ox : \bar{r}_1(t) = (t, 0, 0), \quad \bar{r}_2(t) = (t^3 + 2t, 0, 0), \quad \bar{r}_3(t) = (t^5, 0, 0), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Din ultimul exemplu vedem că o curbă oarecare are mai multe parametrizări. Pentru a realiza o legătură între două astfel de parametrizări reamintim:

**Definiția 1.4** Fie intervalele reale  $I$  și  $J$  și funcția  $\varphi : J \rightarrow I, s \rightarrow \varphi(s) = t$ . Spunem că  $\varphi$  este *difeomorfism* dacă  $\varphi$  este bijecție cu  $\varphi$  și  $\varphi^{-1}$  netede. Fie  $\text{Diff}(J, I)$  mulțimea nevidă a acestor difeomorfisme.

Fie  $s_0 \in J$  fixat și  $t_0 = \varphi(s_0)$ . Reamintim derivata lui  $\varphi^{-1}$  în  $t_0$ :

$$(\varphi^{-1})'(t_0) = \frac{1}{\varphi'(s_0)} \quad (1.4)$$

deci  $\varphi'$  nu se anulează în niciun punct!

**Definiția 1.5** Curbele parametrizate  $\bar{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^n, \bar{h} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  se numesc *echivalente* și notăm  $\bar{r} \sim \bar{h}$  dacă există  $\varphi \in \text{Diff}(J, I)$  așa încât  $\bar{h} = \bar{r} \circ \varphi$ . Spunem că  $\varphi$  este o *schimbare de parametru* și că  $\bar{h}$  este o *reparametrizare* a lui  $\bar{r}$ .

Să observăm din definiția precedentă că  $\bar{r}$  și  $\bar{h}$  au aceeași imagine geometrică  $C$  deoarece  $\varphi$  este bijecție; deci  $\bar{r}$  și  $\bar{h}$  sunt parametrizări ale aceleiași curbe  $C$ .

**Propoziția 1.6**  $\sim$  este o relație de echivalență pe mulțimea parametrizărilor unei curbe  $C$ .

**Demonstrație** 1) (Reflexivitatea)  $\bar{r} \sim \bar{r}$  cu  $\varphi = 1_I$ .

2) (Simetria) Presupunem că  $\bar{r}_1 \sim \bar{r}_2$  via  $\varphi$ . Atunci  $\bar{r}_2 \sim \bar{r}_1$  via  $\varphi^{-1}$ .

3) (Tranzitivitatea) Presupunem că  $\bar{r}_1 \sim \bar{r}_2$  via  $\varphi$  și  $\bar{r}_2 \sim \bar{r}_3$  via  $\psi$ . Atunci  $\bar{r}_1 \sim \bar{r}_3$  via  $\varphi \circ \psi$ . Să observăm că dacă  $\varphi \in \text{Diff}(J, I)$  și  $\psi \in \text{Diff}(K, J)$  atunci  $\varphi \circ \psi \in \text{Diff}(K, I)$ .  $\square$

Acest rezultat ne permite introducerea noțiunii principale a acestui Curs:

**Definiția 1.7** Se numește *proprietate (mărime) geometrică* sau *invariant* al curbei  $C$  o proprietate (mărime) ce nu depinde de parametrizările dintr-o clasă de echivalență fixată a lui  $C$ . Mulțimea proprietăților și mărimilor geometrice constituie *geometria* lui  $C$ .

Cu Propoziția 1.6 o curbă  $C$  va fi considerată ca o clasă de echivalență de curbe parametrice și o proprietate geometrică este o proprietate comună tuturor curbelor parametrice echivalente; dar bineînțeles că din punct de vedere computațional vom lucra cu un reprezentant fixat, adică cu o parametrizare dată, de aceea în cele ce urmează vom considera doar curbe parametrizate. Un prim exemplu de proprietate geometrică este dat de:

**Definiția 1.8** Fie  $C : \bar{r} = \bar{r}(t), t \in I$  și  $t_0 \in I$  fixat. Punctul  $M_0(t_0)$  al lui  $C$  este numit: i) *singular* dacă  $\bar{r}'(t_0) = \bar{0}$ ,



ii) *regulat* dacă nu este singular.

O curbă cu toate punctele regulate se numește *regulată*.

**Propoziția 1.9** *Regularitatea (și deci singularitatea) este o proprietate geometrică.*

**Demonstrație** Fie  $\varphi : J \rightarrow I$  o schimbare de parametru pe  $C$  și  $u_0 \in J$  așa încât  $t_0 = \varphi(u_0)$ . Fie  $\bar{R}(u) = \bar{r} \circ \varphi(u)$  noua parametrizare a lui  $C$ . Avem:

$$\frac{d\bar{R}}{du}(u_0) = \frac{d\bar{r}}{dt}(t_0) \cdot \frac{d\varphi}{du}(u_0). \quad (1.5)$$

Cum  $\varphi' \neq 0$  pe  $J$  avem  $\bar{r}'(t_0) \neq 0$  dacă și numai dacă  $\bar{R}'(u_0) \neq \bar{0}$ .  $\square$

**Observații 1.10** Parametrizările  $\bar{r}_1$  și  $\bar{r}_2$  ale axei  $Ox$  sunt regulate dar parametrizarea  $\bar{r}_3$  are punctul singular  $t = 0$  corespunzător originii  $O(0, 0, 0)$ ; putem spune că originea este o singularitate aparentă a axei  $Ox$ . Atenție: aplicația  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(t) = t^3 + 2t$  este un difeomorfism al dreptei reale deoarece  $\varphi'(t) = 3t^2 + 2 > 0$  pentru orice  $t \in \mathbb{R}$ . Deci  $\bar{r}_1 \sim \bar{r}_2$ .

În concluzie, dreapta cu parametrizarea  $\bar{r}_1$  (echivalent  $\bar{r}_2$ ) are o anumită geometrie diferită de geometria dreptei cu parametrizarea  $\bar{r}_3$ !  $\square$

În continuare, vom considera **doar curbe parametrizate regulate!** Dacă vom compara  $\bar{r}_1$  cu  $\bar{r}_2$  ale exemplului precedent observăm că  $\bar{r}'_1$  are norma constantă (egală cu 1, deci este versor) în timp ce  $\bar{r}'_2$  are norma variabilă  $3t^2 + 2$ . Este clar ca din punct de vedere al calculelor este preferabilă prima parametrizare. Următorul concept formalizează acest aspect important:

**Definiția 1.11** Curba  $C : \bar{r} = \bar{h}(s), s \in J$  se numește *parametrizată unitar* sau (*canonic*) dacă  $\|\bar{h}'(s)\| = 1$  pentru toți  $s \in J$ . Atunci  $s$  se numește *parametru natural* sau *canonic* pe  $C$ .

**Teorema 1.12** Fie  $C : \bar{r} = \bar{r}(t), t \in I$  o curbă regulată.

- 1) Există o reparametrizare canonică a lui  $C$ .
- 2) Fie  $\bar{r} \circ \varphi_1$  și  $\bar{r} \circ \varphi_2$  două parametrizări canonice ale lui  $C$  cu  $\varphi_i : I_i \rightarrow I$ . Atunci  $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 : I_1 \rightarrow I_2$  are expresia  $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1(s) = \pm s + s_0$  cu  $s_0 \in \mathbb{R}$ .

**Demonstrație** 1) Fie  $I = (a, b)$  și fixăm  $t_0 \in I$  un punct numit *origine*. Definim  $L : (t_0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $L(t) = \int_{t_0}^t \|\bar{r}'(u)\| du$ . Această funcție este netedă cu  $L'(t) = \|\bar{r}'(t)\| > 0$  pe  $(t_0, b)$  din regularitate. Deci,  $L$  este strict crescătoare deci injectivă. Cu  $J = L((t_0, b))$  rezultă că  $L : (t_0, b) \rightarrow J$  este bijecție netedă. Fie acum  $\varphi = L^{-1} : J \rightarrow (t_0, b), s \rightarrow \varphi(s) = t(s)$ ; deci  $\varphi$  este un difeomorfism adică schimbare de parametru pe  $C$ . Fie  $\bar{h} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  noua parametrizare a lui  $C$  dată de  $\bar{h} = \bar{r} \circ \varphi$ . Avem:

$$\frac{d\bar{h}}{ds}(s) = \frac{d\bar{r}}{dt}(t(s)) \cdot \frac{dt}{ds}(s) = \bar{r}'(t) \cdot t'(s) = \bar{r}'(t) \cdot \frac{1}{L'(t)} = \frac{\bar{r}'(t)}{\|\bar{r}'(t)\|}.$$

În concluzie,  $\|\bar{h}'(s)\| = 1$  pentru toți  $s \in J$ .

2) Fie  $\varphi_1 : I_1 \rightarrow I, s \rightarrow t = \varphi_1(s)$  și  $\varphi_2 : I_2 \rightarrow I, u \rightarrow t = \varphi_2(u)$ . Din  $\bar{h}_i = \bar{r} \circ \varphi_i$  parametrizări unitare ale lui  $C$  rezultă:

$$1 = \left\| \frac{d(\bar{r} \circ \varphi_i)}{ds}(s) \right\| = \|\bar{r}'(\varphi_i(s)) \cdot \varphi_i'(s)\| = \|\bar{r}'(\varphi_i(s))\| \cdot |\varphi_i'(s)|$$

adică:

$$\varphi_i'(s) = \pm \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|} = \varphi_i'(u).$$

Atunci:

$$(\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1)'(s) = (\varphi_2^{-1})'(t) \cdot \varphi_1'(s) = \frac{\varphi_1'(s)}{\varphi_2'(u)} = \pm 1$$

și o integrare dă concluzia.  $\square$

**Definiția 1.13** i) Funcția  $L : (t_0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$L(t) = \int_{t_0}^t \|\bar{r}'(u)\| du \quad (1.6)$$

se numește *lungimea de arc* pe  $[t_0, t]$  pentru curba  $C$ .

ii) Presupunem că  $a > -\infty$  (deci  $a \in \mathbb{R}$ ) și ca urmare facem alegerea  $t_0 = a$ . Numărul real pozitiv  $L(C) := L(b)$  este *lungimea curbei*  $C$  (deci presupunem că  $L(C) < +\infty$ ).

**Exemplul 1.14** Pentru cercul centrat în originea planului și de rază  $R$  avem:

$$C(O, R) : \bar{r}(t) = R(\cos t, \sin t), t \in [0, 2\pi]. \quad (1.7)$$

Atunci  $\|\bar{r}'(u)\| = R$  și  $L(t) = Rt$ . Inversăm funcția  $s(t) = Rt$  și avem  $t = s/R$  de unde rezultă parametrizarea canonică a acestui cerc:

$$C(O, R) : \bar{h}(s) = R\left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R}\right), s \in [0, L(2\pi) = 2\pi R]. \quad (1.8)$$

Folosind formula schimbării de variabilă în integrala definită avem:

**Propoziția 1.15** *Lungimea unei curbe este un invariant în teoria curbelor.*

**Demonstrație** Reamintim formula schimbării de variabile în calculul integralelor: fie  $\varphi : J = (c, d) \rightarrow I = (a, b), u \rightarrow \varphi(u) = t$  cu  $\varphi \in C^1(J, I)$ . Dacă  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă atunci:

$$\int_c^d f(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u) du = \int_a^b f(t) dt. \quad (1.8)$$

Fie acum parametrizările  $\bar{r}$  și  $\bar{h} = \bar{r} \circ \varphi$  date de Definiția 1.5 și presupunem, pentru simplificare,  $\varphi$  crescătoare i.e.  $\varphi' > 0$  pe  $J$ . Conform formulei (1.5) avem:

$$\bar{h}'(u) = \bar{r}'(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u) \quad (1.9)$$

și deci aplicând formula (1.8) cu  $f = \|\bar{r}'\|$  avem:

$$\int_c^d \|\bar{h}'(u)\| du = \int_c^d \|\bar{r}'(\varphi(u))\| \cdot \varphi'(u) du = \int_a^b \|\bar{r}'(t)\| dt$$

ceea ce voiam.  $\square$

## SEMINARUL 1

**S1.1** Să se reobțină formula distanței euclidiene dintre punctele  $M_1(\bar{r}_1), M_2(\bar{r}_2)$  din  $\mathbb{R}^n$ .

**Rezolvare** Fie dreapta  $d = M_1M_2$ :

$$d : \bar{r}(t) = \bar{r}_1 + t(\bar{r}_2 - \bar{r}_1), t \in \mathbb{R}. \quad (1.10)$$

Segmentul  $[M_1M_2]$  este descris de  $t \in [0, 1]$  și deci:

$$d(M_1, M_2) = \int_0^1 \|\bar{r}_2 - \bar{r}_1\| dt = \|\bar{r}_2 - \bar{r}_1\|. \quad (1.11)$$

A se vedea și Definiția 3.3 din Cursul 3.

**S1.2 (Grafice de funcții)** Fie  $f : I = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^k$  cu  $k \geq 1$ . Graficul lui  $f$  este curba în plan:

$$G_f : \bar{r}(t) = (t, f(t)), t \in I. \quad (1.12)$$

Se cere lungimea acestei curbe.

**Rezolvare** Cum  $\bar{r}'(t) = (1, f'(t))$  avem din (1.6):

$$L(G_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt \quad (1.13)$$

formulă ce apare de altfel în Manualul de Analiză Matematică de clasa a XII-a!

**S1.3** Se cere lungimea arcului  $[0, 2\pi]$  a *cicloidei*:

$$\bar{r}(t) = R(t - \sin t, 1 - \cos t), t \in \mathbb{R} \quad (1.14)$$

unde  $R > 0$  este o constantă dată.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = R(1 - \cos t, \sin t)$  și deci:  $\|\bar{r}'(t)\| = R\sqrt{1 - 2\cos t + 1} = 2R|\sin \frac{t}{2}|$ . Avem:

$$L(C|_{[0, 2\pi]}) = 2R \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4R \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8R.$$

**S1.4** Se cere lungimea arcului  $[0, \frac{\pi}{2}]$  a *astroidei*:

$$\bar{r}(t) = R(\cos^3 t, \sin^3 t), t \in \mathbb{R}. \quad (1.15)$$

**Rezolvare** avem:  $\bar{r}'(t) = 3R(-\cos^2 t \sin t, \sin^2 t \cos t)$  și deci:  $\|\bar{r}'(t)\| = 3R|\cos t \sin t| = \frac{3R}{2}|\sin 2t|$ . Deci:

$$L(C|_{[0, \frac{\pi}{2}]}) = \frac{3R}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = -\frac{3R}{4} \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3R}{2}.$$

**S1.5** Pentru *spirala logaritmică*:

$$\bar{r}(t) = R(e^{kt} \cos t, e^{kt} \sin t), t \in \mathbb{R} \quad (1.16)$$

cu  $R > 0, k > 0$  constante date se cere:

i) să se arate că unghiul dintre  $\bar{r}(t)$  și  $\bar{r}'(t)$  este constant,

ii) notând cu  $l_n$  lungimea arcului  $[2n\pi, 2(n+1)\pi]$  să se arate că raportul  $\frac{l_{n+1}}{l_n}$  este constant.

**Rezolvare** i) Avem:  $\bar{r}'(t) = Re^{kt}(k \cos t - \sin t, k \sin t + \cos t)$  și deci:  $\|\bar{r}'(t)\| = Re^{kt}\sqrt{k^2 + 1}$ ,  $\|\bar{r}(t)\| = Re^{kt}$  și  $\langle \bar{r}(t), \bar{r}'(t) \rangle = R^2 k e^{2kt}$ . Rezultă:

$$\cos \angle(\bar{r}(t), \bar{r}'(t)) = \frac{\langle \bar{r}(t), \bar{r}'(t) \rangle}{\|\bar{r}(t)\| \|\bar{r}'(t)\|} = \frac{k}{\sqrt{k^2 + 1}}.$$

ii) Avem:

$$l_n = R\sqrt{k^2 + 1} \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} e^{kt} dt = \frac{R\sqrt{k^2 + 1}}{k} (e^{2(n+1)k\pi} - e^{2nk\pi})$$

de unde rezultă:  $\frac{l_{n+1}}{l_n} = e^{2k\pi}$  care este o constantă strict mai mare decât 1.

**S1.6** Se cere lungimea arcului  $[0, 2]$  al curbei:  $\bar{r}(t) = (t - \frac{1}{2}sh2t, 2cht), t \in \mathbb{R}$ .

**Rezolvare** Avem  $\bar{r}^{prime}(t) = (1 - cht, 2sht)$  și  $1 - ch2t = 1 - \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2} = -\frac{(e^t - e^{-t})^2}{2} = -2sh^2t$ . Deci:  $\bar{r}'(t) = 2sht(-sht, 1)$  și rezultă:  $\|\bar{r}'(t)\| = 2shtcht = 2\frac{(e^t - e^{-t})(e^t + e^{-t})}{4} = \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{2} = sh2t$ . Lungimea cerută este:

$$L(C|_{[0, 2]}) = \int_0^2 sh2t dt = \frac{1}{2}ch2t|_0^2 = \frac{ch4 - 1}{2}.$$

**S1.7** Se cere lungimea arcului  $[0, \sqrt{2}]$  a curbei:  $\bar{r}(t) = (8Rt^3, 3R(2t^2 - t^4)), R > 0$ .

**Rezolvare** Avem  $\bar{r}'(t) = 12R(2t^2, t - t^3)$  și deci:

$$\|\bar{r}'(t)\| = 12R\sqrt{t^2 + 2t^4 + t^6} = 12R(t^3 + t)$$

de unde rezultă:

$$L(C|_{[0, \sqrt{2}]}) = 12R \int_0^{\sqrt{2}} (t^3 + t) dt = 12R \left( \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 12R \left( \frac{4}{4} + \frac{2}{2} \right) = 24R.$$

-----  
Pentru exercițiile următoare reamintim coordonatele polare în plan:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases} \quad (1.17)$$

și deci curbă în plan va avea ecuația în coordonate polare:

$$C : \rho = \rho(\varphi), \varphi \in I = (a, b) \subseteq \mathbb{R} \quad (1.18)$$

**S1.8** Se cere lungimea curbei în coordonate polare.

**Rezolvare** Deoarece avem ecuația vectorială:

$$C : \bar{r}(\varphi) = (\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi), \varphi \in I \quad (1.19)$$

rezultă:

$$\bar{r}'(\varphi) = (\rho' \cos \varphi - \rho \sin \varphi, \rho' \sin \varphi + \rho \cos \varphi) \quad (1.20)$$

și deci:

$$\|\bar{r}'(\varphi)\| = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}$$

ccea ce implică:

$$L(C) = \int_a^b \sqrt{\rho^2(\varphi) + (\rho'(\varphi))^2} d\varphi. \quad (1.21)$$

**S1.9** *Spirala lui Arhimede*:  $\rho(\varphi) = R\varphi$ ,  $\varphi \in \mathbb{R}$ , cu  $R > 0$  o constantă dată.

**Rezolvare** Avem din (1.21):

$$L(C|_{[a,b]}) = R \int_a^b \sqrt{1 + \varphi^2} d\varphi.$$

Reamintim:

$$\int \sqrt{1 + t^2} = \frac{1}{2} \left( t\sqrt{t^2 + 1} + \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \right)$$

și deci:

$$L(C|_{[a,b]}) = \frac{R}{2} \left( \varphi\sqrt{\varphi^2 + 1} + \ln(\varphi + \sqrt{\varphi^2 + 1}) \right) \Big|_a^b.$$

Rezultă:

$$L(C|_{[0,b]}) = \frac{R}{2} \left( b\sqrt{b^2 + 1} + \ln(b + \sqrt{b^2 + 1}) \right).$$

**S1.10** Să se reobțină lungimea cercului  $C(O, R)$  folosind coordonatele polare.

**Rezolvare** Ecuația lui  $C(O, R)$  în coordonate polare:  $\rho = \text{constant} = R$ . Din (1.21) avem:

$$L(C(O, R)) = \int_0^{2\pi} R d\varphi = 2\pi R. \quad (1.22)$$

**S1.11** Se cere lungimea arcului  $[0, 2\pi]$  a curbei:  $r(\varphi) = R(1 + \cos \varphi)$ ,  $R > 0$

**Rezolvare** Avem  $r'(\varphi) = -R \cos \varphi$  și deci:

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = R\sqrt{(1 + \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi} = R\sqrt{2 + 2 \cos \varphi} = 2R \left| \cos \frac{\varphi}{2} \right|.$$

Prin urmare:

$$L(C|_{[0, 2\pi]}) = 2R \left( \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} - \int_\pi^{2\pi} \cos \frac{\varphi}{2} \right) = 4R \left( \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_0^\pi - \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_\pi^{2\pi} \right) = 4R(1 - 0 - 0 + 1) = 8R.$$

**S1.12** (*Conice nedegenerate*)  $C : \rho(\varphi) = \frac{p}{1 - e \cos \varphi}$ ,  $\varphi \in \mathbb{R}$ , unde  $e \in [0, +\infty]$  reprezintă *excentricitatea* conicei. Avem:  $e \in [0, 1)$  pentru *elipsă* ( $e = 0$  pentru *cerc*),  $e = 1$  pentru *parabolă* și  $e > 1$  pentru *hiperbolă*. Se cere lungimea unui arc al curbei.

**Temă individuală !**

-----  
Exemple de calcul a lungimii cu MATLAB

**S1.13** ([6, p. 172]) Fie  $\bar{r} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\bar{r}(t) = (t + 2, \frac{t^2}{2} + 1)$  și vrem lungimea arcului  $[0, 2]$ .

**Rezolvare**

$$L(C|_{[0,2]}) = \int_0^2 \sqrt{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} [t\sqrt{t^2 + 1} + \ln(t + \sqrt{t^2 + 1})] \Big|_0^2 = \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5}).$$

Liniile MATLAB sunt astfel:

```
>> symst;
>> f = [t + 2  t^2/2 + 1];
>> df = diff(f, t); v = sqrt(df(1)^2 + df(2)^2);
>> s = int(v, t, 0, 2); eval(s) (+ Enter )
Answer: s = 2.9579.
```

**S1.14**



## Cursul 2

# Reperul Frenet și curburi

Fixăm în  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$  curba parametrică  $C : \bar{r} = \bar{r}(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ .

**Definiția 2.1** Numim *câmp vectorial de-a lungul lui C* o aplicație  $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n, X = (X^1, \dots, X^n)$  cu proprietatea că  $X^i : I \rightarrow \mathbb{R}$  este aplicație netedă pentru toți  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Fie  $\mathcal{X}(C)$  mulțimea acestor câmpuri vectoriale.

**Observații 2.2** i)  $\mathcal{X}(C)$  este mulțime nevidă deoarece câmpul vectorial *nul* este element al acestei mulțimi.

ii) Cum  $C$  este regulată (am fixat această ipoteză încă din Cursul 1) aplicația  $T : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  dată de:

$$T(t) = \frac{\bar{r}'(t)}{\|\bar{r}'(t)\|} \quad (2.1)$$

este un element din  $\mathcal{X}(C)$ .  $\square$

**Definiția 2.3**  $T = T(t)$  se numește *câmpul vectorial tangent* al curbei  $C$ .

**Exemplul 2.4** Reamintim cercul de rază  $R$  centrat în origine  $C(O, R) : \bar{r}(t) = R(\cos t, \sin t), t \in \mathbb{R}$ . Avem:

$$T(t) = (-\sin t, \cos t). \quad (2.2)$$

Se obține imediat că:  $\langle \bar{r}(t), T(t) \rangle = R(-\cos t \sin t + \sin t \cos t) = 0$  adică rezultatul bine-cunoscut: tangenta este perpendiculară pe rază în punctul de tangență.

**Observația 2.5** i) Reamintim că  $\mathbb{R}^n$  este spațiu vectorial real de dimensiune  $n$ . Fixăm un sistem de vectori  $S = \{v_1, \dots, v_k\}$  din  $\mathbb{R}^n$  cu  $1 \leq k \leq n$ . Cel mai mic subspațiu vectorial al lui  $\mathbb{R}^n$  ce conține pe  $S$  se notează  $\text{span}S$  sau  $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$  și este intersecția tuturor subspațiilor vectoriale ale lui  $\mathbb{R}^n$  ce conțin pe  $S$ .

ii) Fie  $S_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$  și  $S_2 = \{v'_1, \dots, v'_k\}$  ca mai sus. Presupunem că pentru orice  $i \in \{1, \dots, k\}$  avem descompunerea:  $v'_i = a_i^j v_j$  unde în membrul drept am folosit *regula Einstein* (a indicelui mut) de sumare: repetarea unui indice sus și jos semnifică sumarea după toate valorile posibile ale aceluia indice. Fie  $A = (a_i^j)_{i,j=\overline{1,k}} \in M_k(\mathbb{R})$  matricea asociată acestor sisteme de vectori via descompunerea precedentă. Putem scrie global:

$$(v'_1, \dots, v'_k) = (v_1, \dots, v_k) \cdot A$$

reamintind convenția de înmulțire a matricilor:

$$U \cdot V = (u_j^i) \cdot (v_l^j) = W = (w_l^i).$$

Deci: indicele superior indică linia iar indicele inferior indică coloana !

**Definiția 2.6** i) Sistemele  $S_1, S_2$  se numesc *la fel orientate* dacă  $\det A > 0$  respectiv *contrar orientate* dacă  $\det A < 0$ .

ii) Sistemul  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$  îl numim *pozitiv orientat* dacă este la fel orientat cu *baza canonică*  $B_c = \{e_1, \dots, e_n\}$  din  $\mathbb{R}^n$ . Reamintim că  $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  cu 1 doar pe locul  $i$ . Dacă  $S$  este contrar orientat lui  $B_c$  spunem că  $S$  este *negativ orientat*.

iii) Pentru  $n = 2$  folosim notația  $B_c = \{\bar{i}, \bar{j}\}$  iar pentru  $n = 3$  notația  $B_c = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ .

**Observații 2.7** i) Dacă  $S$  este orientat pozitiv sau negativ atunci  $S$  este sistem liniar independent. Fiind exact  $n$  vectori cât este dimensiunea spațiului  $\mathbb{R}^n$  avem că  $S$  este chiar bază în  $\mathbb{R}^n$ .

ii) Reamintim că dimensiunea unui spațiu vectorial este numărul maxim de vectori liniar independenți din acel spațiu și că un sistem de exact  $n$  vectori liniar independenți (sau sistem de generatori) într-un spațiu vectorial  $n$  dimensional este obligatoriu bază în acel spațiu vectorial.

Următoarea noțiune fundamentală a teoriei curbelor este:

**Definiția 2.8** Numim *bază Frenet* pentru curba parametrică  $C$  un sistem  $\{X_1, \dots, X_n\} \in \mathcal{X}(C)$  satisfăcând pentru orice  $t \in I$  proprietățile următoare:

F1)  $\langle X_i(t), X_j(t) \rangle = \delta_{ij}$  pentru toți  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ . Reamintim că  $(\delta_{ij})$  este *simbolul Kronecker* fiind 1 pentru  $i = j$  și 0 în rest.

F2)  $\text{span}\{X_1(t), \dots, X_k(t)\} = \text{span}\left\{\frac{d\bar{r}}{dt}(t), \dots, \frac{d^k \bar{r}}{dt^k}(t)\right\}$  pentru toți  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ .

F3) Sistemele de vectori din F2 sunt la fel orientate.

F4) Sistemul de vectori  $\{X_1(t), \dots, X_n(t)\}$  este pozitiv orientat.

Ansamblul  $RF(\bar{r}(t)) = \{\bar{r}(t); X_1(t), \dots, X_n(t)\}$  se numește *reperul Frenet în punctul  $P(\bar{r}(t)) \in C$* . O curbă ce admite bază Frenet se numește *curbă Frenet*.

**Observații 2.9** i) Condițiile F1+F4 spun că  $\{X_1(t), \dots, X_n(t)\}$  este o *bază ortonormată* în  $\mathbb{R}^n$  pentru orice  $t \in I$ .

ii) Pentru  $k = 1$  din F2 avem că vectorii  $X_1(t), \bar{r}'(t)$  sunt *coliniari* deci există scalarul  $\lambda(t) \in \mathbb{R}$  așa încât:  $X_1(t) = \lambda(t)\bar{r}'(t)$ . Condiția F3 pentru  $k = 1$  spune că  $\lambda(t) > 0$ . Cu alegerea  $\lambda(t) = \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|}$  care este scalar strict pozitiv (motivată de ortonormare !) obținem:

$$X_1(t) = T(t). \quad (2.3)$$

Conform discuției din Observația 2.7 suntem conduși la introducerea următorului tip de curbe:

**Definiția 2.10** Curba  $C$  se numește *în poziție generală* dacă pentru orice  $t \in I$  sistemul  $\left\{\frac{d\bar{r}}{dt}(t), \dots, \frac{d^{n-1}\bar{r}}{dt^{n-1}}(t)\right\}$  este liniar independent. Pentru  $n = 3$  folosim denumirea de *curbă biregulară*.

**Observația 2.11** Pentru  $n = 2$  poziția generală este echivalentă cu regularitatea.

Un rezultat central al teoriei curbelor este:

**Teorema 2.12** (de existență și unicitate a bazei Frenet) *Dacă  $C$  este în poziție generală atunci  $C$  este curbă Frenet. Mai mult, baza Frenet este unică.*



Nu vom demonstra acest rezultat general dar să observăm că dacă  $X \in \mathcal{X}(C)$  atunci câmpul vectorial derivat  $X' = (X'_1, \dots, X'_n)$  aparține lui  $\mathcal{X}(C)$  și mai general  $X^{(k)} = (\frac{d^k X_1}{dt^k}, \dots, \frac{d^k X_n}{dt^k}) \in \mathcal{X}(C)$  pentru orice  $k \in \mathbb{N}$  cu convenția  $X^{(0)} = X$ .

În continuare presupunem  $C$  în poziție generală. Vectorul  $X'_i(t)$  se descompune unic în baza  $\{X_1(t), \dots, X_n(t)\}$  și deci există funcțiile  $a_i^j : I \rightarrow \mathbb{R}$  date de:

$$X'_i(t) = a_i^j(t)X_j(t) \quad (2.4)$$

și cum toate funcțiile ce intervin mai sus sunt netede rezultă că și toate  $a_i^j$  sunt funcții netede. Pentru o abordare globală introducem matricea de funcții:  $A(\cdot) = (a_i^j(\cdot))_{i,j=\overline{1,n}}$  și atunci relațiile (2.4) se scriu unitar:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} (t) = A(t)^t \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} (t) \quad (2.5)$$

cu  $A^t$  transpusa matricii  $A$ .

**Propoziția 2.17** Matricea  $A$  satisface:

i) este antisimetrică, adică matricea transpusă satisface:  $A^t = -A$  i.e.:

$$a_i^j(t) = -a_j^i(t). \quad (2.6)$$

ii) pentru  $j > i + 1$  avem:

$$a_i^j \equiv 0. \quad (2.7)$$

**Demonstrație** i) Derivăm F1 cu regula Leibniz și avem:

$\langle X'_i(t), X_j(t) \rangle + \langle X_i(t), X'_j(t) \rangle = 0$  care este exact (2.6) scrisă:  $a_i^j(t) + a_j^i(t) = 0$ .

ii) Din F2 avem că:  $X_i \in \text{span}\{\frac{d\bar{r}}{dt}(t), \dots, \frac{d^i \bar{r}}{dt^i}(t)\}$  ceea ce implică:

$X'_i(t) \in \text{span}\{\frac{d^2 \bar{r}}{dt^2}(t), \dots, \frac{d^{i+1} \bar{r}}{dt^{i+1}}(t)\} = \text{span}\{X_1(t), \dots, X_{i+1}(t)\}$  și această relație dă (2.7).  $\square$

**Definiția 2.13** Fie curba  $C$  în poziție generală. Funcțiile  $K_i : I \rightarrow \mathbb{R}$  date de:

$$K_i(t) = \frac{a_i^{i+1}(t)}{\|\bar{r}'(t)\|} \quad (2.8)$$

sunt netede pentru orice  $i \in \{1, \dots, n-1\}$  și se numesc *curburile lui  $C$  în punctul  $P(\bar{r}(t)) \in C$* .

**Cazuri particulare**

I)  $n = 2$  deci avem curba regulată  $C : \bar{r}(t) = (x(t), y(t)), t \in I$ . Avem:

$$X_1(t) = T(t) = \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|} (x'(t), y'(t)). \quad (2.9)$$

Versorul  $X_2$  se notează  $N$  și se numește *câmpul vectorial normal*.

Căutăm  $N$  de forma:  $N(t) = (u(t), v(t))$ . Condiția  $F_1$  devine:

$$\begin{cases} \|N(t)\|^2 = u^2(t) + v^2(t) = 1 \\ \langle T(t), N(t) \rangle = x'(t)u(t) + y'(t)v(t) = 0. \end{cases} \quad (2.10)$$

Regularitatea înseamnă  $(x')^2 + (y')^2 > 0$  și vom presupune că  $y' \neq 0$ ; în caz contrar avem  $x' \neq 0$  și în discuția următoare schimbăm rolurile lui  $x$  și  $y$ . Din a doua relație avem:  $v = -\frac{x'}{y'}u$  care înlocuită în prima dă:  $u^2 \left(1 + \frac{x'^2}{y'^2}\right) = 1$  cu soluția:  $u = \frac{\varepsilon y'}{\|\bar{r}'\|}$  pentru  $\varepsilon = \pm 1$ . Revenind la  $v$  obținem:  $v = \frac{-\varepsilon x'}{\|\bar{r}'\|}$  și deci:

$$N(t) = \frac{\varepsilon}{\|\bar{r}'(t)\|} (y'(t), -x'(t))$$

și vom determina  $\varepsilon$  din F4. Astfel, matricea cu prima coloana  $T(t)$  și a doua coloană  $N(t)$ :

$$\begin{pmatrix} \frac{x'}{\|\bar{r}'\|} & \frac{\varepsilon y'}{\|\bar{r}'\|} \\ \frac{y'}{\|\bar{r}'\|} & \frac{-\varepsilon x'}{\|\bar{r}'\|} \end{pmatrix}$$

trebuie să aibă determinantul pozitiv. Dar determinantul acestei matrici este  $(-\varepsilon)$  și deci:  $\varepsilon = -1$ . În concluzie:

$$N(t) = \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|} (-y'(t), x'(t)). \quad (2.11)$$

În fapt, expresia lui  $N$  se deduce pe o cale mai rapidă astfel: din condiția de ortonormare în plan avem  $N(t) = i \cdot T(t)$  cu  $i$  unitatea complexă, deoarece înmulțirea cu  $i$  semnifică o rotație de  $90^\circ$  în sens trigonometric=sensul anti-orar. Matricea  $A$  este:

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & -a_1^2(t) \\ a_1^2(t) & 0 \end{pmatrix}$$

cu:

$$a_1^2(t) = \langle X_1'(t), X_2(t) \rangle = \langle T'(t), N(t) \rangle .$$

Derivăm câmpul vectorial tangent din (2.9) ca o fracție:

$$T'(t) = \frac{\bar{r}'' \|\bar{r}'\| - \bar{r}' \frac{d}{dt}(\|\bar{r}'\|)}{\|\bar{r}'\|^2} = \frac{\bar{r}''(t)}{\|\bar{r}'(t)\|} - T(t) \cdot \frac{d}{dt}(\ln \|\bar{r}'\|). \quad (2.12)$$

Cum  $N(t)$  este ortogonal pe  $T(t)$  rezultă:

$$a_1^2(t) = \langle \frac{\bar{r}''(t)}{\|\bar{r}'(t)\|}, N(t) \rangle$$

și din relația (2.11) obținem:

$$a_1^2(t) = \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|^2} \langle (x''(t), y''(t), (-y'(t), x'(t))) \rangle .$$

În concluzie, avem o singură curbă, notată  $k$ , cu expresia:

$$\boxed{k(t) = \frac{-x''(t)y'(t) + y''(t)x'(t)}{\|\bar{r}'(t)\|^3}}. \quad (2.13)$$

Observăm că funcția curbă poate avea orice semn; un punct  $P(\bar{r}(t)) \in C$  se numește *inflexionar* dacă  $k(t) = 0$  respectiv *vârf* dacă este punct critic al curburii i.e.  $k'(t) = 0$ .

II)  $n = 3$ , deci avem curba biregulară  $C : \bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), t \in I$ . Avem:

$$X_1(t) = T(t) = \frac{1}{\|\bar{r}'(t)\|} (x'(t), y'(t), z'(t)). \quad (2.14)$$

$X_2$  se notează tot  $N$  și ca la curbe în plan se numește *câmpul vectorial normal* iar  $X_3$  se notează  $B$  și se numește *câmpul vectorial binormal*.

Din  $\langle T(t), T(t) \rangle = 1$  prin derivare cu regula Leibniz avem:  $2 \langle T'(t), T(t) \rangle = 0$  deci  $T'(t)$  este perpendicular pe  $T(t)$ . Avem aceeași formulă (2.12) iar biregularitatea implică:  $T'(t) \neq \bar{0}$ . În concluzie:

$$\begin{cases} N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} \\ B(t) = T(t) \times N(t) \end{cases} \quad (2.15)$$

unde  $\times$  este produsul vectorial din  $\mathbb{R}^3$ .

Avem:

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & -a_1^2(t) & 0 \\ a_1^2(t) & 0 & -a_2^3(t) \\ 0 & a_2^3(t) & 0 \end{pmatrix}$$

cu:

$$\begin{cases} a_1^2(t) = \langle T'(t), N(t) \rangle = - \langle T(t), N'(t) \rangle \\ a_2^3(t) = \langle N'(t), B(t) \rangle = - \langle N(t), B'(t) \rangle. \end{cases}$$

Astfel:  $a_1^2(T) = \langle T'(t), \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} \rangle = \|T'(t)\| > 0$ .  $K_1$  se numește *curbura* și ca la curbe în plan se notează  $k$  iar  $K_2$  se numește *torsiunea* și se notează  $\tau$ .

Avem prin derivarea primei relații următoare și utilizarea lui (2.5):

$$\begin{cases} \bar{r}'(t) = \|\bar{r}'(t)\| T(t) \\ \bar{r}''(t) = \frac{d}{dt} (\|\bar{r}'(t)\|) T(t) + \|\bar{r}'(t)\| T'(t) = (\dots) T(t) + \|\bar{r}'(t)\| a_1^2(t) N(t) \\ \bar{r}'''(t) = (\dots) T + (\dots) N + \|\bar{r}'\| a_1^2 N' = (\dots) T + (\dots) N + \|\bar{r}'\| a_1^2 a_2^3 B. \end{cases} \quad (2.16)$$

Facem produsul vectorial al primelor două relații:

$$\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = \|\bar{r}'(t)\|^2 a_1^2(t) B(t)$$

și cum  $B(t)$  este versor avem:

$$k(t) = \frac{\|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\|}{\|\bar{r}'(t)\|^3}. \quad (2.17)$$

Facem acum produsul mixt al vectorilor din (2.16):

$$(\bar{r}', \bar{r}'', \bar{r}''') = (\|\bar{r}'\| T, \|\bar{r}'\| a_1^2 N, \|\bar{r}'\| a_1^2 a_2^3 B) = \|\bar{r}'\|^3 (a_1^2)^2 a_2^3$$

deoarece  $(T, N, B) = (\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}) = 1$ . Obținem:

$$a_2^3 = \frac{\|\bar{r}'\|^4 (\bar{r}', \bar{r}'', \bar{r}''')}{\|\bar{r}'\|^3 \|\bar{r}' \times \bar{r}''\|^2}$$

și, în concluzie, expresia torsiunii este:

$$\tau(t) = \frac{(\bar{r}'(t), \bar{r}''(t), \bar{r}'''(t))}{\|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\|^2}. \quad (2.18)$$

Observăm că  $k > 0$  dar torsiunea poate avea orice semn.

## SEMINARUL 2

**S2.1** Să se studieze  $C(O, R)$  din punct de vedere Frenet.

**Rezolvare** Câmpul vectorial tangent este dat de (2.2) iar din (2.11) obținem:  $N = (-\cos t, -\sin t) = -\frac{\bar{r}(t)}{R}$ . Deci câmpul vectorial normal este îndreptat spre interiorul cercului, mai precis spre originea planului, iar  $\langle T, N \rangle = 0$  este expresia analitică a faptului binecunoscut: raza este perpendiculară pe tangentă. Avem din (2.13):

$$k(t) = \frac{-(-R \cos t)R \cos t + (-R \sin t)(-R \sin t)}{R^3} = \frac{R^2}{R^3} = \frac{1}{R} \quad (2.19)$$

în acord cu viziunea geometrică: cercul este "curbat" peste tot la fel!  
Cercul nu are puncte de inflexiune dar toate punctele sale sunt vârfuri.

**S2.2** Să se studieze dreapta în plan din punct de vedere Frenet.

**Rezolvare** Reamintim că avem ecuația dreptei în plan  $d : \bar{r}(t) = (x_0 + ta, y_0 + tb)$  cu  $M_0(x_0, y_0)$  un punct fixat al dreptei respectiv  $\bar{u} = (a, b) \neq \bar{0}$  vectorul director al lui  $d$ . Rezultă:  $\bar{r}'(t) = \bar{u}$  și  $\bar{r}'' \equiv \bar{0}$ . Obținem deci:  $T(t) = \frac{\bar{u}}{\|\bar{u}\|} = \text{constant}$ ,  $N(t) = \frac{1}{\|\bar{u}\|}(-b, a)$  respectiv  $k \equiv 0$  în acord cu viziunea geometrică: dreapta nu este curbată deloc!

**S2.3** Să se studieze dreapta în spațiu din punct de vedere Frenet.

**Rezolvare** Deoarece  $\bar{r}'' = \bar{0}$  (ca mai sus) rezultă că dreapta considerată în spațiu nu este biregulată. Dar orice dreaptă din spațiu este inclusă într-un plan  $\pi$  și eventual aplicând o rotație și o translație putem presupune că  $\pi = xOy$  ceea ce conduce la problema anterioară.

**S2.4** Să se arate că formula (2.17) se reduce la (2.13) pentru o curbă în plan.

**Rezolvare** Deoarece  $\bar{r}(t) = (x(t), y(t))$ , 0 rezultă:

$$\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x'(t) & y'(t) & 0 \\ x''(t) & y''(t) & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -x''(t)y'(t) + y''(t)x'(t))$$

ceea ce dă concluzia (renunțând la ipoteza de pozitivitate din spațiu). Obținem astfel o nouă formulă pentru curbura unei curbe în plan:

$$k(t) = \frac{\det(\bar{r}'(t), \bar{r}''(t))}{\|\bar{r}'(t)\|^3}. \quad (2.20)$$

**S2.5** Se cere curbura *elipsei*  $E : \bar{r}(t) = (a \cos t, b \sin t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$  (sau  $t \in [0, 2\pi]$ ) cu  $a > 0, b > 0$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = (-a \sin t, b \cos t)$  și  $\bar{r}''(t) = (-a \cos t, -b \sin t) = -\bar{r}$ . Rezultă:

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.21)$$

și deci elipsa nu are puncte inflexionare. Deoarece:

$$k'(t) = \frac{3ab(b^2 - a^2) \sin t \cos t}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{\frac{5}{2}}} \quad (2.22)$$

rezultă că elipsa are 4 vârfuri, exact intersecțiile cu axele:  $t \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$ .

**S2.6** Se cere curbura (ramurei pozitive a) hiperbolei  $H : \bar{r}(t) = (acht, bsht), t \in \mathbb{R}$  cu  $a > 0, b > 0$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = (asht, bcht)$  și  $\bar{r}''(t) = (acht, bsht) = \bar{r}(t)$ . Rezultă:

$$k(t) = \frac{-ab}{(a^2 sh^2 t + b^2 ch^2 t)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.23)$$


și deci hiperbola nu are puncte de inflexiune. Deoarece:

$$k'(t) = \frac{-3ab(a^2 + b^2)shcht}{(a^2 sh^2 t + b^2 ch^2 t)^{\frac{5}{2}}} \quad (2.24)$$

rezultă că hiperbola are un singur vârf, intersecția cu axa  $Ox$ :  $t = 0$  unde se anulează funcția  $sh$ . Reamintim că  $cht \geq 1$  pentru orice  $t \in \mathbb{R}$ .

**S2.7** Se cere curbura curbei  $C : \bar{r}(t) = (\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t), t \in \mathbb{R}$ .


**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}(t) = (t \cos t, t \sin t)$  și  $\bar{r}''(t) = (\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t)$  de unde rezultă  $k(t) = \frac{1}{t}$ . Deci trebuie scos  $t = 0$  din domeniul de definiție, curba nu are puncte de inflexiune și nici vârfuri.



Imaginea curbei.

**S2.8** Se cere curbura cicloidei.


**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}''(t) = R(\sin t, \cos t)$  și deci:  $k(t) = \frac{-1}{4R \sin \frac{t}{2}}$  ceea ce spune că cicloida nu are puncte de inflexiune dar din domeniul de definiție trebuie scoase punctele:  $t_k = 2k\pi$  cu  $k \in \mathbb{Z}$ . Cum:  $k'(t) = \frac{\cos \frac{t}{2}}{8r \sin^2 \frac{t}{2}}$  rezultă că vârfurile cicloidei sunt:  $t_k = (2k + 1)\pi$  cu  $k \in \mathbb{Z}$ .



Imaginea cicloidei.

**S2.9** Se cere curbura astroidei.

**Rezolvare** Avem:  $\vec{r}''(t) = 3R(2 \cos t \sin^2 t - \cos^3 t, 2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t)$  și deci:  $k(t) = \frac{-1}{3R \sin t \cos t}$  ceea ce spune că astroida nu are puncte de inflexiune dar din domeniul de definiție trebuie scoase punctele:  $t_k = \frac{k\pi}{2}$  cu  $k \in \mathbb{Z}$ . Scriind:  $k(t) = \frac{-2}{3R \sin 2t}$  avem:  $k'(t) = \frac{4 \cos 2t}{3R \sin^2 2t}$  ceea ce spune că vârfurile astroidei sunt:  $t_k = \frac{(2k+1)\pi}{2}$  cu  $k \in \mathbb{Z}$ .



Imaginea astroidei.

**S2.10** Se cere curbura spiralei logaritmice.

**Rezolvare** Avem:  $\vec{r}''(t) = Re^{kt}(k^2 \cos t - 2k \sin t + \cos t, k^2 \sin t + 2k \cos t - \sin t)$  și deci:  $k(t) = \frac{e^{-kt}}{R\sqrt{k^2+1}}$ . Spirala logaritmică nu are puncte de inflexiune și nici vârfuri.

**S2.11** (Curbura în coordonate polare) Pentru  $C : \rho = \rho(\varphi)$  avem:

$$k(\varphi) = \frac{2(\rho')^2 + \rho^2 - \rho\rho''}{(\rho^2 + (\rho')^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (2.25)$$

**Rezolvare** Derivând (1.20) obținem:

$$\vec{r}''(\varphi) = (\rho'' \cos \varphi - 2\rho' \sin \varphi - \rho \cos \varphi, \rho'' \sin \varphi + 2\rho' \cos \varphi - \rho \sin \varphi) \quad (2.26)$$

și un calcul imediat dă formula (2.25).

**S2.12** Se cere curbura lemniscatei  $C : \rho(\varphi) = R\sqrt{\cos 2\varphi}$ .

**Rezolvare** Cu formula (2.25) obținem:  $k(\varphi) = \frac{3}{R}\sqrt{\cos 2\varphi}$ .

**S2.13** (Curbura graficelor) Se dă curba grafic  $C : \vec{r}(t) = (t, f(t)), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ . Se cere curbura lui  $C$ .

**Rezolvare** Avem:  $\vec{r}''(t) = (0, f''(t))$  ceea ce dă:

$$k(t) = \frac{f''(t)}{(1 + (f')^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.27)$$

și deci  $C$  are ca puncte de inflexiune zerourile lui  $f''$ .

**S2.14** (Curbura curbilor implicite) Se dă curba definită implicit  $C : F(x, y) = 0$ . Se cere curbura lui  $C$ .

**Rezolvare** Vom parametriza curba  $C$  ca în exercițiul precedent  $C : \vec{r}(t) = (t, f(t))$ ; deci  $F(t, f(t)) = 0$  și derivând această relație obținem:  $F_x + F_y \cdot f' = 0$  ceea ce conduce la:  $f' = -\frac{F_x}{F_y}$ . Mai derivând odată avem:

$$f'' = -\frac{F_x^2 F_{yy} - 2F_x F_y F_{xy} + F_y^2 F_{xx}}{F_y^3}$$

și înlocuind în formula (2.27) obținem:

$$k(x, y) = -\frac{F_x^2 F_{yy} - 2F_x F_y F_{xy} + F_y^2 F_{xx}}{(F_x^2 + F_y^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.28)$$

sau încă:

$$k(x, y) = \frac{-\Delta}{\|\nabla F\|^3} \quad (2.29)$$

unde:

$$\Delta = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{xy} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix}.$$

**S2.15** Să se reobțină curbura lui  $C(O, R)$ .

**Rezolvare** Din  $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$  rezultă:  $\nabla F = 2(x, y)$  și deci  $\|\nabla F\| = 2R$ :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2x \\ 0 & 2 & 2y \\ 2x & 2y & 0 \end{vmatrix} = -8(x^2 + y^2) = -8R^2.$$

**S2.16** Se cere curbura:

i) elipsei  $E : F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ ,

ii) hiperbolei  $H : F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ .

**S2.17** Fie curba plană  $C : \bar{r} = \bar{r}(t)$ ,  $t \in I = (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Definim curba *reverse*  $C^r : \bar{R} = \bar{r}(-t)$ ,  $t \in I$ . Să se arate că între curburile acestor curbe avem relația:  $k^r(t) = -k(-t)$ , pentru orice  $t \in I$ .


**Rezolvare** Avem:  $\bar{R}'(t) = -\bar{r}'(-t)$  și  $\bar{R}''(t) = \bar{r}''(-t)$ . Folosim formula (2.13) :

$$\begin{aligned} k^r(t) &= \frac{(x^r)'(t)(y^r)''(t) - (y^r)'(t)(x^r)''(t)}{\|\bar{R}'(t)\|^3} = \frac{-x'(-t)y''(-t) + y'(-t)x''(-t)}{\|-\bar{r}'(-t)\|^3} = \\ &= -\frac{x'(-t)y''(-t) - y'(-t)x''(-t)}{\|\bar{r}'(-t)\|^3} = -k(-t). \end{aligned}$$

Rezultă imediat și modificarea bazei Frenet:  $T^r(t) = -T(-t)$  și  $N^r(-t) = -N(-t)$ . Obținem astfel și o imagine geometrică pentru semnul curburii: dacă  $C$  se rotește în sens trigonometric avem  $k > 0$  iar dacă  $C$  se rotește în sens orar avem  $k < 0$  !

**S2.18** Se cere curbura pentru *curba cardioidă*  $C : \bar{r}(t) = (2 \cos t - \cos 2t, 2 \sin t - \sin 2t)$ ,  $t \in (0, 2\pi)$ . Informații generale: <http://en.wikipedia.org/wiki/Cardioid>

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = 2(\sin 2t - \sin t, \cos t - \cos 2t)$ ,  $\bar{r}''(t) = 2(2 \cos 2t - \cos t, 2 \sin 2t - \sin t)$  și în final obținem:  $k(t) = \frac{3}{32 \sin \frac{t}{2}}$  ceea ce înseamnă că  $\lim_{t \rightarrow 0, 2\pi} = +\infty$ .



Imaginea cardioidei.





## Cursul 3

# Teorema fundamentală a curbelor

Fixăm curba  $C$  în  $\mathbb{R}^n$  și fie o parametrizare oarecare a sa  $C : \bar{r} = \bar{r}(t), t \in I$ . Pentru a studia geometria lui  $C$  fie  $\varphi : J \rightarrow I$  un difeomorfism și ca în Cursul 1 notăm  $t = \varphi(u)$ . Considerăm noua parametrizare  $C : \bar{R} = \bar{R}(u), u \in J$  cu  $\bar{R} = \bar{r} \circ \varphi$ . Reamintim relația (1.5):

$$\bar{R}'(u) = \varphi'(u) \cdot \bar{r}'(t) \quad (3.1)$$

și tot ca în primul Curs, presupunem, pentru simplificare, că difeomorfismul  $\varphi$  este strict crescător. Trecând la norme în relația precedentă avem:

$$\|\bar{R}'(u)\| = \varphi'(u) \|\bar{r}'(t)\|. \quad (3.2)$$

Prin calcul obținem imediat:

**Propoziția 3.1** *Dacă  $(X_1, \dots, X_n)$  este o bază Frenet pentru parametrizarea  $\bar{r}$  atunci  $(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n)$  cu  $\bar{X}_i = X_i \circ \varphi$  este o bază Frenet pentru parametrizarea  $\bar{R}$ .*

Prin urmare putem considera curburile  $\bar{K}_i$  pentru parametrizarea  $\bar{R}$ . Un rezultat central al teoriei curbelor este:

**Teorema 3.2** *Curburile sunt invariante geometrice ai lui  $C$  adică  $\bar{K}_i = K_i$  pentru  $1 \leq i \leq n - 1$ .*

**Demonstrație** Avem:

$$\bar{K}_i(u) = \frac{\bar{a}_i^{i+1}(u)}{\|\bar{R}'(u)\|} = \frac{\langle \bar{X}'_i(u), \bar{X}_{i+1}(u) \rangle}{\varphi'(u) \|\bar{r}'(t)\|} = \frac{\langle \varphi'(u) X'_i(t), X_{i+1}(t) \rangle}{\varphi'(u) \|\bar{r}'(t)\|} = K_i(t)$$

ceea ce dă concluzia.  $\square$

**Definiția 3.3** *Distanța euclidiană pe  $\mathbb{R}^n$  este:  $d(M_1(\bar{r}_1), M_2(\bar{r}_2)) = \|\bar{r}_2 - \bar{r}_1\|$ ; perechea  $\mathbb{E}^n = (\mathbb{R}^n, d)$  o numim spațiul euclidian  $n$ -dimensional iar geometria sa o numim geometria euclidiană  $n$ -dimensională. Funcția  $f : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$  o numim izometrie dacă este surjectivă și invariază distanțele:  $d(f(M_1), f(M_2)) = d(M_1, M_2)$  pentru orice puncte  $M_i \in \mathbb{E}^n$ . Fie  $Izom(n)$  mulțimea izometriilor euclidiene.*

Un rezultat fundamental al geometriei euclidiene este faptul că dată  $f \in Izom(n)$  există un unic vector  $f_0 \in \mathbb{R}^n$  și o unică matrice  $R_f \in O(n)$  așa încât pentru orice  $x \in \mathbb{R}^n$  avem:

$$f(x) = R_f \cdot x + f_0 \quad (3.3)$$

unde primul termen din membrul drept este înmulțirea dintre matricea pătratică  $R_f$  de ordin  $n$  și vectorul coloană  $x$ ! Deci  $Izom(n) = O(n) \oplus \mathbb{R}^n$  unde  $O(n)$  este grupul *matricilor ortogonale*:

$$R^t \cdot R = R \cdot R^t = I_n \quad (3.4)$$

unde  $I_n$  este matricea unitate de ordin  $n$ . Linia  $i \in \{1, \dots, n\}$  din relația (3.3) este:

$$f^i(x) = R_j^i x^j + f_0^i \quad (3.5)$$

dacă  $R_f = (R_j^i)_{i,j=1,\dots,n}$  și  $f_0 = (f_0^i)_{i=1,\dots,n}$ .

**Propoziția 3.4** Fie curba parametrică  $\bar{r} = \bar{r}(t), t \in I$  și  $f \in Izom(n)$ . Atunci  $\bar{R} = f \circ \bar{r}(t), t \in I$  este o curbă parametrică cu proprietățile:

- i)  $\bar{R}' = R_f \cdot \bar{r}'$  și deci  $\bar{R}^{(k)} = R_f \cdot \bar{r}^{(k)}$  pentru orice  $k \geq 1$ ,
- ii)  $\|\bar{R}^{(k)}\| = \|\bar{r}^{(k)}\|$ ,
- iii) dacă  $\bar{r}$  este în poziție generală atunci  $\bar{R}$  este în poziție generală.

**Demonstrație** i) Avem linia  $i$ :

$$(\bar{R}'(t))^i = \frac{df^i}{dx^j}(\bar{r}(t)) \cdot \frac{dx^j}{dt}(t) = R_j^i \cdot (\bar{r}'(t))^j = (R_f \cdot \bar{r}'(t))^i$$

ceea ce voiam. Pentru  $k \geq 2$  derivăm prima relație din i).

ii) Cum  $R_f$  invariază norma avem concluzia.

iii) Un calcul imediat ce folosește i) și ii).  $\square$

**Propoziția 3.5** Fie  $\bar{r} = \bar{r}(t), t \in I$  o curbă în poziție generală,  $(X_1, \dots, X_n)$  baza Frenet asociată și  $f \in Izom(n)$ . Atunci:

- i)  $(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n)$  cu  $\bar{X}_i = R_f \cdot X_i$  este baza Frenet a curbei  $\bar{R} = f \circ \bar{r}$ ,
- ii)  $\bar{K}_i = K_i$  pentru toți  $i \in \{1, \dots, n-1\}$ .

**Demonstrație** i) Un calcul imediat folosind propoziția precedentă. Spre exemplu, pentru F1):

$$\langle \bar{X}_i(t), \bar{X}_j(t) \rangle = \langle R_f X_i(t), R_f X_j(t) \rangle = \langle X_i(t), X_j(t) \rangle = \delta_{ij}.$$

ii) Avem:

$$\bar{a}_i^j(t) = \langle \bar{X}_i'(t), \bar{X}_j(t) \rangle = \langle R_f X_i'(t), R_f X_j(t) \rangle = \langle X_i'(t), X_j(t) \rangle = a_i^j(t)$$

și deci:

$$\bar{K}_i(t) = \frac{\bar{a}_i^{i+1}(t)}{\|\bar{R}'(t)\|} = \frac{a_i^{i+1}(t)}{\|\bar{r}'(t)\|} = K_i(t)$$

ceea ce dă concluzia.  $\square$

Reciproca acestui rezultat este dată de:

**Propoziția 3.6** Fie  $\bar{r}, \bar{R} : I \rightarrow \mathbb{E}^n$  două curbe în poziție generală satisfăcând pentru orice  $t \in I$  identitățile:

$$\begin{cases} \|\bar{r}'(t)\| = \|\bar{R}'(t)\| \\ K_i(t) = \bar{K}_i(t), 1 \leq i \leq n-1. \end{cases}$$

Atunci există și este unică o izometrie  $f \in Izom(n)$  așa încât:  $\bar{R} = f \circ \bar{r}$ .

**Demonstrație** Vom arăta doar partea de existență, partea de unicitate rezultând din unicitatea soluției problemei Cauchy pentru un sistem diferențial ordinar.

Fixăm  $t_0 \in I$  și fie bazele Frenet ale celor două curbe:  $(X_1, \dots, X_n)$  respectiv  $(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n)$ . Există o unică matrice  $R \in O(n)$  așa încât pentru toți  $i \in \{1, \dots, n\}$  să avem:

$$R \cdot X_i(t_0) = \bar{X}_i(t_0).$$

Există apoi o unică  $f \in Izom(n)$  așa încât:  $R_f = R$  și  $f(\bar{r}(t_0)) = \bar{R}(t_0)$ .  $f$  este izometria cerută.  $\square$

Să observăm că izometria dată de Propoziția precedentă este proprie ( $\det R_f = +1$ ) deoarece bazele  $(X_1(t_0), \dots, X_n(t_0))$ ,  $(\bar{X}_1(t_0), \dots, \bar{X}_n(t_0))$  sunt ambele pozitiv orientate! Rezultatul central al teoriei curbelor este dat de:

**Teorema 3.7 (Teorema fundamentală a curbelor)** *Fie intervalul  $I \subseteq \mathbb{R}$  și funcțiile netede  $F_i : I \rightarrow \mathbb{R}$  cu  $F_j > 0$  pentru  $1 \leq j \leq n - 2$ . Atunci există o curbă parametrică  $C : \bar{r} = \bar{r}(s), s \in I$ , unică până la o izometrie proprie relativ la proprietățile:*

- 1)  $\|\bar{r}'(s)\| = 1$  i.e.  $s$  este parametrul canonic al lui  $C$ ,
- 2)  $K_i = F_i$  pentru  $1 \leq i \leq n - 1$ .

Teorema fundamentală spune că, fiind fixat parametrul canonic, avem că funcțiile curburi sunt *toți* invarianții euclidiani ai unei curbe date. Spre exemplu, am calculat în S2.2 că dreapta în plan are curbura zero; în acord atunci și cu S2.3 concluzionăm:

**Propoziția 3.8** *Curbele în plan și spațiu cu  $k \equiv 0$  sunt doar dreptele. Altfel spus, o curbă în plan cu toate punctele inflexionare este obligatoriu o dreaptă.*

Analog, în S2.1 am arătat că curbura cercului este constantă. Deci:

**Propoziția 3.9** *Curbele în plan de curbură constantă strict pozitivă  $k$  sunt cercurile de rază  $R = \frac{1}{k}$ . Altfel spus, o curbă în plan cu toate punctele vârfuri este obligatoriu un cerc.*

Pagini Web utile:

- 1) [http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental\\_theorem\\_of\\_curves](http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_curves)
- 2) <http://mathworld.wolfram.com/FundamentalTheoremofSpaceCurves.html>
- 3) <http://planetmath.org/FundamentalTheoremOfSpaceCurves.html>

### SEMINARUL 3

**S3.1 (Elicea circulară)** Se cer versorii Frenet, curbura și torsiunea pentru  $C : \bar{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ,  $t \in \mathbb{R}$  cu  $a > 0, b > 0$  constante date.

**Rezolvare** Avem:

$$\begin{cases} \bar{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b) \\ \bar{r}''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0) \\ \bar{r}'''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 0) \\ \|\bar{r}'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = a(b \sin t, -b \cos t, a) \\ \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = a\sqrt{a^2 + b^2} \\ (\bar{r}'(t), \bar{r}''(t), \bar{r}'''(t)) = a^2b \end{cases}$$

ceea ce conduce la:

$$\begin{cases} T(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-a \sin t, a \cos t, b), B(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(b \sin t, -b \cos t, a), N(t) = (-\cos t, -\sin t, 0) \\ k(t) = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau(t) = \frac{b}{a^2 + b^2}. \end{cases}$$

Remarcăm că  $k$  și  $\tau$  sunt ambele constante (și strict pozitive).

**S3.2** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (1, t, \frac{t^2}{2}), t \in \mathbb{R}$ . Ce conică este  $C$  și în ce plan este situată?

**Rezolvare** Avem:

$$\begin{cases} \bar{r}'(t) = (0, 1, t) \\ \bar{r}''(t) = (0, 0, 1) \\ \bar{r}'''(t) = (0, 0, 0) \\ \|\bar{r}'(t)\| = \sqrt{1+t^2} \\ \bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = (1, 0, 0) \\ \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = 1 \\ (\bar{r}'(t), \bar{r}''(t), \bar{r}'''(t)) = 0 \end{cases}$$

ceea ce conduce la:

$$T(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}(0, 1, t), B(t) = (1, 0, 0), N(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}(0, -t, 1), \quad k(t) = \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \tau(t) = 0.$$

$C$  este o parabolă în planul  $x = 1$ .

**S3.3** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = \frac{1}{2}(t, \frac{1}{t}, \sqrt{2} \ln t), t \in \mathbb{R}_+^*$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = \frac{1}{2}(1, -\frac{1}{t^2}, \frac{\sqrt{2}}{t}), \bar{r}''(t) = \frac{1}{2}(0, \frac{2}{t^3}, -\frac{\sqrt{2}}{t^2}), \bar{r}'''(t) = \frac{1}{2}(0, -\frac{6}{t^4}, \frac{2\sqrt{2}}{t^3}),$   
 $\|\bar{r}'(t)\| = \frac{t^2+1}{2t^2}, \bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = \frac{1}{4t^4}(-\sqrt{2}, \sqrt{2}t^2, 2t), \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = \frac{\sqrt{2}(t^2+1)}{4t^4}, (\bar{r}', \bar{r}'', \bar{r}''') =$   
 $-\frac{\sqrt{2}}{4t^6}$ . Obținem:  $k(t) = -\tau(t) = \frac{2\sqrt{2}t^2}{(t^2+1)^2}$ . Reperul Frenet:

$$T(t) = \frac{1}{t^2+1}(t^2, -1, \sqrt{2}t), \quad B(t) = \frac{1}{t^2+1}(-1, t^2, \sqrt{2}t), \quad N(t) = \frac{1}{t^2+1}(\sqrt{2}t, \sqrt{2}t, 1-t^2).$$

**S3.4** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (2t, \ln t, t^2), t \in (0, +\infty)$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = (2, \frac{1}{t}, 2t), \bar{r}''(t) = (0, -\frac{1}{t^2}, 2), \bar{r}'''(t) = (0, \frac{2}{t^3}, 0), \|\bar{r}'(t)\| = \frac{2t^2+1}{t},$   
 $\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = \frac{2}{t^2}(2t, -2t^2, -1), \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = \frac{2}{t^2}(2t^2+1), (\bar{r}', \bar{r}'', \bar{r}''') = -\frac{8}{t^3}$ . Obținem:  
 $k(t) = -\tau(t) = \frac{2t}{(2t^2+1)^2}$ . Reperul Frenet:

$$T(t) = \frac{1}{2t^2+1}(2t, 1, 2t), \quad B(t) = \frac{1}{2t^2+1}(2t, -2t^2, 1), \quad N(t) = \frac{1}{2t^2+1}(1-2t^2, -2t, 2t).$$

**S3.5** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3), t \in \mathbb{R}$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}'(t) = (1, 2t, 2t^2), \bar{r}''(t) = (0, 2, 4t), \bar{r}'''(t) = (0, 0, 4), \|\bar{r}'(t)\| = 2t^2+1,$   
 $\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = 2(2t^2, -2t, 1), \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = 2(2t^2+1), (\bar{r}', \bar{r}'', \bar{r}''') = 8$ . Obținem:  $k(t) =$   
 $\tau(t) = \frac{2}{(2t^2+1)^2}$ . Reperul Frenet:

$$T(t) = \frac{1}{2t^2+1}(1, 2t, 2t^2), \quad B(t) = \frac{1}{2t^2+1}(2t^2, -2t, 1), \quad N(t) = \frac{1}{2t^2+1}(-2t, 1-2t^2, 2t).$$

**S3.6** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, 4 \cos \frac{t}{2}), t \in (0, 2\pi)$ .

**Rezolvare** Avem:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{r}'(t) = (1 - \cos t, \sin t, -2 \sin \frac{t}{2}) \\ \bar{r}''(t) = (\sin t, \cos t, -\cos \frac{t}{2}) \\ \bar{r}'''(t) = (\cos t, -\sin t, \frac{1}{2} \sin \frac{t}{2}) \\ \|\bar{r}'(t)\| = 2\sqrt{2} \sin \frac{t}{2} \\ \bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = -2 \sin^2 \frac{t}{2} (\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}, 1) \\ \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = 2\sqrt{2} \sin^2 \frac{t}{2} \\ (\bar{r}'(t), \bar{r}''(t), \bar{r}'''(t)) = \sin^3 \frac{t}{2} \end{array} \right.$$

ceea ce conduce la:

$$\left\{ \begin{array}{l} T(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}, -1), B(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}, 1), N(t) = (\cos \frac{t}{2}, -\sin \frac{t}{2}, 0) \\ k(t) = \tau(t) = \frac{1}{8 \sin \frac{t}{2}}. \end{array} \right.$$

**S3.7** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (a(\sin t + \cos t), a(\sin t - \cos t), be^{-t}), t \in \mathbb{R}$ . **Temă!**

**S3.8** Analog pentru curba  $C : \bar{r}(t) = (ae^t \cos t, ae^t \sin t, be^t), t \in \mathbb{R}$ . **Temă !**



## Cursul 4

# Ecuatiile Frenet

Fixăm în  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$ , curba parametrizată  $C : \bar{r} = \bar{r}(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ , în poziție generală. Avem atunci reperul Frenet  $RF(\bar{r}(t)) = \{\bar{r}(t); X_1(t) = T(t), \dots, X_n(t)\}$  în punctul generic  $P(\bar{r}(t)) \in C$ . În Cursul 2 am dedus ecuațiile de mișcare ale acestui reper; conform ecuației (2.5) avem:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix} = \|\bar{r}'(t)\| \begin{pmatrix} 0 & k_1(t) & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -k_1(t) & 0 & k_2(t) & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -k_2(t) & 0 & k_3(t) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & k_{n-1}(t) \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & -k_{n-1}(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

**Definiția 4.1** Relațiile (4.1) se numesc *ecuațiile Frenet* ale lui  $C$ .

În cele ce urmează, pentru simplificarea scrierii, vom presupuse că  $C$  este parametrizată canonic și vom rescrie aceste ecuații în dimensiuni mici:

I)  $n = 2$

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T(s) \\ N(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) \\ -k(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T(s) \\ N(s) \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

II)  $n = 3$

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ -k(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{pmatrix}. \quad (4.3)$$

O aplicație importantă a ecuațiilor Frenet este determinarea de clase speciale de curbe, subiect ce va fi tratat în continuare.

**Propoziția 4.2** Pentru curba  $C$  următoarele afirmații sunt echivalente:

- i) ultima curbura este nulă,
- ii)  $C$  este inclusă într-un hiperplan.

**Demonstrație** Vom arăta doar implicația i)  $\Rightarrow$  ii) lăsând ca temă implicația cealaltă. Din ultima ecuație Frenet:  $\frac{dX_n(s)}{ds} = -k_{n-1}(s)X_{n-1}(s)$ , rezultă în baza ipotezei că  $X_n$  este un

versor constant și-l notăm  $(A_1, \dots, A_n)$ . Integrând relația  $\langle X_1(s), X_n \rangle = 0$  avem:

$$A_1 x^1(s) + \dots + A_n x^n(s) = A_{n+1}$$

care este ecuația unui hiperplan.  $\square$

Reformulăm pentru  $n = 3$ :

**Propoziția 4.3** *Curba  $C \subset \mathbb{R}^3$  este situată într-un plan dacă și numai dacă torsiunea este nulă pe  $I$ .*

Tot pentru cazul  $n = 3$  fie versorul fixat  $W = (w^1, w^2, w^3) \in S^2$ ; notăm sfera unitate  $n$ -dimensională  $S^n = \{\bar{u} \in \mathbb{R}^{n+1}; \|\bar{u}\| = 1\}$ .

**Definiția 4.4** i) Numim unghiul de structură dintre  $C$  și  $W$  funcția  $\theta : I \rightarrow [0, \pi]$  dat de:

$$\cos \theta(s) = \langle T(s), W \rangle. \quad (4.4)$$

- ii) Curba  $C$  o numim  $\theta$ -elice relativ la  $W$  dacă  $\theta$  este un unghi constant.  
iii) Fie  $C$  o  $\theta$ -elice cu  $\theta \notin \{0, \pi\}$ . Numărul real:

$$Lancret(C) = ctg \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \quad (4.5)$$

îl numim *invariantul Lancret* al lui  $C$ .

Următorul rezultat constituie o caracterizare a elicelor precum și o exprimare a invariantului Lancret în funcție de curbura și torsiunea:

**Propoziția 4.5** i) *Curba  $C$  diferită de dreaptă este o elice relativ la  $W$  dacă și numai dacă  $N(s) \perp W$  pentru orice  $s \in I$ .*

ii) (Lancret) *Pentru o  $\theta$ -elice raportul  $\frac{\tau(s)}{k(s)}$  este o constantă, mai precis:*

$$\frac{\tau(s)}{k(s)} = \pm Lancret(C). \quad (4.6)$$

iii) *Dacă pentru  $C$  diferită de dreaptă raportul  $\frac{\tau}{k}$  este constant atunci  $C$  este o  $\theta$ -elice cu  $\theta = \arctg(\frac{\tau}{k})$ .*

**Demonstrație** i) Derivăm relația (4.4) în raport cu  $s$ :

$$-\theta' \sin \theta = \langle k(s)N(s), W \rangle + \langle T(s), \bar{0} \rangle = k(s) \langle N(s), W \rangle.$$

Cum  $C$  nu este dreaptă avem  $k(s) > 0$  și deci membrul stâng se anulează dacă și numai dacă  $\langle N(s), W \rangle = 0$  pentru orice  $s$ . Să observăm că anularea membrului drept este echivalent cu anularea lui  $\theta'$ . În adevăr, dacă ar exista  $s_0$  astfel încât  $\theta'(s_0)$  ar fi nenul atunci din continuitate există o vecinătate  $U$  a lui  $s_0$  cu  $\theta' \neq 0$  pe  $U$ . Dar atunci  $\sin \theta = 0$  pe  $U$  și deci  $\theta$  ar fi constantă pe  $U$  ceea ce este o contradicție cu  $\theta'|_U \neq 0$ .

ii) Conform punctului precedent avem descompunerea următoare a lui  $W$  în reperul Frenet:

$$W = \cos \theta T(s) + (\pm \sin \theta) B(s). \quad (4.7)$$

Prin derivare rezultă:

$$\bar{0} = \cos \theta k(s) N(s) + (\pm \sin \theta) (-\tau(s)) N(s) = (\cos \theta k(s) \mp \sin \theta \tau(s)) N(s)$$



ceea ce duce la:

$$\cos \theta k(s) = \pm \sin \theta \tau(s).$$

Rezultă imediat concluzia.

iii) Fie deci  $\theta = \arctg(\frac{\tau}{k})$  și versorul  $W = \cos \theta + \sin \theta B$ . Avem:  $k \cos \theta - \tau \sin \theta = 0$  și deci:

$$k \cos \theta N(s) - \tau \sin \theta N(s) = \bar{0}$$

adică:

$$\cos \theta T'(s) + \sin \theta B'(s) = \bar{0}.$$

Prin integrare, avem  $\langle T(s), W \rangle = \cos \theta = \text{constant}$ , ceea ce voiam.  $\square$

Afirmația Lancret din rezultatul precedent conduce la o nouă noțiune:

**Definiția 4.6** Numim *elice generalizată* o curbă cu toate curburile constante.

Exemple de elice generalizată:

- i) în plan avem cercul conform exercițiului S2.1,
- ii) în spațiu este elicea circulară din exercițiul S3.1.

Pagini Web utile:

- 1) [http://en.wikipedia.org/wiki/Frenet%E2%80%93Serret\\_formulas](http://en.wikipedia.org/wiki/Frenet%E2%80%93Serret_formulas)
- 2) <http://en.wikipedia.org/wiki/Helix>
- 3) [http://en.wikipedia.org/wiki/Differential\\_geometry\\_of\\_curves](http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_geometry_of_curves).

## SEMINARUL 4

**S4.1** Să se arate că următoarele curbe sunt situate într-un plan  $\pi$  și se cere  $\pi$ :

- i)  $\bar{r}(t) = (\sin t, 2 \cos(\frac{\pi}{4} - t), 1 + \cos t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$
- ii)  $\bar{r}(t) = (t^2 - 1, t^2, -\ln t)$ ,  $t \in (0, +\infty)$ ,
- iii)  $\bar{r}(t) = (t^2(2t + 1), t(t - 2), t(t^2 + 1) - 1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Remarcăm că această curbă este *algebrică* adică este definită prin polinoame !

**Rezolvare** Arătăm că  $B(t)$  este vector constant obținând astfel și ecuația lui  $\pi$ ; de altfel, dacă nu se cerea acest plan era suficient să arătăm anularea torsiunii.

i)  $\bar{r}'(t) = (\cos t, 2 \sin(\frac{\pi}{4} - t), -\sin t)$ ,  $\bar{r}''(t) = -(\sin t, 2 \cos(\frac{\pi}{4} - t), \cos t)$ . Deci:

$$\bar{r}' \times \bar{r}'' = (-\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2})$$

ceea ce dă:  $\pi : \sqrt{2}x - y + \sqrt{2}z - \sqrt{2} = 0$ .

ii)  $\bar{r}'(t) = (2t, 2t, -\frac{1}{t})$ ,  $\bar{r}''(t) = (2, 2, \frac{1}{t^2})$ . Deci:

$$\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = \frac{4}{t}(1, -1, 0)$$

de unde concluzia cu:  $\pi : x - y + 1 = 0$ .

iii)  $\bar{r}'(t) = (6t^2 + 2t, 2t - 2, 3t^2 + 1)$ ,  $\bar{r}''(t) = (12t + 2, 2, 6t)$ . Deci:

$$\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = 2(3t^2 - 6t - 1)(1, -1, -2)$$

de unde concluzia cu:  $\pi : x - y - 2z - 2 = 0$ .

**Definiția 4.7** Planul prin punctul curent  $P(\bar{r}(t)) \in C$  ce este perpendicular pe  $B(t)$  se numește *planul osculator* în  $P$  și-l notăm  $\pi_{osc}(t)$ .

**S4.2** Pentru  $C : \bar{r}(t) = e^t(\sin t, \cos t, 1)$  să se arate că tangent, normala și binormala fac fiecare un unghi constant cu axa verticală  $Oz$ .

**Rezolvare** Fie  $\theta, \alpha, \beta$  unghiul format de tangenta, normala și respectiv binormala cu versorul director  $\bar{k}$  al dreptei  $Oz$ . Avem:

$$\begin{cases} \bar{r}'(t) = e^t(\sin t + \cos t, \cos t - \sin t, 1), \bar{r}''(t) = e^t(2 \cos t, 2 \sin t, 1), \|\bar{r}'(t)\| = \sqrt{3}e^t \\ \bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t) = e^{2t}(\cos t + \sin t, \cos t - \sin t, -2), \|\bar{r}'(t) \times \bar{r}''(t)\| = \sqrt{6}e^{2t} \\ (\bar{r}' \times \bar{r}'') \times \bar{r}''' = e^{3t}(3(\cos t - \sin t), -3(\cos t + \sin t), 0), \|(\bar{r}' \times \bar{r}'') \times \bar{r}'''\| = 3\sqrt{2}e^{3t}. \end{cases}$$

Rezultă:

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{\langle \bar{r}', \bar{k} \rangle}{\|\bar{r}'\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \cos \alpha = \frac{\langle (\bar{r}' \times \bar{r}'') \times \bar{r}''', \bar{k} \rangle}{\|(\bar{r}' \times \bar{r}'') \times \bar{r}'''\|} = 0 \\ \cos \beta = \frac{\langle \bar{r}' \times \bar{r}'', \bar{k} \rangle}{\|\bar{r}' \times \bar{r}''\|} = -\frac{2}{\sqrt{6}}. \end{cases}$$

Prin urmare,  $C$  este o arccos( $\frac{1}{\sqrt{3}}$ )-elice relativ la direcția verticală  $\bar{k}$ .

**S4.3** Se cer unghiurile dintre axele de coordonate și tangenta la curba  $C : \bar{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, 4 \sin \frac{t}{2})$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

**Rezolvare** Fie  $\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)$  unghiul făcut de tangenta  $\bar{r}'(t)$  cu versorii  $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ . Avem:  $\bar{r}'(t) = (1 - \cos t, \sin t, 2 \cos \frac{t}{2})$  și  $\|\bar{r}'(t)\| = 2$  de unde rezultă:  $\cos \alpha(t) = \sin^2 \frac{t}{2}$ ,  $\cos \beta(t) = \frac{1}{2} \sin t$ ,  $\cos \gamma(t) = \cos \frac{t}{2}$ .

**S4.4** Să se arate că dreptele tangente la curba  $C : \bar{r}(t) = (a \cos t, -a \sin t, be^t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$  intersectează planul orizontal  $xOy$  după un cerc.

**Rezolvare** Cum  $\bar{r}'(t) = (-a \sin t, -a \cos t, be^t)$  rezultă că ecuația dreptei tangente este:

$$\frac{x - a \cos t}{-a \sin t} = \frac{y + a \sin t}{-a \cos t} = \frac{z - be^t}{be^t}.$$

Cu  $z = 0$  obținem intersecția cerută de ecuații:

$$\begin{cases} x(t) = a(\cos t + \sin t) \\ y(t) = a(\cos t - \sin t) \end{cases}$$

care ecuația cercului  $x^2 + y^2 = 2a^2$ .

**S4.5** Să se arate că locul geometric al punctelor de intersecție dintre planul  $xOy$  și dreptele tangente la curba algebrică  $C : \bar{r}(t) = (t, t^2, t^3)$  este o conică.

**Rezolvare** Dreapta tangentă la  $C$  într-un punct generic are ecuația:

$$\frac{x - t}{1} = \frac{y - t^2}{2t} = \frac{z - t^3}{3t^2}$$

și prin intersecție cu planul  $xOy$  obținem:  $x(t) = \frac{2t}{3}$ ,  $y(t) = \frac{t^2}{3}$ . Eliminând parametrul  $t$  din aceste ecuații obținem parabola  $P : y = \frac{3}{4}x^2$ .

**S4.6** Se cer punctele curbei  $C : \bar{r}(t) = (\frac{t^4}{2}, -\frac{t^3}{3}, t^2)$  în care tangenta este paralelă cu planul  $\pi : 3x - 2y - 2z - 1 = 0$ .

**Rezolvare** Normala la planul  $\pi$  este  $\bar{N} = (3, -2, -2)$  și deci trebuie ca tangenta la curbă, i.e.  $\bar{r}'(t) = (2t^3, -t^2, 2t)$  să fie perpendiculară pe acest vector. Din  $\langle \bar{N}, \bar{r}'(t) \rangle = 0 = 2t(3t^2 + t - 2)$  avem soluțiile:  $t_1 = 0$ ,  $t_2 = -1$ ,  $t_3 = \frac{2}{3}$ . Să observăm că punctul  $\bar{r}(t_1)$  este singular deoarece  $\bar{r}'(t_1) = \bar{0}$ ; deci reținem doar  $P_2(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1)$  și  $P_3(\frac{8}{81}, -\frac{8}{81}, \frac{4}{9})$ .

**S4.7** Se cere planul osculator în punctul  $M(1, 1, 1)$  la curba dată implicit  $C : y^2 = x, x^2 = z$ .

**Rezolvare** Cu  $y = t$  se obține parametrizarea  $C : \bar{r}(t) = (t^2, t, t^4)$ . În final se obține  $\pi_{osc}(M) : 6x - 8y - z + 3 = 0$ .



## Cursul 5

# Noțiunea de suprafață. Geometria unei suprafețe

Fie  $U$  o mulțime deschisă în planul  $\mathbb{R}^2$  ale cărei elemente le notăm  $\bar{u} = (u^1, u^2) = (u^i_{i=1,2})$ . Fixăm aplicația netedă  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  de forma:

$$\varphi(\bar{u}) = (\varphi^1(\bar{u}), \varphi^2(\bar{u}), \varphi^3(\bar{u})) = (\varphi^\alpha(\bar{u}))_{\alpha=1,2,3}. \quad (5.1)$$

Prin urmare, în continuare vom folosi indicii  $i, j, k, \dots \in \{1, 2\}$  respectiv  $\alpha, \beta, \gamma, \dots \in \{1, 2, 3\}$ .

**Definiția 5.1** Numim *matricea Jacobiană* a lui  $\varphi$  în  $\bar{u} \in U$  matricea:

$$J\varphi(\bar{u}) = \left( \frac{\partial \varphi^\alpha}{\partial u^i} \right)_{\alpha=1,2,3; i=1,2} \in M_{3,2}(\mathbb{R}). \quad (5.2)$$

Spunem că  $\varphi$  este *imersie* în  $\bar{u}$  dacă  $J\varphi(\bar{u})$  are rangul maxim posibil i.e. 2. Dacă  $\varphi$  este imersie în orice punct spunem că  $\varphi$  este *imersie pe*  $U$ .

Coloanele matricii Jacobiene:

$$J\varphi(\bar{u}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^2} \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

sunt exact vectorii derivați  $\varphi_1(\bar{u})$  respectiv  $\varphi_2(\bar{u})$  și atunci condiția de imersie în  $\bar{u}$  fixat revine la faptul geometrică că avem vectorul nenul  $\varphi_1(\bar{u}) \times \varphi_2(\bar{u}) \neq \bar{0}$  adică acești vectori sunt necoliniari !

Obiectul teoriei suprafețelor este dat de:

**Definiția 5.2** Fie mulțimea conexă  $S \subset \mathbb{R}^3$ .

1)  $S$  o numim *suprafață regulată* (sau *scufundată*) dacă pentru orice  $P \in S$  există tripletul  $(U, \varphi, W)$  cu  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  deschis,  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  imersie pe  $U$  și  $W$  deschis în  $\mathbb{R}^3$  astfel încât: i)  $\varphi(U) = S \cap W$ , ii)  $P \in \varphi(U)$ ,

iii)  $\varphi$  este *homeomorfism* de la  $U$  la  $\varphi(U)$  considerat cu topologia indusă din  $\mathbb{R}^3$  i.e.

$\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$  este bijecție cu  $\varphi$  și  $\varphi^{-1}$  continue.

Perechea  $(U, \varphi)$  o numim *parametrizare locală a lui*  $S$  *în jurul lui*  $P$  și o notăm:

$$\bar{r} = \varphi(\bar{u}), \bar{u} \in U \quad (5.4)$$

iar perechea  $h = (\varphi(U) \subset S, \varphi^{-1})$  o numim *hartă locală pe  $S$  în jurul lui  $P$* .

2) Datorită existenței funcției  $\varphi^{-1} : \varphi(U) \subset S \rightarrow U$  putem introduce funcțiile  $(u^1(\cdot), u^2(\cdot)) = \varphi^{-1}$  numite *funcții coordonate* pe  $S$  în jurul lui  $P \in S$ . Pentru  $j \in \{1, 2\}$  curba  $C_j : t \rightarrow \varphi(\bar{u}_0 + t\bar{e}_j) \in S$  se numește *curba  $j$ -coordonată pe  $S$  prin  $P = \varphi(\bar{u}_0)$* .

3) Numim *atlas* pe suprafața regulată  $S$  o familie  $\mathcal{A} = \{(U_a, \varphi_a); a \in A\}$  de parametrizări locale pentru care  $S = \cup_{a \in A} \varphi_a(U_a)$ . Dacă atlasul are o unică parametrizare spunem că avem o *parametrizare globală*.

4) Numim *geometria lui  $S$*  studiul proprietăților lui  $S$  relativ la un atlas fixat !

**Observații 5.3** i) Definiția spune că o suprafață regulată "arată" local ca un deschis din plan și această identificare locală nu este doar la nivel de mulțimi amorse ci și topologic !

Mai mult, putem face un calcul local pe  $S$  ce imită pe cel din  $\mathbb{R}^2$  datorită lui  $\varphi$ .

ii) Renotând eventual pentru simplitate  $\bar{u} = (u, v)$  va rezulta că  $P$  este imaginea prin  $\varphi$  a lui  $\bar{u}_0 = (u_0, v_0)$ . Atunci curbele de coordonate pe  $S$  prin  $P$  sunt date de:

ii1)  $C_1 : v = v_0 = \text{constant}$  și o putem renota  $C_{v_0}$ ,

ii2)  $C_2 : u = u_0 = \text{constant}$  și o putem renota  $C_{u_0}$ .

Avem imediat următoarele metode de obținere de noi parametrizări locale din una dată:

**Propoziția 5.4** Fie parametrizarea locală  $(U, \varphi)$  pe  $S$  în jurul lui  $P$ .

1) Dacă  $V \subseteq \mathbb{R}^2$  este un deschis în plan și  $\rho : V \rightarrow U$  este difeomorfism atunci  $(V, \bar{\varphi})$  cu  $\bar{\varphi} = \varphi \circ \rho$  este parametrizare locală pe  $S$  în jurul lui  $P$ .

2) Dacă  $V \subset U$  este un deschis cu  $\bar{u}_0 \in V$  atunci  $(V, \varphi|_V)$  este parametrizare locală pe  $S$  în jurul lui  $P$ . (Deci putem obține parametrizări locale cu domeniul arbitrar de "mic".)

Prezentăm în continuare câteva exemple fundamentale de suprafețe regulate pentru care, în general, vom verifica condiția de imersie, celelalte aspecte din definiții fiind lăsate ca Temă.

### Exemple 5.5

1) (Plane) Fie punctul  $P_0(\bar{r}_0) \in \mathbb{R}^3$  și vectorii necoliniari  $\bar{a}, \bar{b}$ . Atunci există un unic plan  $\pi$  ce conține pe  $P_0$  și este generat de vectorii  $\bar{a}$  and  $\bar{b}$ :

$$\pi : \bar{r}(u, v) := \bar{r}_0 + u\bar{a} + v\bar{b}, (u, v) \in \mathbb{R}^2. \quad (5.5)$$

$\pi$  admite parametrizarea globală  $(\mathbb{R}^2, \varphi)$  unde  $\varphi(u^1, u^2) = \bar{r}_0 + u^1\bar{a} + u^2\bar{b}$ . Deoarece  $\varphi_1 = \bar{a}$ ,  $\varphi_2 = \bar{b}$  sunt vectori necoliniari rezultă că planele sunt suprafețe regulate.

2) (Mulțimi deschise în plan) Fie  $U$  un deschis în  $\mathbb{R}^2$ .  $U$  admite parametrizarea globală  $(U, \varphi)$  unde  $\varphi(u^1, u^2) = (u^1, u^2, 0)$ . Avem că  $\varphi_1 = \bar{i}$ ,  $\varphi_2 = \bar{j}$  sunt vectori necoliniari și deci  $U$  este suprafață regulată.

În fapt, rezultă din Propoziția 5.4ii) că orice submulțime deschisă a unei suprafețe regulate este suprafață regulată.

3) (Grafice de funcții) Fie  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  netedă. Graficul lui  $f$  este  $Gr(f) = \{(x, f(x)); x \in U\} \subset \mathbb{R}^3$ .  $Gr(f)$  admite parametrizarea globală  $(U, \varphi)$  unde  $\varphi(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2))$  și avem  $\varphi_1 = (1, 0, f_1)$  respectiv  $\varphi_2 = (0, 1, f_2)$ . Avem  $\varphi_1 \times \varphi_2 = (-f_1, -f_2, 1) \neq \bar{0}$  deci  $Gr(f)$  este o suprafață regulată numită *suprafață Monge*. Ecuația:

$$S : z = f(x, y) \quad (5.6)$$

se numește *ecuația explicită* a suprafeței  $S$ .

Mulțimile compacte din  $\mathbb{R}^3$  fiind închise nu pot fi homeomorfe cu un deschis și deci pentru exemple de suprafețe compacte nu vom avea niciodată atlase cu o singură parametrizare.

**Exemplul 5.7** (*Sfera unitate*) Mulțimea versorilor din spațiul fizic constituie sfera:

$$S^2 = \{P(\bar{r}) \in \mathbb{R}^3; \|\bar{r}\| = 1\}. \quad (5.7)$$

Fie bila deschisă din plan  $U = \{\bar{u} \in \mathbb{R}^2; \|\bar{u}\| < 1\}$  și atlasul  $\mathcal{A} = \{(U, \varphi_1), \dots, (U, \varphi_6)\}$  unde:

$$\begin{cases} \varphi_1(\bar{u}) = (u^1, u^2, \sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}), \\ \varphi_2(\bar{u}) = (u^1, u^2, -\sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}), \\ \varphi_3(\bar{u}) = (u^1, \sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}, u^2), \\ \varphi_4(\bar{u}) = (u^1, -\sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}, u^2), \\ \varphi_5(\bar{u}) = (\sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}, u^1, u^2), \\ \varphi_6(\bar{u}) = (-\sqrt{1 - \|\bar{u}\|^2}, u^1, u^2). \end{cases} \quad (5.8)$$

Un calcul imediat arată că  $(U, \varphi_a; a = 1, \dots, 6)$  sunt parametrizări locale pe  $S^2$  ce acoperă sfera; deci  $S^2$  este suprafață regulată.

## SEMINARUL 5

**S5.1** Pe suprafața  $S$  considerăm parametrizarea globală  $\bar{r} = (u^1 + u^2, u^1 - u^2, u^1 u^2)$ . Se cer:

- coordonatele carteziene ale punctelor  $P_1(u^1 = 2, u^2 = 1)$ ,  $P_2(u^1 = 1, u^2 = 2)$ ,
- să se stabilească dacă punctele  $P_3(4, 2, 3)$ ,  $P_4(1, 4, -2)$  aparțin lui  $S$ ,
- ecuația implicită și să se reia punctul anterior. Recunoașteți pe  $S$ ?

**Rezolvare** i)  $P_1(3, 2, 1)$ ,  $P_2(3, -1, 2)$ . ii)  $P_3 \in S$  deoarece sistemul:  $u + v = 4, u - v = 2, uv = 3$  are soluția  $u = 3, v = 1$ .  $P_4 \notin S$  deoarece sistemul  $u + v = 1, u - v = 4, uv = -2$  este incompatibil. iii) Din ecuațiile:  $x = u + v, y = u - v$  rezultă:  $u = \frac{x+y}{2}, v = \frac{x-y}{2}$  și deci  $z = \frac{1}{4}(x^2 - y^2)$ . Prin urmare, avem  $S: x^2 - y^2 - 4z = 0$  iar cerința de la punctul ii) se verifică imediat pentru  $P_3$  respectiv  $P_4$ .  $S$  este o porțiune de cuadrică.

**S5.2** Pe suprafața  $S$  se dă parametrizarea globală  $\bar{r} = (u^2 + v, u^2 - v, uv)$ . Să se arate că:

- curbele  $u = u_0$  sunt drepte iar curbele  $v = v_0$  sunt curbe plane,
- curba  $u = v$  este o curbă plană.

**Rezolvare** i) Avem  $C_{u_0}: \bar{r}(v) = (u_0^2 + v, u_0^2 - v, u_0 v)$  care este o dreaptă ce trece prin punctul  $M_0(u_0^2, u_0^2, 0)$  și are vectorul director  $\bar{a} = (1, -1, u_0) \neq \bar{0}$ .

Avem  $C_{v_0}: \bar{r}(u) = (u^2 + v_0, u^2 - v_0, uv_0)$  ce dă  $\frac{d^3}{du^3} \bar{r} = \bar{0}$  ceea ce confirmă concluzia.

ii)  $C_{u=v}: \bar{r}(u) = (u^2 + u, u^2 - u, u^2)$  și aplicăm același argument ca mai sus.

**S5.3** Pe suprafața  $S$  se consideră parametrizarea globală  $\bar{r} = (u^2 + u + v, v^2 + u - v, u - v)$ . Să se arate că curbele de coordonate sunt curbe plane.

**Rezolvare** Exact ca la problema anterioară.

**S5.4** Se cere ecuația implicită a suprafeței  $S$  având parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v \cos 2u)$ .

**Rezolvare**  $S: (x^2 - y^2)^2 = z^2(x^2 + y^2)$ .

**S5.5** Aceeași problemă pentru  $S$  cu  $\bar{r}(u, v) = (vtgu, vctgu, v)$ .

**Rezolvare**  $S: z^2 = xy$ .  $S$  este un con.

**Definiția 5.8** O suprafață  $S$  pentru care una din curbele coordonate este o dreaptă (sau segment de dreaptă) se numește *suprafață riglată*. Dreapta respectivă o numim *generatoarea lui  $S$* .

Presupunând că  $C_{u_0}$  este dreaptă rezultă că o suprafață riglată are harta globală:

$$h : \varphi(u, v) = \bar{a}(u) + v\bar{b}(u); \quad \bar{b}(u) \neq \bar{0}, \forall u \quad (5.9)$$

iar condiția de imersie este:  $(\bar{a}_u + v\bar{b}_u) \times \bar{b} \neq \bar{0}$ . Generatoarea dată de  $u_0$  are ecuația:

$$G : \bar{r}(v) = \bar{a}(u_0) + v\bar{b}(u_0) \quad (5.10)$$

și este o dreaptă prin punctul  $P(\bar{a}(u_0))$  având vectorul director  $\bar{b}(u_0) \neq \bar{0}$ .

**Definiția 5.9** Fie suprafața riglată  $S$ .

- i) Curba din spațiu  $C : \bar{r} = \bar{a}(t)$  se numește *curba directoare* a lui  $S$ .
- ii) Dacă toate generatoarele trec prin punctul  $V \in \mathbb{R}^3$  spunem că  $S$  este un *con generalizat* cu vârful  $V$ .
- iii) Dacă generatoarele sunt paralele între ele spunem că  $S$  este un *cilindru generalizat*.

Dacă  $\bar{b}(u) = u\bar{b}_0$  cu  $\bar{b}_0 \neq \bar{0}$  și  $u \neq 0$  rezultă că avem cilindru generalizat. Condiția de imersie revine atunci la  $\bar{a}_u \times \bar{b}_0 \neq \bar{0}$  adică  $\bar{a}_u$  trebuie să fie mereu necoliniară cu  $\bar{b}_0$ .

**S5.6** Suprafața  $S$  de la exercițiul S5.2 este o suprafață riglată (ce nu este con generalizat și nici cilindru generalizat).

**Rezolvare**  $S$  este suprafață riglată cu:  $\bar{a}(u) = (u^2, u^2, 0)$  și  $\bar{b}(u) = (1, -1, u)$ .  $S$  nu este cilindru generalizat deoarece funcția  $\bar{b}(u)$  nu are expresia  $u\bar{b}_0$ . Generatoarele sunt:

$$G_u : \bar{r}(v) = (u^2 + v, u^2 - v, uv).$$

și presupunem că două generatoare  $G_u, G_{\hat{u}}$  au un punct comun. Din egalarea primelor două componente ale ecuației lui  $G_u$  și  $G_{\hat{u}}$  rezultă  $u^2 = \hat{u}^2$ . Prin urmare, generatoarele  $G_{\hat{u}}$  cu  $\hat{u} \neq \pm u$  nu vor avea puncte comune cu generatoarele  $G_{\pm u}$  deci  $S$  nu-i un con generalizat.

**S5.7** Se dau două suprafețe cu parametrizările globale  $\bar{r}_1 = \left( \frac{u}{u^2+v^2}, \frac{v}{u^2+v^2}, \frac{1}{u^2+v^2} \right)$ ,  $\bar{r}_2 = (u \cos v, u \sin v, u^2)$ . Să se arate că avem aceeași suprafață.

**Rezolvare** Avem aceeași suprafață  $S : z = x^2 + y^2$ .



## Cursul 6

# Planul tangent și normala

Fie punctul  $P \in \mathbb{R}^n$  oarecare. Considerăm mulțimea  $T_P\mathbb{R}^n = \{(P, \bar{r}); \bar{r} \in \mathbb{R}^n\}$  pe care definim operațiile  $+$  și  $\cdot$  astfel:

$$\begin{cases} (P, \bar{r}_1) + (P, \bar{r}_2) = (P, \bar{r}_1 + \bar{r}_2), \\ \lambda(P, \bar{r}) = (P, \lambda\bar{r}), \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (6.1)$$

Se obține imediat că  $(T_P\mathbb{R}^n, +, \cdot)$  este spațiu vectorial real. Dimensiunea lui  $T_P\mathbb{R}^n$  este  $n$  deoarece o bază este  $\{(P, \bar{e}_1), \dots, (P, \bar{e}_n)\}$  cu  $\{\bar{e}_i; i = 1, \dots, n\}$  baza canonică din  $\mathbb{R}^n$ .

**Definiția 6.1**  $T_P\mathbb{R}^n$  se numește *spațiul tangent la  $\mathbb{R}^n$  în  $P$* .

Fie acum  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  un deschis și  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  netedă. Fie  $P(\bar{u}_0) \in U$ .

**Definiția 6.2** *Diferențiala lui  $\varphi$  în  $P$*  este aplicația  $d\varphi(\bar{u}_0) : T_P\mathbb{R}^n \rightarrow T_{\varphi(P)}\mathbb{R}^m$  dată de:

$$d\varphi(P)(P, \bar{r}) = (\varphi(P), J\varphi(P) \cdot \bar{r}) \quad (6.2)$$

unde  $J\varphi(P)$  este matricea Jacobiană definită în Cursul precedent:  $J\varphi(P) = \left(\frac{\partial\varphi^\alpha}{\partial u^i}(\bar{u}_0)\right) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ,  $\alpha = 1, \dots, m$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Rezultă imediat că  $d\varphi(P)$  este transformare liniară între cele două spații tangente. Din definiție, identificând  $T_P\mathbb{R}^n$  cu  $\mathbb{R}^n$  (via  $(P, \bar{r}) \leftrightarrow \bar{r}$ ) și  $T_{\varphi(P)}\mathbb{R}^m$  cu  $\mathbb{R}^m$  avem  $d\varphi(P) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\bar{r} \rightarrow J\varphi(\bar{u}_0) \cdot \bar{r}$  ceea ce spune că matricea acestei transformări liniare este tocmai  $J\varphi(P)(\bar{u}_0)$ .

Fie acum mulțimea oarecare  $S \subset \mathbb{R}^n$  și  $P(\bar{r}_0) \in S$ .

**Definiția 6.3** Vectorul  $\bar{v} \in \mathbb{R}^n$  îl numim *tangent la  $S$  în  $P$*  dacă există o curbă netedă  $\bar{r} : I = (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$  așa încât  $\bar{r}(I) \subset S$ ,  $\bar{r}(0) = P = \bar{r}_0$  și  $\bar{r}'(0) = \bar{v}$ . Fie  $T_P S$  mulțimea acestor vectori tangenți la  $S$  în  $P$ .

Introducem și:

**Definiția 6.4** Fie spațiul vectorial real  $V$  și  $C \subset V$  submulțime nevidă. Spunem că  $C$  este *con* în  $V$  dacă pentru orice  $v \in C$  și orice  $\lambda \in \mathbb{R}$  avem  $\lambda v \in C$ .

Această noțiune permite formularea următorului rezultat:

**Propoziția 6.5**  $T_P S$  este un con în  $T_P\mathbb{R}^n$ .

**Demonstrație** Vectorul nul  $\bar{0} \in T_P\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$  aparține lui  $T_P S$  deoarece considerăm curba constantă  $\bar{r} : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\bar{r}(t) \equiv \bar{r}_0$  pentru orice  $t$ . Fie acum  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  și  $\bar{v} \in T_P S$  nenul; deci există curba netedă  $\bar{r}$  ca în Definiția 6.3. Considerăm  $\bar{r}_\lambda : I_\lambda = \left(-\frac{\varepsilon}{|\lambda|}, \frac{\varepsilon}{|\lambda|}\right) \rightarrow \mathbb{R}^n$  dată

de  $\bar{r}_\lambda(t) = \bar{r}(\lambda t)$ . Rezultă că  $\bar{r}_\lambda$  este curbă netedă cu  $\bar{r}(I_\lambda) = \bar{r}(I) \subset S$  și  $\bar{r}_\lambda(0) = \bar{r}(0) = P$ . Deoarece  $\bar{r}'_\lambda(t) = \lambda \bar{r}'(t)$  rezultă că  $\bar{r}'_\lambda(0) = \lambda \bar{v}$  ceea ce arată că  $\lambda \bar{v} \in T_P S$ .  $\square$

**Definiția 6.6**  $T_P S$  este numit *conul tangent la  $S$  în  $P$* .

Să presupunem acum că  $n = 3$  și  $S$  este suprafață regulată. Vom utiliza o metodă standard în teoria suprafețelor: definim ceva la modul general (cum este  $T_P S$ ) dar pentru a obține informații (calitative) utilizăm o parametrizare locală a lui  $S$  în jurul lui  $P$  de forma  $(U, \varphi)$ . Ca în Cursul precedent fie  $\bar{u}_0 = \varphi^{-1}(\bar{r}_0) \in U$  imaginea inversă a lui  $P$  pe domeniul  $U$ .

**Teorema 6.7** *Diferențiala  $d\varphi(\bar{u}_0) : T_{\bar{u}_0} \mathbb{R}^2 \rightarrow T_P \mathbb{R}^3 = T_{\bar{r}_0} \mathbb{R}^3$  este bijecție de la  $T_{\bar{u}_0} \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$  la  $T_P S$ .*

**Demonstrație** Din condiția de imersie avem că  $d\varphi(\bar{u}_0)$  este injectivă. Mai avem de arătat că  $d\varphi(\bar{u}_0) : \mathbb{R}^2 \rightarrow T_P S$  este surjectivă.

1) Arătăm incluziunea  $d\varphi(\bar{u}_0)(T_{\bar{u}_0} \mathbb{R}^2) \subseteq T_P S$ . Fie  $\bar{v} \in \mathbb{R}^2$  oarecare. Putem găsi  $\varepsilon > 0$  așa încât  $\bar{u}_0 + t\bar{v} \in U$  pentru orice  $t \in I = (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Fie atunci curba  $\bar{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $\bar{r}(t) = \varphi(\bar{u}_0 + t\bar{v})$ . Această curbă este netedă, avem  $\bar{r}(I) \subset U \subset S$  și  $\bar{r}(0) = \varphi(\bar{u}_0) = P$ . De asemeni:

$$\bar{r}'(t) = \frac{d}{dt}(\varphi(\bar{u}_0 + t\bar{v})) = \left( \frac{\partial \varphi^\alpha}{\partial u^i}(\bar{u}_0 + t\bar{v}) \cdot v^i \right) = d\varphi(\bar{u}_0 + t\bar{v})(\bar{v})$$

și pentru  $t = 0$  rezultă:  $d\varphi(\bar{u}_0)(\bar{v}) = \bar{r}'(0) \in T_P S$ .

2) Arătăm incluziunea  $T_P S \subseteq d\varphi(\bar{u}_0)(\mathbb{R}^2)$ . Fie  $\bar{v} \in T_P S$  și curba netedă care-l produce,  $\bar{r} : I = (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$  cu  $\bar{r}(I) \subset S$ ,  $\bar{r}(0) = P = \bar{r}_0$  și  $\bar{r}'(0) = \bar{v}$ . Eventual micșorând pe  $\varepsilon$  putem presupune  $\bar{r}(I) \subset U$ . Fie curba  $\bar{R} : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\bar{R} = \varphi^{-1} \circ \bar{r}$ . Avem în mod evident că  $\bar{R}$  este netedă fiind compunere de aplicații netede și  $\bar{R}(0) = \varphi^{-1}(\bar{r}_0) = \bar{u}_0$ . Prin urmare,  $\bar{V} := \bar{R}'(0) \in T_{\bar{u}_0} \mathbb{R}^2$ . Cu un calcul asemănător celui de mai sus avem:

$$d\varphi(\bar{u}_0)(\bar{V}) = \frac{d}{dt} \varphi \circ \bar{R}|_{t=0} = \bar{r}'(0) = \bar{v}$$

adică ceea ce voiam.  $\square$

**Corolarul 6.8**  $T_P S$  este subspațiu vectorial 2-dimensional al lui  $T_P \mathbb{R}^3$ .

**Demonstrație**  $d\varphi(\bar{u}_0)$  fiind bijecție va transporta structura de spațiu vectorial 2-dimensional al lui  $T_{\bar{u}_0} \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$  pe  $T_P S$  devenind astfel un izomorfism linear.  $\square$

**Definiția 6.9**  $T_P S$  se numește *spațiul vectorial tangent la  $S$  în  $P$* . Planul prin punctul  $P$  având pe  $T_P S$  ca plan vectorial director se numește *planul tangent la  $S$  în  $P$*  și-l notăm  $\pi_P S$ .

Un izomorfism linear transportă o bază din spațiul vectorial de plecare în bază în spațiul vectorial imagine. Prin urmare, în  $T_P S$  avem *baza canonică relativ la parametrizarea  $(U, \varphi)$* ,  $\left\{ \frac{\partial}{\partial u^1} \Big|_P := d\varphi(\bar{u}_0)(\bar{e}_1), \frac{\partial}{\partial u^2} \Big|_P := d\varphi(\bar{u}_0)(\bar{e}_2) \right\}$ . Mai precis:

$$\frac{\partial}{\partial u^1} \Big|_P = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^2} \end{pmatrix} (\bar{u}_0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^1} \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^1} \\ \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^1} \end{pmatrix} (\bar{u}_0) = \varphi_1(\bar{u}_0) \quad (6.3)$$

respectiv:

$$\frac{\partial}{\partial u^2} \Big|_P = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^1} & \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^2} \end{pmatrix} (\bar{u}_0) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u^2} \\ \frac{\partial \varphi^3}{\partial u^2} \end{pmatrix} (\bar{u}_0) = \varphi_2(\bar{u}_0). \quad (6.4)$$

În concluzie:  $\frac{\partial}{\partial u^i}|_P = \varphi_i(\bar{u}_0)$  iar condiția de imersie spune că aceștia sunt vectori necoliniari deci generează un subspațiu vectorial 2-dimensional !

Cum spațiul fizic  $\mathbb{R}^3$  are trei dimensiuni (grade de libertate) și am "ocupat" două dintre acestea cu  $T_P S$  a mai rămas un grad de libertate descris de:

**Definiția 6.10** i) Versorul:

$$\bar{N}(P) = \frac{\varphi_1(\bar{u}_0) \times \varphi_2(\bar{u}_0)}{\|\varphi_1(\bar{u}_0) \times \varphi_2(\bar{u}_0)\|} \quad (6.5)$$

se numește *versorul normalei* în  $P$  la  $S$ . Ansamblul  $\{P; \frac{\partial}{\partial u^1}|_P, \frac{\partial}{\partial u^2}|_P, \bar{N}(P)\}$  se numește *reperul Gauss* al lui  $S$  în  $P$ .

ii) Dreapta prin  $P$  cu vectorul director  $\bar{N}(P)$  o numim *normala la  $S$  în  $P$* .

În general, reperul Gauss (spre deosebire de reperul Frenet al curbelor) nu este ortonormat și nici măcar ortogonal; știm doar că  $\bar{N}(P)$  este versor ortogonal pe  $\frac{\partial}{\partial u^1}|_P$  și  $\frac{\partial}{\partial u^2}|_P$ . Problema ortonormalității (ortogonalității) acestui reper va fi studiată în Cursul următor. Importante noțiuni topologico-diferențiale din teoria suprafețelor sunt date de:

**Definiția 6.11** i) Mulțimea  $TS = \cup_{P \in S} T_P S$  a tuturor spațiilor tangente la  $S$  o numim *fibratul tangent al lui  $S$* .

ii) O aplicație  $X : S \rightarrow TS$  cu proprietatea că  $X(P) \in T_P S$  pentru orice punct  $P \in S$  se numește *câmp vectorial tangent la  $S$* ; fie  $\mathcal{X}(S)$  mulțimea câmpurilor vectoriale tangente.

iii) Numim *câmp vectorial normal la  $S$*  o aplicație  $\bar{N}_o : S \rightarrow S^2$  cu proprietatea că  $\bar{N}_o(P) = \pm \bar{N}(P)$  pentru orice punct  $P \in S$ .

iv) Suprafața  $S$  se numește *orientabilă* dacă admite un câmp vectorial normal *continuu*; în caz contrar  $S$  o numim *neorientabilă*.

**Exemple 6.12** i) Aplicațiile  $\frac{\partial}{\partial u^1}|_{(\cdot)}, \frac{\partial}{\partial u^2}|_{(\cdot)}$  sunt elemente din  $\mathcal{X}(S)$ ; mai precis din  $\mathcal{X}(U)$ , considerând în ii) și domenii de definiție deschise  $U \subset S$ .

ii) (fundamental) *Banda lui Möbius* este suprafață neorientabilă:

$$BM : \bar{r}(u, v) = \left( (2 - v \sin \frac{u}{2}) \sin u, (2 - v \sin \frac{u}{2}) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right), (u, v) \in \mathbb{R} \times (-1, 1). \quad (6.6)$$

Avem, din periodicitatea funcțiilor trigonometrice:  $\bar{r}(u + 2\pi, -v) = \bar{r}(u, v)$  și prin diferențiere:  $\bar{r}_u(u + 2\pi, -v) = \bar{r}_u(u, v)$  respectiv:  $\bar{r}_v(u + 2\pi, -v) = -\bar{r}_v(u, v)$ . Prin urmare,  $\bar{N}(u + 2\pi, -v) = -\bar{N}(u, v)$  și în particular:  $\bar{N}(u + 2\pi, 0) = -\bar{N}(u, 0)$ . Să presupunem că există  $\bar{N}_o(u, 0) = \varphi(u)\bar{N}(u, 0)$ ; atunci  $\varphi(u + 2\pi) = -\varphi(u)$ , în particular  $\varphi(2\pi) = -\varphi(0)$ . Dar am cerut  $\varphi(u) = \pm 1$  și deci  $\varphi$  nu poate fi continuă; ar trebui să ia atunci și valoarea zero ceea ce este imposibil!

**Observații 6.13** i) O suprafață orientabilă are exact două "orientări":  $\bar{N}_o^1 = +\bar{N}$  respectiv  $\bar{N}_o^2 = -\bar{N}$ . Deci banda lui Möbius are o singură față!

ii) *Criteriu de orientabilitate*: Suprafața conexă (adică alcătuită dintr-o singură "bucată") este orientabilă dacă și numai dacă pentru orice curbă închisă  $C : (a, b) \rightarrow S$  ( $C(a) = C(b)$ ) și orice câmp vectorial normal  $\bar{N}_o$  de-a lungul lui  $C$  avem  $\bar{N}_o(a) = \bar{N}_o(b)$  !

**Exemple 6.14** 1) (plane)  $\pi : \bar{r}(u, v) = \bar{r}_0 + u\bar{a} + v\bar{b}, (u, v) \in \mathbb{R}^2$ . Avem că  $\pi_P S$  este planul prin  $P$  generat de vectorii necoliniari  $\varphi_1 = \bar{a}, \varphi_2 = \bar{b}$  și deci  $\pi_P S = \pi$ !  $\bar{N}$  este versorul constant  $\frac{\bar{a} \times \bar{b}}{\|\bar{a} \times \bar{b}\|}$  al normalei la planul  $\pi$ .

2) (mulțimi deschise din plan)  $U : \bar{r}(u, v) = (u, v, 0), (u, v) \in U \subseteq \mathbb{R}^2$ . Avem  $\varphi_1 = \bar{i}, \varphi_2 = \bar{j}$

și deci  $\pi_P S$  este planul  $xOy$  iar  $\bar{N} = \bar{k}$  este din nou versor constant.

Mai general, fie  $U \subset S$  deschis; din Cursul precedentă vem că și  $U$  este suprafață regulată. Fie  $P \in U$ , atunci  $T_P U = T_P S$  !

3) (suprafețe Monge)  $S : \bar{r}(u, v) = (u, v, f(u, v)), (u, v) \in U$ ; deci  $P \in S$  generic are coordonatele  $(u_0, v_0, f(u_0, v_0))$ . Cum  $\varphi_1 = (1, 0, f_u)$  respectiv  $\varphi_2 = (0, 1, f_v)$  avem ecuația planului tangent:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x - u_0 & y - v_0 & z - f(u_0, v_0) \\ 1 & 0 & f_u(u_0, v_0) \\ 0 & 1 & f_v(u_0, v_0) \end{vmatrix} = 0 \quad (6.7)$$

sau, dezvoltând determinantul după prima linie:

$$\pi_P S : -f_u(u_0, v_0)(x - u_0) - f_v(u_0, v_0)(y - v_0) + z - f(u_0, v_0) = 0. \quad (6.8)$$

Versorul normalei este:

$$\bar{N}(P) = \frac{(-f_u(u_0, v_0), -f_v(u_0, v_0), 1)}{\sqrt{1 + f_u^2(u_0, v_0) + f_v^2(u_0, v_0)}}. \quad (6.9)$$

Introducem o nouă clasă remarcabilă de suprafețe. Mai întâi considerăm următoarea noțiune.

**Definiția 6.15** Fie  $V \subseteq \mathbb{R}^n$  un deschis și funcția netedă  $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ . Punctul  $P \in V$  îl numim *critic pentru  $F$*  dacă diferențiala  $dF(P) : T_P \mathbb{R} \rightarrow T_{F(P)} \mathbb{R}$  nu este surjectivă. Dacă  $P$  este punct critic atunci  $F(P)$  se numește *valoare critică*. Numărul real  $a \in F(V)$  ce nu este valoare critică îl numim *valoare regulată*.

**Observația 6.16**  $P \in V$  este punct critic pentru  $F$  dacă și numai dacă  $dF(P) = 0 \in \mathbb{R}$  sau echivalent, *gradientul* lui  $F$  în  $P$ :

$$\nabla F(P) = (F_1(P), \dots, F_n(P)) = \left( \frac{\partial F}{\partial x^1}(P), \dots, \frac{\partial F}{\partial x^n}(P) \right) \quad (6.10)$$

este vectorul nul.

Dăm fără demonstrație următorul procedeu de obținere de suprafețe regulate:

**Teorema 6.17** Fie  $a \in \mathbb{R}$  valoare regulată pentru  $F : V \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ . Atunci orice componentă conexă  $S$  a mulțimii de nivel  $F^{-1}(a)$  este suprafață regulată.

**Definiția 6.18**  $S$  o numim *suprafață de nivel* a lui  $F$  și relația:

$$S : F(x, y, z) = a \quad (6.11)$$

o numim *ecuația implicită* a lui  $S$ .

Fie punctul  $P(x_0, y_0, z_0) \in S$  oarecare și  $\bar{r} : I = (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  o curbă pe  $S$  prin  $P$  ca în Definiția 6.3; deci  $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$  pentru orice  $t \in I$ . Derivăm această relație și facem  $t = 0$ ; obținem:

$$F_x(P) \cdot x'(0) + F_y(P) \cdot y'(0) + F_z(P) \cdot z'(0) = 0$$

ceea ce spune că  $\nabla F(P)$  este versor perpendicular pe  $T_P S$  adică:

$$\bar{N}(P) = \frac{\nabla F(P)}{\|\nabla F(P)\|}. \quad (6.11)$$

Avem și:

$$\pi_P S : F_x(P) \cdot (x - x_0) + F_y(P) \cdot (y - y_0) + F_z(P) \cdot (z - z_0) = 0. \quad (6.12)$$

**Exemplul 6.19** Sfera de rază  $R$  centrată în origine este:

$$S(O, R) : x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (6.13)$$

Pentru  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  avem câmpul vectorial gradient  $\nabla F = 2(x, y, z)$  și deci  $F$  are o singură valoare critică și anume 0. Cum  $R > 0$  rezultă că sferile sunt suprafețe regulate. Fixăm polul nord  $N = (0, 0, R)$ . Cum:

$$\nabla F(N) = 2(0, 0, R)$$

rezultă:

$$\pi_N S(O, R) : 2R(z - R) = 0.$$

În concluzie:  $\pi_N S(O, R) : z = R$  ceea ce este în acord cu viziunea geometrică!

## SEMINARUL 6

**S6.1** Fie  $S$  o suprafață riglată și  $P(u_0, v_0) \in S$ . Atunci  $\pi_P S$  conține generatoarea prin  $P$ .

**Rezolvare** Conform Seminarului anterior vectorul director al generatoarei prin  $P$  este:  $\bar{b}(u_0)$  iar vectorul normalei este:  $\bar{N}(P) = (\bar{a}_u(u_0) + v_0 \bar{b}_u(u_0)) \times \bar{b}(u_0)$ . Cum  $\bar{N}(P) \perp \bar{b}(u_0)$  avem concluzia.

**S6.2** Se cere planul tangent  $\pi_P S$  și normala la suprafața  $S : z(x^2 + y^2) = 1$  în punctul  $P(1, 1, \frac{1}{2})$ .

**Rezolvare** Observăm mai întâi că  $P \in S$ . Cu notația din Curs:  $F(x, y, z) = z(x^2 + y^2)$ , avem  $\nabla F = (2xz, 2yz, x^2 + y^2)$  și deci  $\bar{N}(P) = \nabla F(P) = (1, 1, 2)$  adică normala:  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{2z-1}{4}$ . Obținem  $\pi_P S : x + y + 2z - 3 = 0$ .

**S6.3** Aceeași cerință pentru suprafața  $S$  cu parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (\frac{u^2-v^2}{u^2+v^2}, \frac{u^3+v^3}{u^2+v^2}, \frac{uv-1}{u^2+v^2})$  în punctul  $P(u = 1, v = 1)$ .

**Rezolvare** Avem  $P(0, 1, 0)$  și:

$$\bar{r}_u = \left( \frac{4uv^2}{u^2+v^2}, \frac{u(u^3+3uv^2-2v^3)}{(u^2+v^2)^2}, \frac{-u^2v+2u+v^3}{(u^2+v^2)^2} \right)$$

$$\bar{r}_v = \left( \frac{-4u^2v}{(u^2+v^2)^2}, \frac{v(v^3+3u^2v-u^3)}{(u^2+v^2)^2}, \frac{-uv^2+2v+u^3}{(u^2+v^2)^2} \right)$$

de unde rezultă:  $\bar{r}_u(P) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $\bar{r}_v(P) = (-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ . Prin urmare:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x-0 & y-1 & z-0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0$$

adică:  $\pi_P S : y - z - 1 = 0$ . Rezultă că axa  $Ox$  este paralelă cu  $\pi_P S$ ! Normala este:  $\frac{x}{0} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$ .

**S6.4** Se consideră curba  $C$  de intersecție a suprafețelor  $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 3$  (sferă centrată în origine),  $S_2 : 2x^2 + y^2 - 3z^2 = 0$  (con cu vârful în origine). Se cere dreapta tangentă în  $P(1, 1, 1)$  la  $C$ .

**Rezolvare** Observăm mai întâi că  $P \in C = S_1 \cap S_2$ ; deci tangenta căutată este  $d_P C = \pi_P S_1 \cap \pi_P S_2$ . Fie  $F_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$  și  $F_2(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - 3z^2$ . Avem:

$$\nabla F_1 = 2(x, y, z), \quad \nabla F_2 = 2(2x, y, -3z)$$

și deci (până la un factor de proporționalitate) avem:  $\nabla F_1(P) = (1, 1, 1)$ ,  $\nabla F_2(P) = (2, 1, -3)$ . Rezultă:  $\pi_P S_1 : x + y + z - 3 = 0$ ,  $\pi_P S_2 : 2x + y - 3z = 0$  de unde avem concluzia:

$$d_P C : \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

Altfel: vectorul director al dreptei tangente este  $\nabla F_1(P) \times \nabla F_2(P) = (-4, 5, -1)$  și deci  $d_P C : \frac{x-1}{-4} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{-1}$ .

**S6.5** Să se arate că suprafața  $S$  având parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (u \cos v + \sin v, u \sin v - \cos v, u - v)$ ,  $(u, v) \in \mathbb{R} \times [0, 2\pi)$  este regulată și se cere  $\pi_P S$  cu  $P(u = \frac{\pi}{3}, v = 0)$ .

**Rezolvare** Avem:  $\bar{r}_u = (\cos v, \sin v, 1)$  și  $\bar{r}_v = (-u \sin v + \cos v, u \cos v + \sin v, -1)$  respectiv  $\bar{r}_u \times \bar{r}_v = (-u \cos v - 2 \sin v, -u \sin v + 2 \cos v, u)$ . Cum  $\|\bar{r}_u \times \bar{r}_v\|^2 = 2u^2 + 4 > 0$  avem regularitatea lui  $S$ . Obținem:  $\pi_P S : \pi x - 6y - \pi z - 6 = 0$  deoarece avem  $P(\frac{\pi}{3}, -1, \frac{\pi}{3})$ .

**S6.6** Se dă funcția netedă  $\varphi : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și suprafața Monge  $S : z = x\varphi(\frac{y}{x})$  cu  $x \neq 0$ . Să se arate că toate planele tangente  $\pi_P S$  trec prin origine.

**Rezolvare** Dacă  $P$  are coordonatele carteziene  $(x_0, y_0, z_0)$  atunci pentru o suprafață Monge avem formula (6.8). Obținem  $\pi_P S : [\varphi(\frac{y_0}{x_0}) - \frac{y_0}{x_0} \varphi'(\frac{y_0}{x_0})]x + \varphi'(\frac{y_0}{x_0})y - z = 0$ . Avem că  $(0, 0, 0)$  satisface această ecuație.

**S6.7** Pentru  $S$  cu parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (ue^v, ue^{-v}, 4uv)$  se cere  $\pi_P S$  și normala în  $P(u = 2, v = 0)$ .

**Rezolvare** Din:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

rezultă:  $\pi_P S : 2x - 2y - z = 0$ . Normala este:  $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{-1}$ .

**S6.8** Pentru  $S$  cu parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (u+v, u-v, uv)$  se cere  $\pi_P S$  și normala în  $P(u = 2, v = 1)$ .

**Rezolvare** Din:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x-3 & y-1 & z-2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

rezultă:  $\pi_P S : 3x - y - 2z - 4 = 0$ . Normala este:  $\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$ .

**S6.9** Pentru  $S$  cu parametrizarea globală  $\bar{r}(u, v) = (u, u^2 - 2uv, u^3 - 3u^2v)$  se cere  $\pi_P S$  și normala în  $P(1, 3, 4)$ .

**Rezolvare** Avem că  $P \in S$  având coordonatele:  $u = 1, v = -1$ . Din:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-4 \\ 1 & 4 & 9 \\ 0 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

rezultă:  $\pi_P S : 6x + 3y - 2z - 7 = 0$ . Normala este:  $\frac{x-1}{6} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-4}{-2}$ .

**S6.10** Pentru  $S$  cu parametrizarea globală  $\vec{r}(u, v) = (2u - v, u^2 + v^2, u^3 - v^3)$  se cere  $\pi_P S$  și normala în  $P(3, 5, 7)$ .

**Rezolvare** Avem că  $P \in S$  având coordonatele:  $u = 2, v = 1$ . Din:

$$\pi_P S : \begin{vmatrix} x-3 & y-5 & z-7 \\ 1 & 2 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

rezultă:  $\pi_P S : 18x + 3y - 4z - 41 = 0$ . Normala este:  $\frac{x-3}{18} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-7}{-4}$ .

**S6.11** Se cere  $\pi_P S$  și normala la suprafețele următoare în punctul indicat:

i)  $S : z = x^3 + y^3, P(1, 2, 9)$ ,    ii)  $S : x^2 - 2y^2 - 3z^2 - 4 = 0, P(3, 1, -1)$ ,

iii)  $S = E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, P(x_0, y_0, z_0)$ .

**Rezolvare** i) Avem  $F(x, y, z) = x^3 + y^3 - z$  cu câmpul gradient  $\nabla F(x, y, z) = (3x^2, 3y^2, -1)$ , deci  $\nabla F(P) = (3, 18, -1)$ . Rezultă:  $\pi_P S : 3x + 12y - z - 18 = 0$  și normala  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{12} = \frac{z-9}{-1}$ .

ii) Avem  $F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 - 3z^2 - 4$  cu câmpul gradient  $\nabla F(x, y, z) = (2x, -4y, -6z)$ . Deci  $\frac{1}{2}\nabla F(P) = (3, -2, 3)$  de unde rezultă:  $\pi_P S : 3x - 2y + 3z - 4 = 0$  și normala  $\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$ .

Reamintim procedeul dedublării în punctul  $P(x_0, y_0, z_0)$  aparținând unei quadrice:

$$x^2 \rightarrow x_0x, y^2 \rightarrow y_0y, z^2 \rightarrow z_0z, x \rightarrow \frac{1}{2}(x + x_0), y \rightarrow \frac{1}{2}(y + y_0), z \rightarrow \frac{1}{2}(z + z_0).$$

Suprafața dată este o quadrică și deci planul tangent într-un punct generic este:  $\pi_P S : x_0x - 2y_0y - 3z_0z - 4 = 0$ .

iii) Cu dedublarea avem  $\pi_P S : \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z_0z}{c^2} - 1 = 0$ .





## Cursul 7

# Forma I-a fundamentală

Reamintim că în Cursul precedent am introdus, în fiecare punct al unei suprafețe regulate scufundate, reperul Gauss și problema care se pune în acest moment este caracterizarea ortogonalității (ortogonalității) acestui reper. În vederea soluționării acestei chestiuni reamintim pe scurt câteva noțiuni de bază ale algebrei liniare.

**Definiția 7.1** Fie  $V$  un spațiu vectorial real și aplicația  $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ . Atunci  $g$  se numește:

- i) *formă biliniară* dacă:  $g(\lambda x + \mu y, z) = \lambda g(x, z) + \mu g(y, z)$  și  $g(x, \lambda y + \mu z) = \lambda g(x, y) + \mu g(x, z)$  pentru orice  $x, y, z \in V$  și orice scalari  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,
- ii) *simetrică* dacă:  $g(x, y) = g(y, x)$  pentru orice vectori  $x, y \in V$ ,
- iii) *pozitiv definită* dacă:  $g(x, x) \geq 0$  pentru orice  $x \in V$  și  $g(x, x) = 0$  implică  $x =$ vectorul nul din  $V$ ,
- iv) *produs scalar* dacă este formă biliniară simetrică și pozitiv definită.

**Exemplul 7.2** (fundamental) Fie  $V = \mathbb{R}^n$  și  $\langle, \rangle_e$  produsul scalar euclidian:

$$\langle x = (x^1, \dots, x^n), y = (y^1, \dots, y^n) \rangle_e = \sum_{i=1}^n x^i y^i. \quad (7.1)$$

Putem scrie matriceal:

$$\langle x, y \rangle_e = x^t \cdot I_n \cdot y \quad (7.2)$$

unde  $I_n \in M_n(\mathbb{R})$  este *matricea unitate de ordin  $n$*  iar vectorii  $x, y$  sunt gândiți ca vectori **coloană!**

Presupunem în cele ce urmează că  $V$  are dimensiunea  $n \geq 2$  și notăm acest fapt prin  $V_n$ . Fixăm o bază:  $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ .

**Definiția 7.3** Baza  $B$  se numește:

- i) *ortogonală* dacă  $g(e_i, e_j) = 0$  dacă  $i \neq j$ ; altfel spus, vectorii din  $B$  sunt *ortogonali* doi câte doi,
- ii) *ortonormată* dacă  $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ ; deci  $B$  este o bază ortogonală formată din versori.

Această definiție ne conduce la introducerea matricii  $g_B = (g_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbb{R})$  dată de:  $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ . Avem atunci caracterizarea:

- $B$  este ortogonală dacă și numai dacă elementele lui  $g_B$  din afara diagonalei principale sunt nule,

- $B$  este ortonormată dacă și numai dacă  $g_B = I_n$ .

Să considerăm acum o altă bază:  $\tilde{B} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$  și fie descompunerile:  $\tilde{e}_i = s_i^j e_j$  pentru  $i = 1, \dots, n$ . Obținem astfel o matrice  $S = (s_i^j) \in M_n(\mathbb{R})$  și notăm:  $\tilde{B} = S(B)$ . Se arată imediat că  $S$  este inversabilă i.e.  $S \in GL(n, \mathbb{R}) = n\text{-grupul liniar general} = \{A \in M_n(\mathbb{R}); \det A \neq 0\}$ , și avem:  $B = S^{-1}(\tilde{B})$ .

Vrem relația dintre  $g_B$  și  $g_{\tilde{B}}$ . Avem:

$$\tilde{g}_{ij} = g(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j) = g(s_i^a e_a, s_j^b e_b) = s_i^a g_{ab} s_j^b \quad (7.3)$$

sau global:

$$g_{\tilde{B}} = S^t \cdot g_B \cdot S \quad (7.4)$$

și relația (7.3) spune că ansamblul de numere reale  $(g_{ij})$  este un *tensor de tip*  $(0, 2)$  pe  $V_n$ .

Prin urmare, dacă  $B$  este ortonormată atunci  $\tilde{B}$  va fi bază ortonormată dacă și numai dacă:

$$S^t \cdot S = I_n. \quad (7.5)$$

Suntem astfel conduși la introducerea *n-grupului ortogonal*:

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}); A^t \cdot A = A \cdot A^t = I_n\} \quad (7.6)$$

care este subgrup în  $GL(n, \mathbb{R})$ . În concluzie:

- schimbarea bazelor generale se face cu matrici din  $GL(n, \mathbb{R})$ ,
- schimbarea bazelor ortonormate se face cu matrici din  $O(n)$ .

Revenim acum la suprafața parametrică regulată  $S$  și fixăm punctul generic  $P(\bar{r}_0) \in S$ ; deci avem o parametrizare locală  $(U, \varphi)$  a lui  $S$  în jurul lui  $P$ ; fie  $\bar{u}_0 = \varphi^{-1}(P) = \varphi^{-1}(\bar{r}_0)$ . În Cursul precedent am introdus *spațiul tangent la  $S$  în  $P$*  ce este subspațiu vectorial (2-dimensional) în  $T_P \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ . Prin restricție de la  $T_P \mathbb{R}^3$  la  $T_P S$  putem introduce o noțiune principală în teoria suprafețelor:

**Definiția 7.4** Numim *forma I-a fundamentală* a lui  $S$  setul de produse scalare indexate de punctele lui  $S$ :

$$I = \{<, >_P |_{T_P S}; P \in S\}. \quad (7.6)$$

Altfel spus,  $I$  este o aplicație:

$$I : P \in S \rightarrow I(P) : T_P S \times T_P S \rightarrow \mathbb{R}, I(P) = <, >_P |_{T_P S}. \quad (7.7)$$

Reamintim că  $T_P S$  admite, relativ la parametrizarea fixată  $(U, \varphi)$ , o bază canonică  $\{\frac{\partial}{\partial u^i} |_{T_P S} = d\varphi(\bar{u}_0)(\bar{e}_i); i = 1, 2\}$  cu  $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$  baza canonică din  $\mathbb{R}^2$ ; sau încă:

$$\frac{\partial}{\partial u^i} |_{T_P S} = \varphi_i(\bar{u}_0) = \frac{\partial \varphi}{\partial u^i}(\bar{u}_0). \quad (7.8)$$

Fie  $X, Y \in T_P S$  oarecare. Avem deci:  $X = X^i \frac{\partial}{\partial u^i} |_{T_P S}$  și  $Y = Y^j \frac{\partial}{\partial u^j} |_{T_P S}$ . Din punct de vedere calculatoriu avem:

$$I(P)(X, Y) = < X^i \varphi_i(\bar{u}_0), Y^j \varphi_j(\bar{u}_0) >_e$$

și din bilinearitate și simetrie avem:

$$I(P)(X, Y) = X^i g_{ij}(P) Y^j \quad (7.9)$$

unde  $g(P) = (g_{ij}(P)) \in M_2(\mathbb{R})$  este *matricea formei I-a fundamentale*. Rezultă că putem scrie (7.9) matriceal:

$$I(P)(X, Y) = X^t \cdot g(P) \cdot Y \quad (7.10)$$

reamintind că vectorii tangenți  $X, Y \in TPS$  sunt gânditi pe **coloană**. Altfel spus, avem:

$$I(P)(X, Y) = \begin{pmatrix} X^1(P) & X^2(P) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} g_{11}(P) & g_{12}(P) \\ g_{21}(P) & g_{22}(P) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y^1(P) \\ Y^2(P) \end{pmatrix}. \quad (7.11)$$

Avem dependența de  $P$  a funcțiilor  $g_{ij} : S \rightarrow \mathbb{R}$  unde:

$$g_{ij}(P) = \langle \varphi_i(\bar{u}_0), \varphi_j(\bar{u}_0) \rangle_e. \quad (7.12)$$

Mai precis, funcțiile *coeficienți* ai formei I-a fundamentale sunt:

$$\boxed{\begin{cases} g_{11} = \langle \varphi_1, \varphi_1 \rangle_e = \|\varphi_1\|^2 \\ g_{12} = g_{21} = \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle_e \\ g_{22} = \langle \varphi_2, \varphi_2 \rangle_e = \|\varphi_2\|^2 \end{cases}} \quad (7.13)$$

unde am folosit deja simetria lui  $g(P)$  ca fiind matrice asociată unui produs scalar:

$$(g(P))^t = g(P). \quad (7.14)$$

Pozitivă definire a a lui  $g$  se traduce prin:

$= X^t \cdot g \cdot X \geq 0$  pentru orice  $X \in TPS$ ,

$-X^t \cdot g \cdot X = 0$  implică  $X = \text{vectorul nul din } TPS = 0 \cdot \varphi_1(\bar{u}_0) + 0 \cdot \varphi_2(\bar{u}_0)$ .

Formula (7.10) spune că putem gândi forma I-a fundamentală ca aplicație matriceal-valorată:

$$I : P \in S \rightarrow I(P) = g(P) \in M_2(TPS). \quad (7.15)$$

Există câteva notații tradiționale, prima fiind atribuită chiar lui Gauss cel care a dezvoltat enorm teoria clasică a suprafețelor:

$$g_{11} = E, \quad g_{12} = g_{21} = F, \quad g_{22} = G \quad (7.16)$$

sau încă:

$$I = g_{11}(du^1)^2 + 2g_{12}du^1du^2 + g_{22}(du^2)^2 = Edu^2 + 2Fdu^1du^2 + Gdv^2. \quad (7.17)$$

O altă proprietate remarcabilă a matricei  $g$  derivă din *identitatea Lagrange* a calculului vectorial:

$$\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle \langle \bar{b}, \bar{b} \rangle - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle^2 = \|\bar{a} \times \bar{b}\|^2 \quad (7.18)$$

care este consecința relației fundamentale:  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ .

Cu  $\bar{a} = \varphi_1(\bar{u}_0)$  și  $\bar{b} = \varphi_2(\bar{u}_0)$  obținem:

$$\det g(P) = E(P)G(P) - F(P)^2 = \|\varphi_1(\bar{u}_0) \times \varphi_2(\bar{u}_0)\|^2 > 0 \quad (7.19)$$

stricta pozitivitate fiind deci consecință a regularității lui  $S$  mai precis a ipotezei de imersie asupra aplicației  $\varphi$ . Deci  $g(P)$  este matrice inversabilă iar inversa sa o notăm:

$$g^{-1} = (g^{ij})_{i,j=1,2} = \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} \quad (7.20)$$

unde pentru simplitatea scrierii am renunțat la precizarea punctului  $P$ . Prin calcul se verifică imediat:

**Propoziția 7.5** i) Funcțiile  $g_{ij}, g^{ij} : U \rightarrow \mathbb{R}$  sunt netede pentru toți  $i, j \in \{1, 2\}$ .  
 ii) Pentru orice câmpuri vectoriale  $X, Y \in \mathcal{X}(U)$  aplicația  
 $(u, v) : U \rightarrow g(X, Y)(u, v) = g_{ij}(u, v)X^i(u, v)Y^j(u, v) \in \mathbb{R}$  este netedă.

În continuare studiem comportarea formei I-a fundamentale la o schimbare de parametrizări locale pe  $S$  în jurul lui  $P$ . Fie deci o nouă parametrizare locală  $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$  a lui  $S$  în jurul lui  $P$  și corespunzător  $\tilde{u}_0 = (\tilde{\varphi})^{-1}(P)$ . Mulțimea  $V = \varphi(U) \cap \tilde{\varphi}(\tilde{U})$  este deschisă în  $\mathbb{R}^3$  dar inclusă în  $S$  și conține pe  $P$ . Fie  $h = (\varphi)^{-1} \circ \tilde{\varphi} : \tilde{\varphi}^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^2$ . Această aplicație, numită *schimbare de parametrizări*, este netedă fiind compunerea a două aplicații netede, satisface  $h(\tilde{u}_0) = \bar{u}_0$  și are exprimarea de ecuații:

$$h : u^a = u^a(\tilde{u}^1, \tilde{u}^2), 1 \leq a \leq 2. \quad (7.21)$$

Avem:  $\tilde{\varphi} = \varphi \circ h$  și deci:

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{u}^i} \Big|_P = \frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial \tilde{u}^i}(\tilde{u}_0) = \frac{\partial \varphi \circ h}{\partial \tilde{u}^i}(\tilde{u}_0) = \frac{\partial u^a}{\partial \tilde{u}^i}(\tilde{u}_0) \cdot \frac{\partial}{\partial u^a} \Big|_P \quad (7.22)$$

ceea ce spune că elementele bazei  $\{\frac{\partial}{\partial u^i} \Big|_P, \frac{\partial}{\partial u^2} \Big|_P\}$  sunt *câmpuri tensoriale pe  $U$  de tip  $(1, 0)$* .

Relativ la forma I-a fundamentală avem:

$$\tilde{g}_{ij}(P) = \left\langle \frac{\partial}{\partial \tilde{u}^i} \Big|_P, \frac{\partial}{\partial \tilde{u}^j} \Big|_P \right\rangle_e = \left\langle \frac{\partial u^a}{\partial \tilde{u}^i} \frac{\partial}{\partial u^a} \Big|_P, \frac{\partial u^b}{\partial \tilde{u}^j} \frac{\partial}{\partial u^b} \Big|_P \right\rangle_e = \frac{\partial u^a}{\partial \tilde{u}^i} g_{ab}(P) \frac{\partial u^b}{\partial \tilde{u}^j} \quad (7.23)$$

ceea ce spune că setul de funcții  $(g_{ij}(\cdot))$  este un *câmp tensorial de tip  $(0, 2)$  pe  $U$* .

## SEMINARUL 7

Se cere forma I-a fundamentală pentru următoarele suprafețe  $S$  cu parametrizări globale:

**S7.1** de la S6.5.

**Rezolvare**  $E = 2, F = 0, G = u^2 + 2$ .

**S7.2** planul determinat de punctul  $P_0(\bar{r}_0)$  și vectorii necoliniari  $\bar{a}, \bar{b}$ .

**Rezolvare** Din  $\pi : \bar{r}(u, v) = \bar{r}_0 + u\bar{a} + v\bar{b}$  rezultă  $\bar{r}_u = \bar{a}, \bar{r}_v = \bar{b}$ . Deci:  $E = \|\bar{a}\|^2, F = \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle, G = \|\bar{b}\|^2$ . Putem cu procedeul Gram-Schmidt să alegem o bază ortonormată în  $\pi$  și deci  $E = G = 1, F = 0$ .

**S7.3 suprafața Enneper  $S$  :**  $\bar{r}(u, v) = (3u + 3uv^2 - u^3, 3v + 3u^2v - v^3, 3(u^2 - v^2))$ .

**Rezolvare** Avem  $\bar{r}_u = 3(1 - u^2 + v^2, 2uv, 2u), \bar{r}_v = 3(2uv, 1 + u^2 - v^2, -2v)$ . Deci:  $E = G = 9(1 + u^2 + v^2)^2, F = 0$ .

**S7.4 elipsoidul  $S$  :**  $\bar{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, hv)$  cu  $h > 0$  o constantă.

**Rezolvare**  $\bar{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \bar{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, h), E = 1, F = 0, G = u^2 + h^2$ .

**S7.5 suprafață Monge  $S$  :**  $z = f(x, y)$  folosind notațiile:  $p = f_x, q = f_y, r = f_{xx}, s = f_{xy}, z = f_{yy}$ .

**Rezolvare**  $\bar{r}_u = (1, 0, p), \bar{r}_v = (0, 1, q), E = 1 + p^2, F = pq, G = 1 + q^2$ .

**S7.6** paraboloidul hiperbolic  $S : z = xy$  sau încă  $P_h : \bar{r}(u, v) = (u, v, uv)$ .

**Rezolvare**  $p = y, q = x, E = 1 + y^2, F = xy, G = 1 + x^2$ . În a doua parametrizare:  $E = 1 + v^2, F = uv, G = 1 + u^2$ .

**S7.7**  $S : \bar{r}(u, v) = (a(\cos u - v \sin u), a(\sin u + v \cos u), b(u + v))$  cu  $a, b > 0$ .

**Rezolvare**  $\bar{r}_u = (-a(\sin u + v \cos u), a(\cos u - v \sin u), b), \bar{r}_v = (-a \sin u, a \cos v, b)$ . Deci:  $E = a^2(1 + v^2) + b^2$  și  $F = G = a^2 + b^2$ .

**S7.8** Se cere forma I-a fundamentală a următoarele suprafețe de rotație; a se vedea exercițiul S9.7 pentru expresia generală:

1) sfera de rază  $R$  centrată în origine  $S(O, R) : \bar{r}(u, v) = (R \cos u \cos v, R \sin u \cos v, R \sin v)$ .

Semnificația geometrică a coordonatelor:  $u$ =longitudinea iar  $v$ =latitudinea ! Avem  $(u, v) \in U = (0, 2\pi) \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ .

2) elipsoidul  $El : \bar{r}(u, v) = (a \cos u \cos v, a \sin u \cos v, b \sin v)$ ;  $El : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} - 1 = 0$ .

3) hiperboloidul cu o pânză  $H1 : \bar{r}(u, v) = (a \cosh u \cos v, a \cosh u \sin v, b \sinh u)$ .

4) hiperboloidul cu două pânze  $H2 : \bar{r}(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, b \cosh u)$ .

5) paraboloidul eliptic  $P_e : \bar{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, \frac{u^2}{2p})$  cu  $p > 0$ ;  $P_e : x^2 + y^2 - 2pz = 0$ .

**Rezolvare** 1)  $E = R^2 \cos^2 v, F = 0, G = R^2$ , 2)  $E = a^2 \cos^2 v, F = 0, G = a^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v$ ,

3)  $E = a^2 \sinh^2 u + b^2 \cosh^2 u, F = 0, G = a^2 \cosh^2 u$ ;  $H1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} - 1 = 0$ ,

4)  $E = a^2 \cosh^2 u + b^2 \sinh^2 u, F = 0, G = a^2 \sinh^2 u$ ;  $H2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} + 1 = 0$ ,

5)  $E = 1 + \frac{u^2}{p^2}, F = 0, G = u^2$ .



## Cursul 8

# Geometria intrinsecă a unei suprafețe

Fixăm  $S \subset \mathbb{R}^3$  o suprafață regulată și o parametrizare locală  $(U, \varphi)$  pe  $S$ . În Cursul precedent am introdus forma I-a fundamentală  $I$  având coeficienții  $(g_{11}(u, v), g_{12}(u, v), g_{22}(u, v)) = (E(u, v), F(u, v), G(u, v))$  în fiecare punct  $P(\varphi(\bar{u})) \in \varphi(U) \subseteq S$ ,  $\bar{u} = (u, v) = (u^1, u^2) = (u^i)_{i=1,2} \in U$ .

**Definiția 8.1** O proprietate *intrinsecă* a lui  $S$  este o proprietate ce depinde doar de coeficienții  $(g_{ij})$  (și derivatele lor parțiale în raport cu parametrii  $u, v$ ). Totalitatea proprietăților intrinseci ale lui  $S$  constituie *geometria intrinsecă* a lui  $S$ .

Dedicăm acest Curs studierii câtorva proprietăți intrinseci.

### I. Lungimea unui arc de curbă pe $S$

Fie  $C$  o curbă în spațiu,  $C : \bar{r} = \bar{\rho}(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ . Presupunem că există un arc  $[a, b] \subseteq I$  așa încât  $\bar{\rho}([a, b]) \subset \varphi(U) \subseteq S$ . Fie  $C_\varphi = \varphi^{-1} \circ \bar{\rho}$ .

Curbă  $C_\varphi : \bar{r} = \varphi^{-1} \circ \bar{\rho}(t), t \in [a, b]$  este o curbă pe  $U$  deci o curbă plană. Prin urmare avem  $C_\varphi : u = u(t), v = v(t), t \in [a, b]$  sau încă  $C_\varphi : u^i = u^i(t), t \in [a, b], i = 1, 2$ . Cum  $C = \varphi \circ C_\varphi$  rezultă că  $C$  are ecuația vectorială  $C : \bar{r} = \varphi(u(t), v(t)) = \varphi(u^1(t), u^2(t)), t \in [a, b]$  și deci vectorul tangent într-un punct generic  $P(u(t), v(t)) \in \varphi(U) \subseteq S$  este:

$$\bar{r}'(t) = \varphi_1(P)u'(t) + \varphi_2(P)v'(t) = u'(t)\varphi_1(P) + v'(t)\varphi_2(P). \quad (8.1)$$

Pentru a folosi formula (1.6) a lungimii unui arc de curbă a lui  $C$  avem nevoie de norma acestui vector și cu formulele din Cursul precedent rezultă:

$$\|\bar{r}'(t)\|^2 = \langle \bar{r}'(t), \bar{r}'(t) \rangle = g_{11}(P)(u'(t))^2 + 2g_{12}(P)u'(t)v'(t) + g_{22}(P)(v'(t))^2. \quad (8.2)$$

Avem atunci:

**Propoziția 8.2** Lungimea arcului de curbă  $[a, b]$  al curbei  $C \subset S$  este:

$$\begin{aligned} L(C|_{[a,b]}) &= \int_a^b \sqrt{g_{ij}(u(t), v(t)) \frac{du^i}{dt}(t) \frac{du^j}{dt}(t)} dt = \\ &= \int_a^b \sqrt{E(u(t), v(t))(u'(t))^2 + 2F(u(t), v(t))u'(t)v'(t) + G(u(t), v(t))(v'(t))^2} dt. \end{aligned} \quad (8.3)$$

**Exemple 8.3** Considerăm liniile parametrice pe  $S$ :

i)  $C_{u_0} : u = u_0, v = v(t) = v_0 + t, t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Avem:

$$L(C_{u_0}|_{[-\varepsilon, \varepsilon]}) = \int_a^b \sqrt{g_{22}(u_0, v_0 + t)} v'(t) dt. \quad (8.4)$$

ii)  $C_{v_0} : u = u(t) = u_0 + t, v = v_0, t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Avem:

$$L(C_{v_0}|_{[-\varepsilon, \varepsilon]}) = \int_a^b \sqrt{g_{11}(u_0 + t, v_0)} dt. \quad (8.5)$$

## II. Unghiul dintre două curbe pe $S$

Fie curbele pe  $S$ ,  $C_a : u = u_a(t), v = v_a(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$  cu  $a \in \{1, 2\}$  și punctul lor comun  $P$  corespunzător lui  $t_0 \in I$ . Considerăm  $\theta$  unghiul dintre tangenta  $T_1(t_0)$  la  $C_1$  în  $P$  și tangenta  $T_2(t_0)$  la  $C_2$  în  $P$ . Știm că unghiul dintre doi vectori nenuli este caracterizat de cosinusul său prin intermediul formulei:

$$\cos \theta = \frac{\langle T_1(t_0), T_2(t_0) \rangle}{\|T_1(t_0)\| \|T_2(t_0)\|}. \quad (8.6)$$

Deoarece:  $T_a(t_0) = u'_a(t_0)\varphi_1(P) + v'_a(t_0)\varphi_2(P)$  rezultă:

**Propoziția 8.4** Unghiul dintre cele două curbe pe  $S$  în punctul lor comun este dat de:

$$\cos \theta = \frac{E(P)u'_1(t_0)u'_2(t_0) + F(P)(u'_1(t_0)v'_2(t_0) + u'_2(t_0)v'_1(t_0)) + G(P)v'_1(t_0)v'_2(t_0)}{\sqrt{E(u'_1(t_0))^2 + 2Fu'_1(t_0)v'_1(t_0) + G(v'_1(t_0))^2} \sqrt{E(u'_2(t_0))^2 + 2Fu'_2(t_0)v'_2(t_0) + G(v'_2(t_0))^2}} \quad (8.7)$$

unde, și la numitor, coeficienții  $E, F, G$  sunt calculați tot în  $P$ .

**Exemplul 8.5** Fie curbele de coordonate de la Exemplele 8.3 și punctul lor comun  $P(u_0, v_0)$ . Avem:  $(u'_1, v'_1) = (0, 1)$  respectiv  $(u'_2, v'_2) = (1, 0)$  și deci:

$$\cos \theta = \frac{F(u_0, v_0)}{\sqrt{E(u_0, v_0)G(u_0, v_0)}}. \quad (8.8)$$

Rezultă că liniile parametrice ale lui  $S$  sunt ortogonale într-un punct al lui  $S$  dacă și numai dacă  $F$  se anulează în acel punct.

Mai general, reperul Gauss în  $P \in S$  este: i) ortogonal dacă și numai dacă  $F(P) = 0$ ,  
ii) ortonormat dacă și numai dacă  $g(P) = I_2$ .

## III. Aria unui compact pe $S$

Fie  $D \subseteq S$  o mulțime compactă (deci închisă și mărginită). Folosind teoria integralei duble de la Cursul de Analiză Matematică se arată imediat că aria lui  $D$  este:

$$A(S) = \int \int_D \sqrt{\det g(u, v)} dudv. \quad (8.9)$$

Prin urmare:

$$A(D) = \int \int_D \sqrt{E(u, v)G(u, v) - F^2(u, v)} dudv. \quad (8.10)$$

## Izometrii



**Definiția 8.6** Fie  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  și  $P \in S$ . Spunem că  $f$  este *netedă în  $P$*  dacă există o parametrizare locală  $(U, \varphi)$  a lui  $S$  în jurul lui  $P$  astfel încât funcția  $f_\varphi : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_\varphi = f \circ \varphi$  este netedă.  $f$  se numește *netedă* dacă este netedă în orice punct din  $S$ .

Fie  $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$  o altă parametrizare a lui  $S$  în jurul lui  $P$ . Fie  $V = \varphi(U) \cap \tilde{\varphi}(\tilde{U})$ .  $V$  este mulțime deschisă fiind intersecția a doi deschiși și conține pe  $P$  deci este nevidă. Fie aplicația:

$$h : \tilde{\varphi}^{-1}(V) \subseteq \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \varphi^{-1}(V) \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^2, h = \varphi \circ \tilde{\varphi} \quad (8.11)$$

numită *schimbarea de parametrizări locale pe  $S$* .

**Propoziția 8.7**  $h$  este difeomorfism de la  $\tilde{\varphi}^{-1}(V)$  la  $\varphi^{-1}(V)$ .

**Demostrație**  $h$  este bijecție cu  $h^{-1} = \tilde{\varphi}^{-1} \circ \varphi$ . Mai mult, din expresiile lor rezultă că  $h$  și  $h^{-1}$  sunt netede deoarece  $\varphi$  și  $\tilde{\varphi}$  cu inversele lor sunt netede.  $\square$

Avem:  $f_\varphi = f \circ \varphi$ ,  $f_{\tilde{\varphi}} = f \circ \tilde{\varphi} = f \circ 1_{\mathbb{R}^2} \circ \tilde{\varphi} = f \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ \tilde{\varphi} = f_\varphi \circ h$ . Prin urmare,  $f_\varphi$  este netedă dacă și numai dacă  $f_{\tilde{\varphi}}$  este netedă ceea ce arată că noțiunea introdusă în Definiția 8.6 nu depinde de parametrizarea locală aleasă !

Fie  $F : S_1 \rightarrow S_2$  o aplicație între două suprafețe și  $P \in S_1$  fixat.

**Definiția 8.8**  $F$  se numește *netedă în  $P$*  dacă există o parametrizare locală  $(U, \varphi)$  a lui  $S_1$  în jurul lui  $P$  și există o parametrizare locală  $(V, \psi)$  a lui  $S_2$  în jurul lui  $F(P)$  cu  $F(\varphi(U)) \subseteq \psi(V)$  astfel încât funcția  $F_{\varphi, \psi} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^2$ ,  $F_{\varphi, \psi} = \psi^{-1} \circ F \circ \varphi$  este netedă.

Fie  $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$  o altă parametrizare locală a lui  $S_1$  în jurul lui  $P$  și  $(\tilde{V}, \tilde{\psi})$  o altă parametrizare locală a lui  $S_2$  în jurul lui  $F(P)$ . Ca mai sus avem schimbările de parametrizări locale:

$$h_1 = \varphi^{-1} \circ \tilde{\varphi}, \quad h_2 = \psi^{-1} \circ \tilde{\psi} \quad (8.12)$$

respectiv expresia lui  $F$  în cele două perechi de parametrizări:

$$F_{\varphi, \psi} = \psi^{-1} \circ F \circ \varphi, \quad F_{\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}} = \tilde{\psi}^{-1} \circ F \circ \tilde{\varphi}. \quad (8.13)$$

Avem:

$$F_{\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}} = \tilde{\psi}^{-1} \circ \psi \circ \psi^{-1} \circ F \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ \tilde{\varphi} = h_2^{-1} \circ F_{\varphi, \psi} \circ h_1$$

ceea ce arată că  $F_{\varphi, \psi}$  este netedă dacă și numai dacă  $F_{\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}}$  este netedă. Prin urmare, noțiunea din Definiția 8.8 nu depinde de parametrizări locale !

Avem:

$$F_{\varphi, \psi} : \tilde{u} = F^1(u, v), \quad \tilde{v} = F^2(u, v). \quad (8.14)$$

Presupunem în continuare că  $F$  este netedă în  $P$  și considerăm, ca în Cursul 6, o curba pe  $S_1$  prin acest punct,  $C : u = u(t), v = v(t), t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ , deci  $u(0) = u_0$  și  $v(0) = v_0$ . Știm că  $T_P S_1$  este mulțimea tangentelor  $\{u'(0)\varphi_1(P) + v'(0)\varphi_2(P)\}$  în  $P$  la toate aceste curbe.

**Definiția 8.9** *Diferențiala* lui  $F$  în  $P$  este aplicația  $dF_P : T_P S_1 \rightarrow T_{F(P)} S_2$  dată de:

$$dF_P(u'(0), v'(0)) = \left( \frac{d}{dt} F^1(u(t), v(t)), \frac{d}{dt} F^2(u(t), v(t)) \right) \Big|_{t=0}. \quad (8.15)$$

Putem gândi și vectorial; dacă  $C : \tilde{r} = \tilde{r}(t), t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$  este ecuația lui  $C$  privită în spațiul  $\mathbb{R}^3$  atunci:

$$dF_P(\tilde{r}'(0)) = (F \circ \tilde{r})'(0) \quad (8.16)$$

unde și  $f$  este gândită în spațiul ambient  $f : (x, y, z) \in S_1 \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) \in S_2 \subset \mathbb{R}^3$ .

**Proprietăți ale diferențialei 8.10**

i) este transformare liniară:

$$dF_P(\lambda X + \mu Y) = \lambda dF_P(X) + \mu dF_P(Y).$$

ii) (regula lanțului) dacă  $S_3$  este o a treia suprafață și avem  $G : S_2 \rightarrow S_3$  netedă atunci:

$$d(G \circ F)_P = dG_{F(P)} \circ dF_P. \quad (8.17)$$

**Definiția 8.11** i)  $F : S_1 \rightarrow S_2$  se numește *difeomorfism* dacă este bijecție și  $F, F^{-1}$  sunt netede în orice punct. În acest caz, spunem că  $S_1$  și  $S_2$  sunt *difeomerfe*.

ii)  $F$  se numește *izometrie în  $P$*  dacă este netedă în  $P$  și invariază formele I-a fundamentale adică:

$$I_2(F(P))(dF_P(X), dF_P(Y)) = I_1(P)(X, Y) \quad (8.18)$$

pentru orice  $X, Y \in T_P S_1$ .

iii)  $F$  se numește *izometrie locală* dacă pentru orice  $P \in S_1$  există un deschis  $D$  pe  $S_1$  cu  $P \in D$  așa încât  $F$  este izometrie în orice punct din  $D$ .  $F$  se numește *izometrie* dacă este izometrie locală și difeomorfism.

iv) Suprafețele  $S_1, S_2$  se numesc *izometrice* dacă există o izometrie între ele.

v) Mulțimea  $Izom(S)$  a izometriilor suprafeței  $S$  constituie grup în raport cu operații de compunere a funcțiilor.  $Izom(S)$  se numește *grupul izometriilor* lui  $S$ .

**Observații 8.12** i)  $Izom(S)$  este mulțime nevidă deoarece aplicația identică  $1_S$  este izometrie. Diferențiala sa este:  $d(1_S)_P = 1_{T_P S}$ .

ii)  $Izom(xOy)$  este exact  $Izom(2)$  din Definiția 3.3.

iii) Dat  $A \in O(3)$  aplicația liniară asociată  $T_A : x \in \mathbb{R}^3 \rightarrow A \cdot x \in \mathbb{R}^3$  se restricționează la o izometrie a lui  $S^2$ . Reciproc, dacă  $f \in Izom(S^2)$  atunci există  $A = A_f \in O(3)$  așa încât  $f = T_A$ .

**Exemplu 8.13** Fie  $S_1$  planul  $xOy$  și  $S_2$  cilindrul  $x^2 + y^2 = 1$ . Considerăm  $F : S_1 \rightarrow S_2$ ,  $F(x, y, 0) = (\cos x, \sin x, y)$ . Avem că  $F$  este netedă în orice punct din  $S_1$ . Mai mult,  $F$  este izometrie locală deoarece  $S_1$  și  $S_2$  au aceeași formă fundamentală  $g = I_2$ . Dar  $F$  nu este izometrie globală deoarece nu este injectivă !

## SEMINARUL 8

**S8.1** Pe suprafața (paraboloid)  $S : x^2 + y^2 = 2\rho z$  se dau curbele  $C_1 : x = y$ ,  $C_2 : z = a$  unde  $\rho$  și  $a$  sunt constante reale strict pozitive. Se cere unghiul  $\theta$  dintre curbe.

**Rezolvare** Parametrizăm suprafața  $S : \bar{r}(u, v) = (u, v, \frac{1}{2\rho}(u^2 + v^2))$  și obținem:  $E = 1 + \frac{u^2}{\rho^2}$ ,  $F = \frac{uv}{\rho^2}$ ,  $G = 1 + \frac{v^2}{\rho^2}$ . Punctul de intersecție al curbelor este  $P(\sqrt{\rho a}, \sqrt{\rho a}, a)$  și deci  $C_1 : u_1(t) = v_1(t) = t + \sqrt{\rho a}$ . Pentru a doua curbă din  $u^2(t) + v^2(t) = 2\rho a$  și  $u(0) = v(0) = \sqrt{\rho a}$  rezultă parametrizarea  $C_2 : u_2(t) = \sqrt{2\rho a} \cos(\frac{\pi}{4} - t)$ ,  $v_2(t) = \sqrt{2\rho a} \sin(\frac{\pi}{4} - t)$ . Avem deci derivatele:

$$\begin{cases} u'_1 = v'_1 = 1, \\ u'_2(t) = \sqrt{2\rho a} \sin(\frac{\pi}{4} - t), \quad v'_2(t) = -\sqrt{2\rho a} \cos(\frac{\pi}{4} - t) \end{cases}$$

ceea ce dă:  $u'_2(0) = \sqrt{\rho a}$ ,  $v'_2(0) = -\sqrt{\rho a}$ . Numitorul fracției (8.9) este:

$$\left(1 + \frac{u(0)^2}{\rho^2}\right)\sqrt{\rho a} + \frac{u(0)v(0)}{\rho^2}(-\sqrt{\rho a} + \sqrt{\rho a}) + \left(1 + \frac{v(0)^2}{\rho^2}\right)(-\sqrt{\rho a}) = \frac{\sqrt{\rho a}}{\rho^2}(u(0)^2 - v(0)^2)$$

care este zero datorită ecuației curbei  $C_1$ . Deci cele două curbe sunt perpendiculare în punctul de intersecție.

**S8.2** Pentru suprafața  $S : \bar{r}(u, v) = (u, v, u(1+v))$  se cere unghiul  $\varphi$  dintre curbele de coordonate respectiv unghiurile  $\theta_1, \theta_2$  dintre curba  $C : u + v = 0$  și curbele de coordonate.

**Rezolvare** Se obține imediat:  $E = 1 + (1+v)^2$ ,  $F = u(1+v)$ ,  $G = 1 + u^2$ . Dacă  $P(u_0, v_0)$  este punctul generic al lui  $S$  atunci din formula (8.10) avem:  $\cos \varphi = \frac{u_0(1+v_0)}{\sqrt{(1+u_0^2)[1+(1+v_0^2)]}}$ . Punctul de intersecție dintre  $C$  și  $C_{u_0}$  este  $P_1(u_0, -u_0)$  iar cel dintre  $C$  și  $C_{v_0}$  este  $P_2(-v_0, v_0)$ .

În cele ce urmează prezentăm o formulă alternativă pentru (8.9). Astfel, dacă cele două curbe ce se intersectează au tangentele:  $d\bar{r} = \bar{r}_u du + \bar{r}_v dv$ ,  $\delta\bar{r} = \bar{r}_u \delta u + \bar{r}_v \delta v$  atunci unghiul cerut este dat de:

$$\cos \theta = \frac{Edu\delta u + F(du\delta v + \delta u dv) + Gdv\delta v}{\sqrt{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2} \cdot \sqrt{E\delta u^2 + F\delta u\delta v + G\delta v^2}}. \quad (8.18)$$

Revenind la problema dată pentru  $C_{u_0}$  avem:  $du = 0$  iar pentru  $C_{v_0}$  avem  $dv = 0$  în timp ce  $C$  este dată de  $\delta v = -\delta u$ . Folosind (8.18) rezultă:

$$\cos \theta_1 = \frac{Fdv\delta u + Gdv(-\delta u)}{\sqrt{Gdv}\sqrt{E - 2F + G\delta u}} = \frac{F - G}{\sqrt{G(E - 2F + G)}} = \frac{u_0 - 2u_0^2 - 1}{\sqrt{(1 + u_0^2)(4u_0^2 - 4u_0 + 3)}}$$

respectiv:

$$\cos \theta_2 = \frac{Edu\delta u + Fdu(-\delta u)}{\sqrt{Edu}\sqrt{E - 2F + G\delta u}} = \frac{E - F}{\sqrt{E(E - 2F + G)}} = \frac{2v_0^2 + 3v_0 + 2}{\sqrt{(v_0^2 + 2v_0 + 2)(4v_0^2 + 4v_0 + 3)}}$$

**S8.3** Pentru  $S : \bar{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u + v)$  se cere unghiul dintre curbele de coordonate.

**Rezolvare**  $E = 2$ ,  $F = 2$ ,  $G = u^2 + 1$ ,  $\cos \theta = \frac{1}{2(u_0^2 + 1)}$ .

**S8.4** Pentru suprafața  $S$  de la Exercițiul S6.5 se cere forma I-a fundamentală.

**Rezolvare** Cum  $\bar{r}_u = (\cos v, \sin v, 1)$ ,  $\bar{r}_v = (-u \sin v + \cos v, u \cos v + \sin v, -1)$  rezultă:  $E = 2$ ,  $F = 0$ ,  $G = u^2 + 2$ .

Prin urmare putem scrie:

$$I(S) = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix} = 2 \text{diag}(1, u^2 + 1).$$

Conform exercițiului S7.4 avem că forma I-a a elicoidului  $S_h$  este:

$$I(S_h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + h^2 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, u^2 + h^2).$$

Prin urmare avem  $I(S) = 2I(S_{(h=1)})$ . Două suprafețe cu metricile diferind printr-un factor se numesc *conform echivalente* iar două metrice se diferă printr-un factor se numesc *conforme*, factorul respectiv fiind factorul de conformalitate.

**S8.5** Să se exprime metrica Euclidiană a spațiului minus originea  $g = ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  în coordonate sferice.

**Rezolvare** Legătura dintre coordonatele carteziene  $(x, y, z)$  și coordonatele sferice  $(\rho, \varphi, \theta)$  (numite și *coordonate polare în spațiu*) este dată de:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi. \end{cases}$$

Prin calcule rezultă:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + \rho^2 \sin^2 \theta d\theta^2. \quad (8.19)$$

**S8.6** Să se exprime metrica Euclidiană a planului minus originea  $g = ds^2 = dx^2 + dy^2$  în coordonate polare  $(r, \varphi)$ .

**Rezolvare** Din:  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$  rezultă:  $dx = \cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi$  și  $dy = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi$  ceea ce implică:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2. \quad (8.20)$$

Sub această formă, metrica este de tip *warped*; a se vedea și exercițiul 14.4 !

**S8.7** Se cere aria și volumul sferei  $S(O, R)$ .

**Rezolvare** Parametrizarea sferei este conform exercițiului 7.7 și folosim formula (8.10) cu  $D = [0, 2\pi] \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . Din:  $E = R^2 \cos^2 v$ ,  $F = 0$ ,  $G = R^2$  avem:

$$A(S(O, R)) = R^2 \int_0^{2\pi} du \left( \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos v dv \right) = 2\pi R^2 \cdot \left( \sin v \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \right) = 2\pi R^2 \cdot (1 - (-1)) = 4\pi R^2. \quad (8.21)$$

Volumul este:

$$V(S(O, R)) = \int_0^R A(S(O, r)) dr = 4\pi \cdot \int_0^R r^2 dr = 4\pi \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^R = \frac{4}{3} \pi R^3. \quad (8.22)$$

Un program C++ cu  $u = \theta$  și  $v = \phi$ .

```
#include "3dframe.CPP"
void draw_sphere()
{
int arr[4];
int rad=1500;
for(double i=0;i<=90;i=i+1)
{
double phi=((3.14159)/180)*i;
for(double j=0;j<90;j=j+0.005)
{
```

```

double theta, x, y, z;
theta=((3.14159)/180)*j;
x=rad*cos(theta)*cos(phi);
y=rad*sin(theta)*cos(phi);
z=rad*sin(phi);
putxyz(int(x),-int(y),(int)z,arr,BLUE);
putxyz(int(x),-int(y),-(int)z,arr, BLUE);
putxyz(-int(x),-int(y),(int)z,arr,MAGENTA);
putxyz(-int(x),-int(y),-(int)z,arr,MAGENTA);
}
}
for(i=0;i<=90;i=i+1)
{

double phi=((3.14159)/180)*i;
for(double j=0;j<90;j=j+0.005)
{
double theta, x, y, z;
theta=((3.14159)/180)*j;
x=rad*cos(theta)*cos(phi);
y=rad*sin(theta)*cos(phi);
z=rad*sin(phi);
putxyz(int(x),int(y),(int)z,arr,GREEN);
putxyz(int(x),int(y),-(int)z,arr,GREEN);
putxyz(-int(x),int(y),-(int)z,arr,RED);
putxyz(-int(x),int(y),(int)z,arr,RED);
}
}
}
void main()
{
int gd=DETECT,gm;
initgraph(&gd, &gm,"c:
tc
bgi");
DRAW3DFRAME();
cleardevice();
draw_sphere();
getch();
closegraph();
}

```



## Cursul 9

# Forma a II-a fundamentală

Fixăm suprafața regulată și orientabilă  $S \subset \mathbb{R}^3$  și punctul generic  $P \in S$ . Din orientabilitate, avem că aplicația  $\bar{N} : P \in S \rightarrow \bar{N}(P) \in S^2$  este continuă și observăm din expresia sa într-o parametrizare locală că este chiar diferențiabilă.

**Definiția 9.1** Funcția  $\bar{N} : S \rightarrow S^2$  se numește *aplicația sferică (Gauss)* a lui  $S$ .

Să observăm că  $T_P S$  și  $T_{\bar{N}(P)} S^2$  sunt plane în spațiul fizic  $\mathbb{R}^3$ , ambele perpendiculare pe vectorul  $\bar{N}(P)$  și deci coincid! Prin urmare, diferențiala aplicației Gauss este:  $d\bar{N}_P : T_P S \rightarrow T_{\bar{N}(P)} S^2 = T_P S$  și deci o gândim ca endomorfism liniar al lui  $T_P S$ .

**Definiția 9.2** Endomorfismul liniar  $A_P : T_P S \rightarrow T_P S$  dat de  $A_P = -dN_P$  se numește *operatorul Weingarten* sau *operatorul shape* (formă) al lui  $S$ .

Fixăm o parametrizare locală  $(U, \varphi)$  a lui  $S$  în jurul lui  $P$ ; deci  $P = \varphi(\bar{u}_0)$  cu  $\bar{u}_0 = (u_0, v_0) = (u_0^i)_{i=1,2}$ . Vrem imaginea bazei canonice  $\{\varphi_1(\bar{u}_0), \varphi_2(\bar{u}_0)\}$  a lui  $T_P S$  prin  $dN_P$ . Reamintim că:

- i)  $\varphi_1(\bar{u}_0)$  este vectorul tangent în  $P$  la linia parametrică  $C_{v_0} : u = u_0 + t, v = v_0, t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Notăm  $\bar{r}_{v_0}(t) \in \mathbb{R}^3$  vectorul generic de poziție al curbei  $C_{v_0}$ ,
- ii) analog  $\varphi_2(\bar{u}_0)$  este vectorul tangent în  $P$  la linia parametrică  $C_{u_0} : u = u_0, v = v_0 + t$ . Fie  $\bar{r}_{u_0}(t) \in \mathbb{R}^3$  vectorul generic de poziție al curbei  $C_{u_0}$ .

**Propoziția 9.3** *Avem:*

$$d\bar{N}_P(\varphi_1(\bar{u}_0)) = \bar{N}_u(\bar{u}_0), \quad d\bar{N}_P(\varphi_2(\bar{u}_0)) = \bar{N}_v(\bar{u}_0). \quad (9.1)$$

**Demonstrație** Avem:

$$\begin{aligned} d\bar{N}_P(\varphi_1(\bar{u}_0)) &= \frac{d}{dt}(\bar{N}(\bar{r}_{v_0}(t)))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(N^1(u(t), v_0), N^2(u(t), v_0), N^3(u(t), v_0))|_{t=0} = \\ &= (N_u^1(P)u'(0), N_u^2(P)u'(0), N_u^3(P)u'(0)) = \bar{N}_u(P). \end{aligned}$$

Analog:

$$\begin{aligned} d\bar{N}_P(\varphi_2(\bar{u}_0)) &= \frac{d}{dt}(\bar{N}(\bar{r}_{u_0}(t)))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(N^1(u_0, v(t)), N^2(u_0, v(t)), N^3(u_0, v(t)))|_{t=0} = \\ &= (N_v^1(P)v'(0), N_v^2(P)v'(0), N_v^3(P)v'(0)) = \bar{N}_v(P). \end{aligned}$$

Deci avem concluzia cerută.  $\square$

**Propoziția 9.4** *Operatorul shape este autoadjunct relativ la forma I-a fundamentală.*

**Demonstrație** Trebuie să verificăm identitatea:

$$I(P)(A_P(X), Y) = I(P)(X, A_P(Y)) \quad (9.2)$$

pentru orice  $X, Y \in T_P S$ . Din liniaritatea lui  $A_P$  și bilinearitatea lui  $I(P)$  rezultă că este suficientă verificarea lui (9.2) pe perechile: 1)  $(\varphi_1(\bar{u}_0), \varphi_1(\bar{u}_0))$ ,  $(\varphi_2(\bar{u}_0), \varphi_2(\bar{u}_0))$ , 2)  $(\varphi_1(\bar{u}_0), \varphi_2(\bar{u}_0))$ , 3)  $(\varphi_2(\bar{u}_0), \varphi_1(\bar{u}_0))$ . Pe perechile din 1) verificarea este trivială. Pentru perechea din 2) avem, datorită lui (9.1):

$$\begin{cases} I(P)(A_P(\varphi_1), \varphi_2) = I(P)(-\bar{N}_u, \varphi_v) = - \langle \bar{N}_u, \varphi_v \rangle, \\ I(P)(\varphi_1, A_P(\varphi_2)) = I(P)(\varphi_u, -\bar{N}_v) = - \langle \varphi_u, \bar{N}_v \rangle. \end{cases} \quad (9.3)$$

Derivăm relațiile:

$$\langle \varphi_u, \bar{N} \rangle = 0, \langle \varphi_v, \bar{N} \rangle = 0$$

prima în raport cu  $v$  iar a doua în raport cu  $u$ :

$$\begin{cases} \langle \varphi_{uv}, \bar{N} \rangle + \langle \varphi_u, \bar{N}_v \rangle = 0, \\ \langle \varphi_{vu}, \bar{N} \rangle + \langle \varphi_v, \bar{N}_u \rangle = 0. \end{cases} \quad (9.4)$$

Datorită comutării  $\varphi_{uv} = \varphi_{vu}$  rezultă:

$$\langle \varphi_u, \bar{N}_v \rangle = \langle \varphi_v, \bar{N}_u \rangle \quad (9.5)$$

și revenind la (9.3) avem egalitatea cerută. Analog pentru perechea 3).  $\square$

O altă noțiune esențială în geometria suprafețelor este:

**Definiția 9.5** Numim *forma a II-a fundamentală* a lui  $S$  setul de aplicații  $(II(P))_{P \in S}$  cu  $II(P) : T_P S \times T_P S \rightarrow \mathbb{R}$  dată de:

$$II(P)(X, Y) = I(P)(A_P(X), Y). \quad (9.6)$$

**Proprietăți:**

- i)  $II(P)$  este formă biliniară pe  $T_P S$  deoarece  $I(P)$  este formă biliniară iar  $A_P$  este operator liniar,
- ii)  $II(P)$  este simetrică datorită relației (9.2),
- iii) în general nu avem pozitivă definită a lui  $II(P)$ ; deci  $II(P)$  nu este produs scalar asemenea lui  $I(P)$ !

Cu aceleași argumente ca în Cursul 7 avem:

$$II(P)(X, Y) = X^i b_{ij} Y^j \quad (9.7)$$

unde  $b = (b_{ij}) \in M_n(T_P S)$  este *matricea formei II-a fundamentale*. Rezultă că putem scrie (9.7) matriceal:

$$II(P)(X, Y) = X^t \cdot b \cdot Y \quad (9.8)$$

reamintind că vectorii tangenți  $X, Y \in T_P S$  sunt gândiți pe **coloană**. Altfel spus, avem:

$$II(P)(X, Y) = \begin{pmatrix} X^1(P) & X^2(P) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y^1(P) \\ Y^2(P) \end{pmatrix} \quad (9.9)$$



relație în care pentru simplificarea notației am omis dependența de  $P$  a funcțiilor  $b_{ij} : S \rightarrow \mathbb{R}$  unde:

$$b_{ij}(P) = II(P)(\varphi_i, \varphi_j) = I(P)(A_P(\varphi_i), \varphi_j). \quad (9.10)$$

Mai precis, funcțiile *coeficienți* ai formei II-a fundamentale sunt:

$$\boxed{\begin{cases} b_{11} = \langle A_P(\varphi_1), \varphi_1 \rangle = - \langle \bar{N}_1, \varphi_1 \rangle = \langle \varphi_{11}, \bar{N} \rangle \\ b_{12} = b_{21} = \langle A_P(\varphi_1), \varphi_2 \rangle = - \langle \bar{N}_1, \varphi_2 \rangle = \langle \varphi_{12}, \bar{N} \rangle \\ b_{22} = \langle A_P(\varphi_2), \varphi_2 \rangle = - \langle \bar{N}_v, \varphi_2 \rangle = \langle \varphi_{22}, \bar{N} \rangle \end{cases}} \quad (9.11)$$

unde am folosit deja simetria lui  $b$ :

$$b^t = b \quad (9.12)$$

și relațiile (9.4) respectiv analogele:

$$\begin{cases} \langle \varphi_{uu}, \bar{N} \rangle + \langle \varphi_u, \bar{N}_u \rangle = 0, \\ \langle \varphi_{vv}, \bar{N} \rangle + \langle \varphi_v, \bar{N}_v \rangle = 0. \end{cases} \quad (9.13)$$

Puем scrie în mod unitar:

$$b_{ij} = \langle \varphi_{ij}, \bar{N} \rangle. \quad (9.14)$$

Notăția Gauss este:

$$b_{11} = L, \quad b_{12} = b_{21} = M, \quad b_{22} = N. \quad (9.15)$$

## SEMINARUL 9

**S9.1** Se cere forma a II-a fundamentală pentru  $S$  de la S6.5.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{N} = \frac{1}{\sqrt{2u^2+4}}(-u \cos v - 2 \sin v, -u \sin v + 2 \cos v, u)$  și  $\bar{r}_{uu} = \bar{0}$ ,  $\bar{r}_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0)$ ,  $\bar{r}_{vv} = (-u \cos v - \sin v, -u \sin v + \cos v, 0)$ . Rezultă:  $L = 0$ ,  $M = \sqrt{\frac{2}{u^2+2}}$ ,  $N = \sqrt{\frac{u^2+2}{2}}$ .

**S9.2** Se cere forma a II-a fundamentală pentru planul S7.2.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{N} = \frac{\bar{a} \times \bar{b}}{\|\bar{a} \times \bar{b}\|}$  și  $\bar{r}_{uu} = \bar{r}_{uv} = \bar{r}_{vv} = \bar{0}$ . Deci:  $L = M = N = 0$ .

**S9.3** Se cere forma a II-a fundamentală pentru suprafața Enneper S9.3.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{N} = \frac{1}{1+u^2+v^2}(-2u, 2v, 1-u^2-v^2)$  și  $\bar{r}_{uu} = 6(-u, v, 1)$ ,  $\bar{r}_{uv} = 6(v, u, 0)$ ,  $\bar{r}_{vv} = 6(u, -v, -1)$ . Rezultă:  $L = 6$ ,  $M = 0$ ,  $N = -6$ .

**S9.4** Se cere forma a II-a fundamentală pentru elicoidul S7.4.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{N} = \frac{1}{\sqrt{u^2+h^2}}(h \sin v, -h \cos v, u)$  și  $\bar{r}_{uu} = \bar{0}$ ,  $\bar{r}_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0)$ ,  $\bar{r}_{vv} = (-u \cos v, -u \sin v, 0)$ . Rezultă:  $L = 0$ ,  $M = \frac{-h}{\sqrt{u^2+h^2}}$ ,  $N = 0$ .

**S9.5** Se cere forma a II-a fundamentală pentru suprafața Monge S7.5.

**Rezolvare** Avem:  $\bar{N} = \frac{1}{\sqrt{p^2+q^2+1}}(-p, -q, 1)$  și  $\bar{r}_{uu} = (0, 0, r)$ ,  $\bar{r}_{uv} = (0, 0, s)$ ,  $\bar{r}_{vv} = (0, 0, t)$ . Rezultă:  $L = \frac{r}{\sqrt{p^2+q^2+1}}$ ,  $M = \frac{s}{\sqrt{p^2+q^2+1}}$ ,  $N = \frac{t}{\sqrt{p^2+q^2+1}}$ .

**S9.6** Se cere forma a II-a fundamentală pentru paraboloidul hiperbolic S7.6.

**Rezolvare** Deoarece  $r = t = 0$ ,  $s = 1$  aplicând exercițiul precedent avem:  $L = 0$ ,  $M = \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$ ,  $N = 0$ .

**S9.7** Se cer cele două forme fundamentale pentru o suprafață de rotație  $S$  având axa  $Oz$  ca axă de rotație și curba meridian în planul  $xOz$  de forma  $C : x = \varphi(u)$ ,  $z = \psi(u)$ .

**Rezolvare** Efectuăm o rotație de unghi  $v$  în jurul axei de rotație și obținem ecuația vectorială a suprafețelor de rotație:

$$S : \bar{r}(u, v) = (\varphi(u) \cos v, \varphi(u) \sin v, \psi(u)). \quad (9.15)$$

Avem tabelul:

$\bar{r}$	$x$	$y$	$z$
$\bar{r}_u$	$\varphi' \cos v$	$\varphi' \sin v$	$\psi'$
$\bar{r}_v$	$-\varphi \sin v$	$\varphi \cos v$	$0$
$\bar{r}_{uu}$	$\varphi'' \cos v$	$\varphi'' \sin v$	$\psi''$
$\bar{r}_{uv}$	$-\varphi' \sin v$	$\varphi' \cos v$	$0$
$\bar{r}_{vv}$	$-\varphi \cos v$	$-\varphi \sin v$	$0$
$\bar{N}$	$\frac{-\psi' \cos v}{\sqrt{(\varphi')^2 + (\psi')^2}}$	$\frac{-\psi' \sin v}{\sqrt{(\varphi')^2 + (\psi')^2}}$	$\frac{\varphi'}{\sqrt{(\varphi')^2 + (\psi')^2}}$

de unde rezultă:

$$\begin{cases} E = (\varphi')^2 + (\psi')^2, & F = 0, & G = \varphi^2, & EG - F^2 = \varphi^2((\varphi')^2 + (\psi')^2), \\ L = \frac{\varphi' \psi'' - \varphi'' \psi'}{\sqrt{(\varphi')^2 + (\psi')^2}}, & M = 0, & N = \frac{\varphi \psi'}{\sqrt{(\varphi')^2 + (\psi')^2}}. \end{cases}$$

**S9.8** Aceeași problemă pentru *cilindrul circular drept*:  $\varphi(u) = 1$ ,  $\psi(u) = Ru$  cu  $R > 0$ .

**Rezolvare** Din formulele precedente avem:  $E = R^2$ ,  $F = 0$ ,  $G = 1$ ,  $EG - F^2 = R^2$ ,  $L = M = 0$ ,  $N = 1$ . Aplicația Gauss este:  $\bar{N}(u, v) = -(\cos v, \sin v, 0)$  și imaginea sa este cercul  $S^1 = \text{ecuatorul lui } S^2$ .

**S9.9** Aceeași problemă pentru curba meridian  $C$  parametrizată canonic.

**Rezolvare** Din parametrizarea canonică avem:  $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$  și deci:  $E = 1$ ,  $F = 0$ ,  $G = \varphi^2$ ,  $EG - F^2 = \varphi^2$ ,  $L = \varphi' \psi'' - \varphi'' \psi'$ ,  $M = 0$ ,  $N = \varphi \psi'$ .

**S9.10** Aceeași problemă pentru  $S(O, R)$  dată de (5.12).

**Rezolvare** Avem:  $\varphi(u) = R \cos u$ ,  $\psi(u) = R \sin u$  și aplicând formulele de la S9.7 avem:  $E = R^2$ ,  $F = 0$ ,  $G = R^2 \cos^2 u$ ,  $EG - F^2 = R^4 \cos^2 u$ ,  $L = R$ ,  $M = 0$ ,  $N = R \cos^2 u$ . Aplicația Gauss a sferei este:

$$\bar{N}(u, v) = -(\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u)$$

și se observă că nu depinde de raza sferei. Este exact aplicația antipodală și imaginea este toată sfera  $S^2$ .

**S9.11** Aceeași problemă pentru *pseudosfera*:  $\varphi(u) = R \sin u$ ,  $\psi(u) = R(\cos u + \ln \operatorname{tg} \frac{u}{2})$ .

**Rezolvare**  $E = R^2 \operatorname{ctg}^2 u$ ,  $F = 0$ ,  $G = R^2 \sin^2 u$ ,  $EG - F^2 = R^4 \cos^2 u$ ,  $L = -R \operatorname{ctg} u$ ,  $M = 0$ ,  $N = R \sin u \cos u$ . Aplicația Gauss este:  $\bar{N}(u, v) = (-\cos u \cos v, -\cos u \sin v, \sin u)$ .

**S9.12** Aceeași problemă pentru *tor*:  $\varphi(u) = R + r \cos u$ ,  $\psi(u) = r \sin u$ .

**Rezolvare**  $E = r^2$ ,  $F = 0$ ,  $G = (R + r \cos u)^2$ ,  $EG - F^2 = r^2(R + r \cos u)^2$ ,  $L = r$ ,  $M = 0$ ,  $N = \cos u(R + r \cos u)$ . Cum  $u, v \in [0, 2\pi]$  aria torului este:

$$A(T(r, R)) = r \int_0^{2\pi} dv \cdot \int_0^{2\pi} (R + r \cos u) du = 2\pi r \cdot (Ru + r \sin u)|_0^{2\pi} = 2\pi r \cdot 2\pi R = 4\pi^2 r R \quad (9.16)$$

exact aria pătratului de laturi:  $2\pi r$  și  $2\pi R$  sau încă, aria cilindrului de lungime  $2\pi R$  și rază  $r$ . Volumul torului este:

$$V(T(r, R)) = \int_0^r A(T(t, R)) dt = 2\pi^2 R \cdot \int_0^r 2t dt = 2\pi^2 R \cdot t^2|_0^r = 2\pi^2 R r^2. \quad (9.17)$$

**S9.13** Aceeași problemă pentru *conul circular*:  $\varphi(u) = u$ ,  $\psi(u) = Ru$ .

**Rezolvare**  $E = 1 + R^2$ ,  $F = 0$ ,  $G = u^2$ ,  $EG - F^2 = (1 + R^2)u^2$ ,  $L = M = 0$ ,  $N = \frac{Ru}{\sqrt{1+R^2}}$ . Aplicația Gauss este:

$$\bar{N}(u, v) = \left( -\frac{R \cos v}{\sqrt{R^2 + 1}}, -\frac{R \sin v}{\sqrt{R^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{R^2 + 1}} \right)$$

deci a treia componentă  $z_N$  este o constantă (evident subunitară) și  $x_N^2 + y_N^2 = \frac{R^2}{R^2 + 1} = \text{constant}$ . Deci imaginea aplicației Gauss constă într-un cerc pe  $S^2$  la cota  $z_N = \frac{1}{\sqrt{R^2 + 1}}$ .

**S9.14** Aceeași problemă pentru *catenoid*:  $\varphi(u) = R \cosh u$ ,  $\psi(u) = Ru$ .

**Rezolvare**  $E = G = R^2 \cosh^2 u$ ,  $F = 0$ ,  $EG - F^2 = R^4 \cosh^4 u$ ,  $L = -N = -R$ ,  $M = 0$ . Aplicația Gauss este:

$$\bar{N}(u, v) = \left( -\frac{\cos v}{\cosh u}, -\frac{\sin v}{\cosh u}, \frac{\sinh u}{\cosh u} \right).$$



## Cursul 10

# Curbura normală. Curburi principale. Curbura medie și totală

Fixăm suprafața regulată și orientabilă  $S \subset \mathbb{R}^3$  și punctul generic  $P \in S$ . Deci, avem în punctul  $P$  formele fundamentale:  $I(P)$ ,  $II(P)$ . Fie  $0_P$  vectorul nul din spațiul tangent  $T_P S$ .

**Definiția 10.1** Funcția  $k_P : T_P S \setminus \{0_P\} \rightarrow \mathbb{R}$  dată de:

$$k_P(X) = \frac{II(P)(X, X)}{I(P)(X, X)} \quad (10.1)$$

se numește *curbura normală* a lui  $S$  în  $P$ .

Fixăm  $(U, \varphi)$  o parametrizare locală a lui  $S$  în jurul lui  $P$ ; deci  $P = \varphi(\bar{u})$  cu  $\bar{u} = (u, v) = (u^1, u^2) = (u^i)_{i=1,2}$ . Dacă  $X = X^1\varphi_1 + X^2\varphi_2$  atunci:

$$k_P(X) = \frac{b_{ij}(\bar{u})X^iX^j}{g_{ij}(\bar{u})X^iX^j} = \frac{b_{11}(\bar{u})(X^1)^2 + 2b_{12}(\bar{u})X^1X^2 + b_{22}(\bar{u})(X^2)^2}{g_{11}(\bar{u})(X^1)^2 + 2g_{12}(\bar{u})X^1X^2 + g_{22}(\bar{u})(X^2)^2}. \quad (10.2)$$

Din această relație rezultă o proprietate importantă a curburii normale și anume invarianța la scalări  $X \rightarrow \lambda X$  cu  $\lambda$  număr real nenul:

$$k_P(\lambda X) = k_P(X). \quad (10.3)$$

Prin urmare, putem considera  $k_P$  ca fiind de fapt funcția  $k_P : S(T_P S) \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$k_P(X) = II(P)(X, X) \quad (10.4)$$

unde  $S(T_P S)$  este sfera unitate din spațiul vectorial euclidian  $(T_P S, I(P))$  i.e.  $S(T_P S) = \{X \in T_P S; I(P)(X, X) = 1\}$ . Rezultă că  $S(T_P S)$  este o mulțime mărginită și închisă în  $T_P S \simeq \mathbb{R}^2$ ; deci  $S(T_P S)$  este o mulțime compactă! Reamintim un rezultat de Topologie: o funcție continuă pe un compact este mărginită și își atinge marginile! În concluzie, există  $k_1 = \text{minimumul funcției continue } k_P$  și  $k_2 = \text{maximumul lui } k_P$ .

**Definiția 10.2** Numerele reale  $k_1, k_2$  se numesc *curburile principale* ale lui  $S$  în  $P$ .

Un mod de caracterizare a curburilor principale este următorul: am demonstrat în Cursul precedent că operatorul shape  $A_P = -dN_P$  este autoadjunct relativ la produsul scalar  $I(P)$ . Un rezultat foarte important al Algebrei Liniare spune că un operator liniar autoadjunct

$A : (\mathbb{R}^n, g) \rightarrow (\mathbb{R}^n, g)$  determină o bază  $g$ -ortonormată  $\{e_1, \dots, e_n\}$  în  $(\mathbb{R}^n, g)$  formată din vectori proprii:  $A(e_i) = \lambda_i e_i$ ,  $i = 1, \dots$ , cu  $(\lambda_i)$  valori proprii reale pentru  $A$ .

Prin urmare,  $A_P$  admite vectorii proprii  $e_1, e_2 \in S(T_P S)$  cu  $I(P)(e_i, e_j) = \delta_{ij}$  și corespunzător, valorile proprii  $\lambda_1, \lambda_2$ :  $A_P(e_i) = \lambda_i e_i$ . Presupunem  $\lambda_1 \leq \lambda_2$ .

Cum  $\{e_1, e_2\}$  este o bază în  $T_P S$  rezultă că orice  $X \in S(T_P S)$  se descompune în mod unic:

$$X = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2 \quad (10.5)$$

unde  $\theta$  este unghiul orientat dintre  $X$  și  $e_1$ . Rezultă:

$$k_P(X) = II(P)(X, X) = I(P)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2, A_P(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2))$$

și deci:

$$k_P(X) = \langle \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2, \cos \theta \lambda_1 e_1 + \sin \theta \lambda_2 e_2 \rangle = \lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta. \quad (10.6)$$

**Propoziția 10.3** Funcția  $f : [0, \pi]$ ,  $f(\theta) = \lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta$  admite pe  $\lambda_1$  ca minim și  $\lambda_2$  ca maxim.

**Demonstrație** Avem:  $f'(\theta) = -\lambda_1 2 \cos \theta \sin \theta + \lambda_2 2 \sin \theta \cos \theta = (\lambda_2 - \lambda_1) \sin 2\theta$  și ecuația  $f'(\theta) = 0$  admite soluțiile  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ . Rezultă că:

i) minimul lui  $f$  corespunde lui  $\theta_1$  și  $f(0) = \lambda_1$ ,

ii) maximul lui  $f$  corespunde lui  $\theta_2$  și  $f(\frac{\pi}{2}) = \lambda_2$ . Avem deci concluzia.  $\square$

**Corolarul 10.4**  $k_1$  este valoarea proprie minimă a lui  $A_P$  iar  $k_2$  este valoarea proprie maximă a lui  $A_P$ .

Avem deci:  $A_P(e_1) = k_1 e_1$  și  $A_P(e_2) = k_2 e_2$ .

**Definiția 10.5** Vectorii proprii ai lui  $A_P$ ,  $e_1, e_2 \in S(T_P S)$  se numesc *direcțiile principale* ale lui  $S$  în  $P$ .

Curburile principale permit o clasificare a punctelor unei suprafețe:

**Definiția 10.6** Punctul  $P \in S$  se numește:

- 1) *umbilical* dacă  $k_1 = k_2 \neq 0$  și *planar* dacă  $k_1 = k_2 = 0$ ,
- 2) *eliptic* dacă  $k_1 \cdot k_2 > 0$ , *hiperbolic* dacă  $k_1 \cdot k_2 < 0$  și *parabolic* dacă  $k_1 \cdot k_2 = 0$  dar una din curburile principale este nenulă.

Noțiunile introduse în definiția următoare sunt fundamentale în teoria suprafețelor:

**Definiția 10.7** Numim:

- 1) *curbura medie* funcția pe  $S$ :

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2} \quad (10.7)$$

Suprafața  $S$  o numim *minimală* dacă are  $H \equiv 0$ .

- 2) *curbura totală* sau *Gauss* funcția pe  $S$ :

$$K = k_1 \cdot k_2. \quad (10.8)$$

Suprafața  $S$  o numim *plată* dacă are  $K \equiv 0$ .

Pentru determinarea acestor curburii reamintim, conform Corolarului 10.4, că  $k_1, k_2$  sunt exact valorile proprii ale operatorului shape  $A_P$ . Prin urmare, ele sunt soluțiile ecuației caracteristice:

$$\det(II(P) - \lambda I(P)) = 0. \quad (10.9)$$

Avem deci:

$$\begin{vmatrix} L - \lambda E & M - \lambda F \\ M - \lambda F & N - \lambda G \end{vmatrix} = 0$$

sau, prin dezvoltare:

$$(L - \lambda E)(N - \lambda G) - (M - \lambda F)^2 = 0.$$

Un calcul imediat dă ecuația finală a curburilor principale:

$$(EG - F^2)\lambda^2 - (LG - MF + NE)\lambda + (LN - M^2) = 0 \quad (10.10)$$

iar formulele Viete dau concluzia:

$$H(P) = \frac{LG - MF + NE}{2(EG - F^2)}(P), \quad K(P) = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{\det II(P)}{\det I(P)}. \quad (10.11)$$

Invers, dacă știm  $H$  și  $K$  atunci curburile principale sunt soluțiile ecuației:

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0. \quad (10.12)$$

Această ecuație având soluțiile reale va avea discriminantul pozitiv și deci:

$$H^2 - K \geq 0 \quad (10.13)$$

iar soluțiile sunt:

$$k_{1,2} = H \mp \sqrt{H^2 - K}. \quad (10.14)$$

De asemeni, deoarece expresia operatorului shape în raport cu baza  $\{e_1, e_2\}$  este:

$$A_P = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \quad (10.15)$$

obținem:

$$H(P) = \frac{1}{2} \text{Tr} A_P, \quad K(P) = \det A_P. \quad (10.16)$$

O caracterizare a tipurilor de puncte este:

**Propoziția 10.8** *Punctul  $P \in S$  este:*

- 1) *eliptic* dacă și numai dacă  $K(P) > 0$  și *parabolic* dacă și numai dacă  $K(P) = 0$ ,
- 2) *hiperbolic* dacă și numai dacă  $K(P) < 0$ ,
- 3) *umbilical* dacă și numai dacă  $\frac{b_{11}(P)}{g_{11}(P)} = \frac{b_{12}(P)}{g_{12}(P)} = \frac{b_{22}(P)}{g_{22}(P)} = k_1 (= k_2)$ .

**Demonstrație** Echivalențele 1)-2) sunt evidente din definiția lui  $K$ . Să arătăm 3). Avem în general:  $k_1 \leq k_P(X) \leq k_2$  pentru orice  $X \in T_P S \setminus \{0_P\}$ . Deci într-un punct umbilical funcția curbura normală este constant egală cu  $k_1$ . Pentru  $X = \bar{r}_u$  obținem:  $b_{11}(P) = k_1 g_{11}(P)$  iar pentru  $X = \bar{r}_v$  obținem  $b_{22}(P) = k_1 g_{22}(P)$ . Revenind apoi la  $k_P(X) \equiv k_1$  rezultă  $b_{12}(P)X^1 X^2 = k_1 g_{12}(P)X^1 X^2$  pentru orice pereche  $(X^1, X^2)$  de unde obținem concluzia.  $\square$

Se cer curburile suprafețelor următoare:

**S10.1** de la S9.1.

**Rezolvare**  $K = \frac{-1}{(u^2+2)^2}$  deci toate punctele sunt hiperbolice.

**S10.2** de la S9.2.

**Rezolvare**  $K = H = 0$ . Toate punctele sunt planare și parabolice.

**S10.3** de la S9.3.

**Rezolvare**  $H = 0$ ,  $K = \frac{-4}{9(u^2+v^2+1)^2}$ . Toate punctele sunt hiperbolice. Suprafața Enneper este minimală. Ecuația (10.10) a curburilor principale devine:  $[2 - 3\lambda(1 + u^2 + v^2)][2 + 3\lambda(1 + u^2 + v^2)] = 0$  deci avem curburile principale:  $k_{1,2} = \frac{\pm 2}{3(1+u^2+v^2)}$ .

**S10.4** de la S9.4.

**Rezolvare**  $H = 0$ ,  $K = \frac{-h^2}{(u^2+h^2)^2}$ . Toate punctele sunt hiperbolice. Elicoidul este o suprafață minimală. În fapt, pentru elicoid ecuația (10.10) a curburilor principale este:  $(u^2 + h^2)\lambda^2 - \frac{h^2}{u^2+h^2} = 0$  și deci avem curburile principale:  $k_{1,2} = \frac{\pm h}{u^2+h^2}$ .

**S10.5** de la S9.5.

**Rezolvare**  $H = \frac{(1+p^2)t-2pqs+(1+q^2)r}{2(1+p^2+q^2)^{\frac{3}{2}}}$ ,  $K = \frac{rt-s^2}{(1+p^2+q^2)^2}$

**S10.6** de la S9.6.

**Rezolvare**  $H = \frac{-2xy}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ ,  $K = \frac{-1}{(1+x^2+y^2)^2}$ . Toate punctele sunt hiperbolice.

**S10.7** de la S9.7.

**Rezolvare**  $H = \frac{\psi'((\varphi')^2+(\psi')^2)+\varphi(\varphi'\psi''-\varphi''\psi')}{2\varphi((\varphi')^2+(\psi')^2)^{\frac{3}{2}}}$ ,  $K = \frac{\psi'(\varphi'\psi''-\varphi''\psi')}{\varphi((\varphi')^2+(\psi')^2)^2}$ .

**S10.8** de la S9.8.

**Rezolvare**  $H = \frac{1}{2}$ ,  $K = 0$ . Toate punctele sunt parabolice. Cilindrul circular drept este o suprafață plată. Ecuația (10.10) a curburilor principale devine:  $\lambda(1 - \lambda) = 0$  deci avem curburile principale:  $k_1 = 0$ ,  $k_2 = 1$ .

**S10.9** de la S9.9.

**Rezolvare**  $H = \frac{\psi'}{2\varphi} + \frac{\varphi'\psi''-\varphi''\psi'}{2}$ ,  $K = \frac{\psi'(\varphi'\psi''-\varphi''\psi')}{\varphi}$ .

**S10.10** de la S9.10.

**Rezolvare**  $H = \frac{1}{R}$ ,  $K = \frac{1}{R^2}$ . Toate punctele sunt eliptice. Sfera are curbura medie constantă și curbura totală constantă pozitivă! Ecuația (10.10) devine  $(1 - \lambda R)^2 = 0$  deci avem curburile principale:  $k_1 = k_2 = \frac{1}{R}$  și toate punctele sunt ombilicale!

**S10.11** de la S9.11.

**Rezolvare**  $H = \frac{ctg2u}{R}$ ,  $K = -\frac{1}{R^2}$ . Toate punctele sunt hiperbolice. Pseudosfera are curbura constantă negativă!

**S10.12** de la S9.12.

**Rezolvare**  $H = \frac{R+2r \cos u}{2r(R+r \cos u)}$ ,  $K = \frac{\cos u}{r(R+r \cos u)}$ .



**S10.13** de la S9.13.

**Rezolvare**  $H = \frac{R}{2u\sqrt{1+R^2}}$ ,  $K = 0$ . Deci conul circular este suprafață plată.

**S10.14** de la S9.14.

**Rezolvare**  $H = 0$ ,  $K = -\frac{1}{R^2 \cosh^4 u}$ . Deci catenoidul este suprafață minimală și are curbura negativă dar neconstantă. În fapt, există doar două suprafețe minimale de rotație: planul și catenoidul!

Putem determina curburile principale din ecuația (10.10) care devine:

$$(R - \lambda R^2 \cosh^2 u)(R + \lambda R^2 \cosh^2 u) = 0. \text{ Deci: } k_{1,2} = \frac{\pm 1}{R \cosh^2 u}.$$

**S10.15** banda lui Möbius  $S : \bar{r}(u, v) = (\cos u(1 + v \sin \frac{u}{2}), \sin u(1 + v \sin \frac{u}{2}), v \cos \frac{u}{2})$ .

**Rezolvare**  $E = (1 + v \sin \frac{u}{2})^2 + \frac{v^2}{4}$ ,  $F = 0$ ,  $G = 1$ .



## Cursul 11

# Derivata covariantă pe o suprafață. Simbolii Christoffel

Fixăm suprafața regulată, orientabilă și scufundată  $S : \bar{r} = \bar{\varphi}(u, v), (u, v) \in U \subseteq \mathbb{R}^2$  și punctul generic  $P(u_0, v_0) \in S$ . Fie funcția  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  gândită ca  $f(P) = f(u, v)$  deci ca  $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Asemănător Definiției 8.5 introducem:

**Definiția 11.1**  $f$  se numește *netedă* dacă este infinit derivabilă parțial în raport cu variabilele  $u$  și  $v$ . Fie  $C^\infty(S)$  mulțimea acestor funcții netede numite de către fizicieni *câmpuri scalare*.

**Observația 11.2**  $C^\infty(S)$  este inel comutativ relativ la operațiile de adunare și înmulțire.

Fixăm acum  $X \in T_P S$  și două curbe pe  $S$ , reprezentanți pentru  $X$  ca în Cursul 5,  $c^i(t) = (u^i(t), v^i(t)), t \in (-\varepsilon, \varepsilon), i = 1, 2$ . Deci  $c^i(0) = (u_0, v_0)$  și  $\frac{dc^i}{dt}(0) = (X^1, X^2)$  dacă  $X = X^1 \bar{r}_u(P) + X^2 \bar{r}_v(P)$ . Prin urmare:

$$\frac{du^1}{dt}(0) = \frac{du^2}{dt}(0) = X^1, \quad \frac{dv^1}{dt}(0) = \frac{dv^2}{dt}(0) = X^2. \quad (11.1)$$

Următorul rezultat arată independența derivatei unui câmp scalar  $f$  de-a lungul curbelor ce-l reprezintă pe  $X$ :

**Propoziția 11.3** În condițiile precedente avem:  $(f \circ c^1)'(0) = (f \circ c^2)'(0)$ .

**Demonstrație** Fie  $F_i : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$  funcția netedă (fiind compunere de funcții netede)  $F_i(t) = (f \circ c^i)(t) = f(u^i(t), v^i(t))$ . Avem  $F_i(0) = f(P)$  și prin derivare compusă obținem:

$$F_i'(0) = \frac{\partial f}{\partial u}(P) \frac{du^i}{dt}(0) + \frac{\partial f}{\partial v}(P) \frac{dv^i}{dt}(0).$$

Datorită relațiilor (11.1) avem concluzia:  $F_1'(0) = F_2'(0)$ .  $\square$

Acest rezultat permite introducerea următoarei noțiuni fundamentale:

**Definiția 11.4** Pentru  $f \in C^\infty(S)$  și  $X \in T_P S$  numim *derivata direcțională* a lui  $f$  în  $P \in S$  relativ la direcția  $X$  numărul real:

$$\tilde{\nabla}_X f = (f \circ c)'(0) \quad (11.2)$$

unde  $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  este o curbă pe  $S$  prin  $P$  cu  $c'(0) = X$ .

Proprietățile acestui număr sunt date de:

**Propoziția 11.5** Fie  $X, Y \in T_P S$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  și  $f, f_1, f_2 \in C^\infty(S)$ . Atunci:

- i)  $\tilde{\nabla}_{\lambda X + \mu Y} f = \lambda \tilde{\nabla}_X f + \mu \tilde{\nabla}_Y f$ ,
- ii)  $\tilde{\nabla}_X(\lambda f_1 + \mu f_2) = \lambda \tilde{\nabla}_X f_1 + \mu \tilde{\nabla}_X f_2$ ,
- iii) (*Leibniz*)  $\tilde{\nabla}_X(f_1 f_2) = \tilde{\nabla}_X f_1 \cdot f_2(P) + f_1(P) \cdot \tilde{\nabla}_X f_2$ .

În contrapartidă cu noțiunea de câmp scalar introducem și:

**Definiția 11.6** Numim *câmp vectorial* pe  $S$  o aplicație  $Z : S \rightarrow \mathbb{R}^3$  constituită din 3 câmpuri scalare:  $Z = (Z^1, Z^2, Z^3)$ .

Dacă în particular avem că  $Z(P) \in T_P S$  pentru orice  $P \in S$  reobținem noțiunea de câmp vectorial tangent la  $S$  din Definiția 6.4ii). Extindem derivata direcțională la câmpuri vectoriale:

**Definiția 11.7** Dat  $X \in T_P S$  și câmpul vectorial  $Z$  pe  $S$  numim *derivata direcțională* a lui  $Z$  în  $P$  relativ la direcția  $X$  ansamblul:

$$\tilde{\nabla}_X Z = (\tilde{\nabla}_X Z^1, \tilde{\nabla}_X Z^2, \tilde{\nabla}_X Z^3). \quad (11.3)$$

Proprietățile acestei derivate sunt date de:

**Propoziția 11.8** Fie  $X, Y \in T_P S$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,  $f \in C^\infty(S)$  și câmpurile vectoriale  $Z, W$ . Avem:

- i)  $\tilde{\nabla}_{\lambda X + \mu Y} Z = \lambda \tilde{\nabla}_X Z + \mu \tilde{\nabla}_Y Z$ ,
- ii)  $\tilde{\nabla}_X(\lambda Z + \mu W) = \lambda \tilde{\nabla}_X Z + \mu \tilde{\nabla}_X W$ ,
- iii) (*Leibniz*)  $\tilde{\nabla}_X(fZ) = \tilde{\nabla}_X f \cdot Z(P) + f(P) \cdot \tilde{\nabla}_X Z$ ,
- iv) (*compatibilitatea cu metrica euclidiană*)

$$\tilde{\nabla}_X(\langle Z, W \rangle)(P) = \langle \tilde{\nabla}_X Z, W(P) \rangle + \langle Z(P), \tilde{\nabla}_X W \rangle. \quad (11.4)$$

Ultimul tip de derivare după o direcție se aplică câmpurilor vectoriale tangente la  $S$  adică elementelor din  $\mathcal{X}(S)$ . Să observăm că avem descompunerea în sumă directă:

$$T_P \mathbb{R}^3 = T_P S \oplus N_P \quad (11.5)$$

termenii sumei fiind chiar ortogonali relativ la produsul scalar euclidian. Relativ la această descompunere introducem proiectorii (ortogonali):

$$\pi_P^T : T_P \mathbb{R}^3 \rightarrow T_P S, \quad \pi_P^N : T_P \mathbb{R}^3 \rightarrow N_P \quad (11.6)$$

și obținem următorul concept fundamental:

**Definiția 11.9** Dat  $X \in T_P S$  și  $Z \in \mathcal{X}(S)$  descompunerea ortogonală:

$$\tilde{\nabla}_X Z = \nabla_X^P Z + B^P(X, Z) = \pi_P^T(\tilde{\nabla}_X Z) + \pi_P^N(\tilde{\nabla}_X Z) \quad (11.7)$$

se numește *formula Gauss*. Aplicația  $\nabla^P : T_P S \times \mathcal{X}(S) \rightarrow T_P S$  se numește *derivata covariantă* a lui  $Z$  în  $P$  relativ la direcția  $X$ . Setul de aplicații  $\nabla : \mathcal{X}(S) \times \mathcal{X}(S) \rightarrow \mathcal{X}(S)$  dat de  $\nabla = (\nabla^P)_{P \in S}$  se numește *conexiunea Levi-Civita* a lui  $S$ .

Să observăm că derivata Levi-Civita o gândim astfel:  $(X, Z) \in \mathcal{X}(S) \times \mathcal{X}(S) \rightarrow \nabla_X Z \in \mathcal{X}(S)$  unde  $\nabla_X Z : P \in S \rightarrow \nabla_{X(P)}^P Z \in T_P S!$

În continuare să particularizăm formulele obținute la  $X$  element al bazei Gauss  $\{\varphi_u(P), \varphi_v(P)\}$  a lui  $T_P S$ . Conform discuției din Cursul 6 avem că  $\varphi_u(P)$  este vectorul tangent în  $P$  la curba  $C_{v_0} : u = u(t), v = \text{const} = v_0$  cu  $u(0) = u_0$  și  $u'(0) = 1$ . Prin urmare avem:

$$\tilde{\nabla}_{\varphi_u(P)} f = (f \circ C_{v_0})'(0) = \frac{df}{dt}(u(t), v_0)|_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial u}(P)u'(0) = \frac{\partial f}{\partial u}(P). \quad (11.8)$$

Absolut analog:

$$\tilde{\nabla}_{\varphi_v(P)} f = \frac{\partial f}{\partial v}(P) \quad (11.9)$$

și deci putem remarca următoarele:

i) cu o globalizare de tipul celei considerate la derivata Levi-Civita putem nota:

$$\tilde{\nabla}_{\varphi_u} f = \frac{\partial f}{\partial u}, \quad \tilde{\nabla}_{\varphi_v} f = \frac{\partial f}{\partial v}. \quad (11.10)$$

ii) putem renota formal:

$$\varphi_u = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \varphi_v = \frac{\partial}{\partial v}. \quad (11.11)$$

Pentru derivata direcțională pe câmpuri vectoriale obținem deci:

$$\tilde{\nabla}_{\varphi_i(P)} Z = \left( \frac{\partial Z^1}{\partial u^i}(P), \frac{\partial Z^2}{\partial u^i}(P), \frac{\partial Z^3}{\partial u^i}(P) \right). \quad (11.12)$$

Să observăm că proiectorul normal are expresia foarte simplă:

$$\pi_P^N(Z(P)) = \langle Z(P), \bar{N}(P) \rangle \quad (11.13)$$

și atunci putem calcula ușor  $B^P(\varphi_i(P) = \frac{\partial}{\partial u^i}, Z)$  pentru  $Z = \varphi_j$ :

$$B^P(\varphi_i(P), \varphi_j) = \langle \tilde{\nabla}_{\varphi_i(P)} \varphi_j, \bar{N}(P) \rangle = \langle \frac{\partial \varphi_j}{\partial u^i}(P), \bar{N}(P) \rangle = \langle \varphi_{ij}(P), \bar{N}(P) \rangle$$

și o comparație cu relațiile (9.11) conduce la faptul că  $B^P = II(P)$ . În concluzie, formula Gauss se poate globaliza la:

$$\tilde{\nabla}_X Z = \nabla_X Z + II(X, Z) \quad (11.14)$$

pentru orice pereche  $(X, Z) \in \mathcal{X}(S)$ !

Pentru aceeași pereche  $(X = \varphi_i, Z = \varphi_j)$  formula Gauss devine:

$$\varphi_{ij} = \nabla_{\varphi_i} \varphi_j + b_{ij} \bar{N} \quad (11.15)$$

și descompunerea generică a primului termen din membrul drept este:

$$\nabla_{\varphi_i} \varphi_j = \Gamma^k_{ij} \varphi_k \quad (11.16)$$

cu  $\Gamma^k_{ij}$  funcții netede pe  $S$ .

**Definiția 11.10** Funcțiile  $\Gamma^k_{ij}$  se numesc *simbolii Christoffel* ai lui  $S$ .

Să observăm că derivatele parțiale comută  $\varphi_{ij} = \varphi_{ji}$  și atunci datorită relației (11.16) avem comutarea simbolurilor Christoffel în raport cu indicii inferiori:

$$\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}. \quad (11.17)$$

Pentru a determina expresia acestor funcții vom folosi compatibilitatea cu metrica din Propoziția 11.8:

$$\tilde{\nabla}_{\varphi_i} \langle \varphi_j, \varphi_k \rangle = \langle \tilde{\nabla}_{\varphi_i} \varphi_j, \varphi_k \rangle + \langle \varphi_j, \tilde{\nabla}_{\varphi_i} \varphi_k \rangle$$

care devine:

$$\frac{\partial g_{jk}}{\partial u^i} = \Gamma_{ij}^a g_{ak} + \Gamma_{ki}^a g_{ja}. \quad (11.18_i)$$

(În membrul drept aveam și componente normale dar acestea sunt ortogonale cu  $\bar{r}$ . deci produsele scalare respective sunt nule.) Facem permutarea ciclică a indicilor  $i, j, k$  și operația (11.18<sub>j</sub>) + (11.18<sub>k</sub>) – (11.18<sub>i</sub>) conduce la expresia finală:

$$\frac{\partial g_{ik}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{ji}}{\partial u^k} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial u^i} = 2\Gamma_{jk}^a g_{ai}$$

ceea ce produce cu interschimbarea  $a \leftrightarrow i$ :

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{g^{ia}}{2} \left( \frac{\partial g_{ak}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{ja}}{\partial u^k} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial u^a} \right). \quad (11.19)$$

O formulă ce unifică calculele este:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1 \\ \Gamma_{ij}^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial g_{1j}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{i1}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^1} \\ \frac{\partial g_{2j}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{i2}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^2} \end{pmatrix}. \quad (11.20)$$

Deci:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^1} \\ \frac{\partial g_{12}}{\partial u^1} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{12}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} \\ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial g_{12}}{\partial u^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} \\ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (11.21)$$

**Definiția 11.11** i) *Croșetul Lie* pe suprafața  $S$  este aplicația:  $[\cdot, \cdot] : \mathcal{X}(S)^2 = \mathcal{X}(S) \times \mathcal{X}(S) \rightarrow \mathcal{X}(S)$ :

$$[X, Y] = [X, Y]^i \frac{\partial}{\partial u^i} \quad (11.22)$$

unde:

$$[X, Y]^i = X(Y^i) - Y(X^i) = X^a \frac{\partial Y^i}{\partial u^a} - Y^a \frac{\partial X^i}{\partial u^a}. \quad (11.23)$$

ii) *Tensorul de curbura* al conexiunii Levi-Civita este aplicația  $R : \mathcal{X}(S)^3 \rightarrow \mathcal{X}(S)$ :

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z. \quad (11.24)$$

Se obține imediat că  $R$  este un câmp tensorial de tip  $(1, 3)$  având componentele locale:

$$R \left( \frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j} \right) \frac{\partial}{\partial u^l} = R_{ijl}^k \frac{\partial}{\partial u^k} \quad (11.25)$$

unde:

$$R_{ijl}^k = \frac{\partial \Gamma_{jl}^k}{\partial u^i} - \frac{\partial \Gamma_{il}^k}{\partial u^j} + \Gamma_{jl}^a \Gamma_{ai}^k - \Gamma_{il}^a \Gamma_{aj}^k. \quad (11.26)$$

Se arată (a se vedea Cursul următor) că:

$$K = \frac{1}{EG - F^2} [g_{11}R_{122}^1 + g_{12}R_{122}^2]. \quad (11.27)$$

Această relație foarte importantă determină introducerea *tensorului covariant de curbură*  $\mathcal{R} : \mathcal{X}(S)^4 \rightarrow C^\infty(S)$ :

$$\mathcal{R}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)Z, W) \quad (11.28)$$

având componentele locale:

$$\mathcal{R}_{ijkl} = g \left( R \left( \frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j} \right) \frac{\partial}{\partial u^k}, \frac{\partial}{\partial u^l} \right). \quad (11.29)$$

Cu (11.25) obținem:

$$\mathcal{R}_{ijkl} = R_{ijk}^a g_{al} \quad (11.30)$$

iar formula curburii totale devine:

$$K = \frac{\mathcal{R}_{1221}}{\det g}. \quad (11.31)$$

Relația (11.18<sub>i</sub>) exprimă local faptul că conexiunea Levi-Civita este *metrică* adică derivata covariantă  $\nabla g$  este nulă sau încă  $\nabla_X g = 0$  pentru orice  $X \in \mathcal{X}(S)$  unde:

$$(\nabla_X g)(Y, Z) := X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z). \quad (11.32)$$

## SEMINARUL 11

**S11.1** Fie  $\nabla^g$  conexiunea Levi-Civita a metricii  $g$  și constanta reală  $c > 0$ . Să se arate că:  $\nabla^{cg} = \nabla^g$

**Rezolvare** Rezultă imediat din expresia (11.19) a simbolurilor Christoffel.

**S11.2** Spunem că  $S$  este rapotată la *coordonate polare geodezice* dacă forma I-a fundamentală este  $g(r, \varphi) = dr^2 + G(r, \varphi)d\varphi^2$ . Se cer simbolii Christoffel și curbura Gauss.

**Rezolvare** Singurii nenuli sunt:  $\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial r}$ ,  $\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial r}$ ,  $\Gamma_{22}^2 = \frac{1}{2G} \frac{\partial G}{\partial \varphi}$ . Din (11.27) avem:

$$K = \frac{1}{G} R_{122}^1 = \frac{1}{G} \left[ \frac{\partial \Gamma_{22}^1}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{12}^1}{\partial u^2} + \Gamma_{22}^a \Gamma_{a1}^1 - \Gamma_{12}^a \Gamma_{a2}^1 \right] = \frac{1}{G} \left[ -\frac{1}{2} G_{rr} - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{22}^1 \right] = -\frac{1}{G} \left[ -\frac{1}{2} G_{rr} + \frac{1}{4G} G_r^2 \right]$$

cu expresia finală:

$$K = \frac{1}{4G^2} [G_r^2 - 2GG_{rr}]. \quad (11.33)$$

O concluzie interesantă este aceea că pentru  $K$  nu avem nevoie de derivatele în raport cu  $\varphi$  ale lui  $G$ .

**S11.3** Să se aplice calculul precedent la elicoid.

**Rezolvare** Avem  $G(r = u, \varphi = v) = u^2 + h^2$  și rezultă că singurii nenuli sunt:  $\Gamma_{22}^1 = -u$ ,  $\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{u}{u^2+h^2}$ . Avem:

$$K = \frac{1}{4(u^2 + h^2)^2} [(2u)^2 - 2(u^2 + h^2)2] = \frac{1}{(u^2 + h^2)^2} [u^2 - (u^2 + h^2)] = \frac{-h^2}{(u^2 + h^2)^2}$$

în acord cu exercițiul 10.4.

**S11.4** O parametrizare a lui  $S$  pentru care  $g_{11} = g_{22} = 1$  și  $g_{12} = \cos \varphi$  cu  $\varphi = \varphi(u, v)$  se numește *rețea Cebîșev*. Se cer simbolii Christoffel.

**Rezolvare**  $\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sin \varphi} \begin{pmatrix} \cos \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial u} \\ -\frac{\partial \varphi}{\partial u} \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sin \varphi} \begin{pmatrix} -\frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \cos \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial v} \end{pmatrix}$  și restul nuli.

Din (11.27) avem:

$$K = \frac{1}{\sin^2 \varphi} [R_{122}^1 + \cos \varphi R_{122}^2].$$

unde:

$$R_{122}^1 = \frac{\partial \Gamma_{22}^1}{\partial u} - \frac{\partial \Gamma_{12}^1}{\partial v} + \Gamma_{22}^a \Gamma_{a1}^1 + \Gamma_{22}^a \Gamma_{a1}^1 = -\frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\varphi_v}{\sin \varphi} \right) + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 = -\frac{\varphi_{uv}}{\sin \varphi}$$

$$R_{122}^2 = \frac{\partial \Gamma_{22}^2}{\partial u} - \frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial v} + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^a \Gamma_{a2}^2 = \frac{\cos \varphi \varphi_{uv}}{\sin \varphi}.$$

În concluzie:

$$K = \frac{\varphi_{uv}}{\sin^3 \varphi} [-1 + \cos^2 \varphi] = \frac{-\varphi_{uv}}{\sin \varphi}. \quad (11.34)$$

**S11.5** Se cere curbura Gauss a sferei  $S(O, R)$ .

**Rezolvare** Metrica sferei este:  $g = R^2 du^2 + R^2 \cos^2 u dv^2$  și cu relația (11.27) avem:

$$K = \frac{R^2}{R^4 \cos^2 u} = \frac{R_{122}^1}{R^2 \cos^2 u} = \frac{1}{R^2 \cos^2 u} \left[ \frac{\partial \Gamma_{22}^1}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{12}^1}{\partial u^2} + \Gamma_{22}^a \Gamma_{a1}^1 - \Gamma_{12}^a \Gamma_{a2}^1 \right].$$

Dar singurii simbolii Christoffel nenuli sunt:  $\Gamma_{12}^2 = -\frac{\sin u}{\cos u}$  și  $\Gamma_{22}^1 = \sin u \cos u$  ceea ce dă:

$$K = \frac{1}{R^2 \cos^2 u} \left[ \cos^2 u - \sin^2 u + \frac{\sin u}{\cos u} \sin u \cos u \right] = \frac{1}{R^2}$$

în acord cu exercițiul S10.10!

**S11.6** Se cere curbura Gauss a catenoidului

**Rezolvare** Din S9.14 avem metrica  $g = R^2 \cosh^2 u (du^2 + dv^2)$  și din (11.27) rezultă:

$$K = \frac{R_{122}^1}{R^2 \cosh^2 u} = \frac{1}{R^2 \cosh^2 u} \left[ \frac{\partial \Gamma_{22}^1}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{12}^1}{\partial u^2} + \Gamma_{22}^a \Gamma_{a1}^1 - \Gamma_{12}^a \Gamma_{a2}^1 \right].$$

Singurii simbolii Christoffel nenuli sunt:  $\Gamma_{11}^1 = -\Gamma_{22}^1 = \Gamma_{12}^2 = \frac{\sinh u}{\cosh u}$  și deci:

$$K = \frac{1}{R^2 \cosh^2 u} \left[ -\frac{1}{\cosh^2 u} - \left( \frac{\sinh u}{\cosh u} \right)^2 + \left( \frac{\sinh u}{\cosh u} \right)^2 \right] = -\frac{1}{R^2 \cosh^4 u}$$



analog cu rezultatul de la S10.14.

**Definiția 11.11** Câmpul  $X \in \mathcal{X}(S)$  se numește *covariant constant* dacă  $\nabla X = 0$  i.e.  $\nabla_Y X = 0$  pentru orice  $Y \in \mathcal{X}(S)$ .

**S11.7** Să se arate că norma lui  $X$  i.e.  $f_X = \sqrt{g(X, X)}$  este constantă.

**Rezolvare** E suficient să arătăm că  $f_X^2$  este constantă. Avem din metricitatea (11.28):

$$0 = (\nabla_Y g)(X, X) = Y(f_X^2) - 2g(\nabla_Y X, X) = Y(f_X^2) - 0 = Y(f_X^2).$$

În particular, spunem că  $X$  este *paralel* de-a lungul curbei  $\gamma : I \rightarrow S$  dacă  $\nabla_{\gamma'} X = 0$ . Acest rezultat spune că norma unui câmp paralel este constantă de-a lungul curbei.

**Definiția 11.12** Fie funcția netedă pe o suprafață  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ . *Laplacianul* lui  $f$  este funcția pe  $S$ :

$$\Delta f = g^{ij} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial f}{\partial u^k} \right). \quad (11.35)$$

Ecuția:  $\Delta f = 0$  se numește *ecuația Laplace pe  $S$*  iar o soluție o numim *funcție armonică pe  $S$* .

Prin urmare, ecuația Laplace este:

$$G \left( f_{11} - \Gamma_{11}^k f_k \right) - 2F \left( f_{12} - \Gamma_{12}^k f_k \right) + E \left( f_{22} - \Gamma_{22}^k f_k \right) = 0. \quad (11.36)$$

**Exemplul 11.13** În planul fără origine cu metrica warped dată de coordonatele polare ecuația Laplace pentru o funcție radial simetrică  $f = f(r)$  este:

$$r^2 f_{rr} + r f_r = 0 \quad (11.37)$$

cu soluția generală:  $f_{a,b}(r) = a \ln r + b$ ,  $a$  și  $b$  fiind constante reale.

**Exemplul 11.14** Pe sfera  $S(O, R)$  folosim exercițiul 11.5; ecuația Laplace este:

$$\cos^2 u f_{uu} + f_{vv} - \sin u \cos u f_u = 0. \quad (11.38)$$

Să căutăm soluții  $f = f(u)$ ; avem ecuația  $(\cos u f')' = 0$  și deci:

$$f'(u) = \frac{C}{\cos u} \implies f(u) = C \ln \left( \frac{\sin u + 1}{\cos u} \right) = C \ln \frac{\tan \frac{u}{2} + 1}{\tan \frac{u}{2} - 1}.$$



## Cursul 12

# Teorema Egregium și teorema fundamentală a suprafețelor

Fixăm suprafața regulată, orientabilă, scufundată  $S : \bar{r} = \varphi(u, v), (u, v) \in U \subseteq \mathbb{R}^2$ . Reamintim din Cursul precedent formula Gauss:

$$\varphi_{ij} = \Gamma_{ij}^k \varphi_k + b_{ij} \bar{N}. \quad (12.1)$$

Urmărim stabilirea unei formule asemănătoare pentru gradientul versorului normalei:  $\nabla \bar{N} = (\frac{\partial \bar{N}}{\partial u^1}, \frac{\partial \bar{N}}{\partial u^2}) = (\bar{N}_1, \bar{N}_2)$ :

$$\bar{N}_k = A_k^s \varphi_s + B_k \bar{N} \quad (12.2)$$

coeficienții din această relație urmând a fi determinați. Pentru aflarea celui de al doilea coeficient înmulțim scalar (12.2) cu  $\bar{N}$  și avem:

$$B_k = \langle \bar{N}_k, \bar{N} \rangle$$

și deci:

$$2B_k = \langle \bar{N}_k, \bar{N} \rangle + \langle \bar{N}, \bar{N}_k \rangle = \frac{\partial}{\partial u^k} (\langle \bar{N}, \bar{N} \rangle) = \frac{\partial 1}{\partial u^k} = 0.$$

Vedem astfel o motivație pentru alegerea normalei ca versor. Pentru aflarea primului coeficient înmulțim scalar cu  $\bar{r}_t$ :

$$\langle \bar{N}_k, \varphi_t \rangle = A_k^s \langle \varphi_s, \varphi_t \rangle = A_k^s g_{st}.$$

Comparând cu relația (9.4) rezultă:

$$-b_{kt} = A_k^s g_{st}$$

și în mulțim acum cu  $g^{tj}$ :

$$-g^{tj} b_{tk} = A_k^s g_{st} g^{tj} = A_k^s \delta_s^j = A_k^j.$$

În concluzie, relația (12.2) devine *formula Weingarten*:

$$\bar{N}_k = (-g^{jt} b_{tk}) \varphi_j. \quad (12.3)$$

Perechea de relații  $(FG) = (12.1)$ ,  $(FW) = (12.3)$  constituie *formulele fundamentale* ale teoriei suprafețelor.

**Teorema 12.1** *Ecuatiile fundamentale ale teoriei suprafețelor sunt:*

I) (EG) *ecuația Gauss*

$$\det II = g_{1j} \left[ \frac{\partial \Gamma_{22}^j}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{21}^j}{\partial u^2} + (\Gamma_{22}^k \Gamma_{k1}^j - \Gamma_{21}^k \Gamma_{k2}^j) \right]. \quad (12.4)$$

II) (EC) *ecuațiile Codazzi*

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} + (\Gamma_{12}^k b_{k1} - \Gamma_{11}^k b_{k2}) = 0 \\ \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} + (\Gamma_{22}^k b_{k1} - \Gamma_{21}^k b_{k2}) = 0. \end{cases} \quad (12.5)$$

**Demonstrație** Derivăm formula Gauss în raport cu  $u^k$ :

$$\varphi_{ijk} = \frac{\partial \Gamma_{ij}^1}{\partial u^k} \varphi_1 + \Gamma_{ij}^1 \varphi_{1k} + \frac{\partial \Gamma_{ij}^2}{\partial u^k} \varphi_2 + \Gamma_{ij}^2 \varphi_{2k} + \frac{\partial b_{ij}}{\partial u^k} \bar{N} + b_{ij} \bar{N}_k$$

și folosim din nou (FG) + (FW):

$$\begin{aligned} \varphi_{ijk} = \frac{\partial \Gamma_{ij}^1}{\partial u^k} \varphi_1 + \frac{\partial \Gamma_{ij}^2}{\partial u^k} \varphi_2 + \frac{\partial b_{ij}}{\partial u^k} \bar{N} + \Gamma_{ij}^1 (\Gamma_{1k}^1 \varphi_1 + \Gamma_{1k}^2 \varphi_2 + b_{1k} \bar{N}) + \Gamma_{ij}^2 (\Gamma_{2k}^1 \varphi_1 + \Gamma_{2k}^2 \varphi_2 + b_{2k} \bar{N}) + \\ + b_{ij} (-g^{1s} b_{sk} \varphi_1 - g^{2s} b_{sk} \varphi_2). \end{aligned}$$

Regrupăm după vectorii reperului Gauss:

$$\begin{aligned} \varphi_{ijk} = \left( \frac{\partial \Gamma_{ij}^1}{\partial u^k} + \Gamma_{ij}^1 \Gamma_{1k}^1 + \Gamma_{ij}^2 \Gamma_{2k}^1 - b_{ij} g^{1s} b_{sk} \right) \varphi_1 + \left( \frac{\partial \Gamma_{ij}^2}{\partial u^k} + \Gamma_{ij}^1 \Gamma_{1k}^2 + \Gamma_{ij}^2 \Gamma_{2k}^2 - b_{ij} g^{2s} b_{sk} \right) \varphi_2 + \\ + \left( \frac{\partial b_{ij}}{\partial u^k} + \Gamma_{ij}^1 b_{1k} + \Gamma_{ij}^2 b_{2k} \right) \bar{N}. \end{aligned} \quad (12.6)$$

Schimbăm  $j \leftrightarrow k$ :

$$\begin{aligned} \varphi_{ikj} = \left( \frac{\partial \Gamma_{ik}^1}{\partial u^j} + \Gamma_{ik}^1 \Gamma_{1j}^1 + \Gamma_{ik}^2 \Gamma_{2j}^1 - b_{ik} g^{1s} b_{sj} \right) \varphi_1 + \left( \frac{\partial \Gamma_{ik}^2}{\partial u^j} + \Gamma_{ik}^1 \Gamma_{1j}^2 + \Gamma_{ik}^2 \Gamma_{2j}^2 - b_{ik} g^{2s} b_{sj} \right) \varphi_2 + \\ + \left( \frac{\partial b_{ik}}{\partial u^j} + \Gamma_{ik}^1 b_{1j} + \Gamma_{ik}^2 b_{2j} \right) \bar{N}. \end{aligned} \quad (12.7)$$

Egalitatea  $\varphi_{ijk} = \varphi_{ikj}$  citită pe cele trei componente ale relațiilor (12.6), (12.7) conduc la cele trei ecuații cerute.  $\square$

Consecința cea mai importantă a rezultatului precedent este așa-numita Teoremă de Aur a lui Gauss care, în esență, este unul din cele mai uimitoare și remarcabile rezultate din Matematică. Astfel, deși ingredientele noțiunii de curbura totală nu au caracter intrinsec, rezultatul lor este intrinsec:

**Teorema Egregium (Gauss) 12.3** *Curbura totală este un invariant intrinsec al lui S.*

**Demonstrație** Cum  $K = \frac{\det II}{\det I}$  este suficient de arătat că  $\det II$  este un invariant intrinsec al lui S. Dar, acest fapt este consecință a ecuației (EG).  $\square$

O afirmație echivalentă cu Teorema Egregium este următoarea:

**Teorema Egregium (variantă) 12.4** Fie  $S_1$  și  $S_2$  două suprafețe regulate, orientabile, scufundate și  $f : S_1 \rightarrow S_2$  o izometrie. Atunci pentru orice  $P \in S_1$  avem  $K_{S_1}(P) = K_{S_2}(f(P))$ .

O observație importantă este aceea că Teorema 12.4 nu admite reciprocă! Există exemple de perechi de suprafețe  $(S_1, S_2)$  și o funcție netedă  $f : S_1 \rightarrow S_2$  astfel încât  $K_1(P) = K_2(f(P))$  pentru orice  $P \in S_1$  dar  $f$  nu este izometrie.

Finalizăm Cursul cu o altă metodă de calcul a curburii toale ce va revela din nou caracterul intrinsec al acestui invariant. Vom scrie forma a I-a fundamentală sub forma:

$$g = I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2 \quad (12.8)$$

unde  $\omega^1, \omega^2$  sunt două 1-forme diferențiale *ortonormate*; se arată că acest lucru este posibil întotdeauna dar vom exemplifica în continuare acest fapt pe suprafețe concrete. Mai în detaliu, dacă  $F = 0$  atunci luăm:

$$\omega^1 = \sqrt{E}du, \quad \omega^2 = \sqrt{G}dv. \quad (12.9)$$

Revenind la cazul general (12.8) se arată că există o matrice antisimetrică de 1-forme:

$$\begin{pmatrix} 0 & \omega_1^2 \\ \omega_2^1 & 0 \end{pmatrix}$$

așa încât prin diferențiere avem:

$$d\omega^i = \omega^j \wedge \omega_j^i \quad (12.10)$$

sau matriceal:

$$d(\omega^1, \omega^2) = (\omega^1, \omega^2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & \omega_1^2 \\ \omega_2^1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (12.11)$$

Aceste relații se numesc *ecuațiile de structură* ale suprafeței. Prin reținerea doar a 1-formei  $\omega_1^2 = -\omega_2^1$  ele devin:

$$\begin{cases} d\omega^1 = -\omega^2 \wedge \omega_1^2 \\ d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_2^1 \end{cases} \quad (12.12)$$

unde  $d$  este operatorul *diferențială exterioară* iar  $\wedge$  este *produsul exterior*. Reamintim că:  $d \circ d = d^2 = 0$  și  $\omega \wedge \omega = 0$ !

Atunci curbura totală este dată de formula:

$$d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2. \quad (12.13)$$

**Exemplul 12.5** (Elicoidul) Reamintim că forma I-a a elicoidului este:

$$g = I = du^2 + (u^2 + h^2)dv^2. \quad (12.14)$$

Rezultă, cu expresiile de mai sus pentru  $\omega_i$ :

$$\omega^1 = du, \quad \omega^2 = \sqrt{u^2 + h^2}dv. \quad (12.15)$$

Ecuțiile de structură devin:

$$\begin{cases} d\omega^1 = d^2u = 0 = -\omega^2 \wedge \omega_1^2 \\ d\omega^2 = d(\sqrt{u^2 + h^2}dv) = \frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}du \wedge dv + \sqrt{u^2 + h^2}d^2v = \frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}du \wedge dv = \omega^1 \wedge \frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}dv = du \wedge \omega_1^2. \end{cases} \quad (12.16)$$

Prin urmare, din a doua ecuație deducem:

$$\omega_1^2 = \frac{u}{\sqrt{u^2 + h^2}}dv. \quad (12.17)$$

Diferențiem această 1-formă:

$$\begin{aligned} d\omega_1^2 &= d\left(\frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}\right) \wedge dv + \frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}d^2v = \frac{\sqrt{u^2+h^2} - \frac{u}{\sqrt{u^2+h^2}}}{u^2+h^2}du \wedge dv = \frac{h^2}{(u^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}du \wedge dv = \\ &= -K\sqrt{u^2+h^2}du \wedge dv \end{aligned}$$

ceea ce dă rezultatul final:

$$K = -\frac{h^2}{(u^2+h^2)^2} \quad (12.18)$$

în acord cu exercițiile S10.4 și S11.3.

## SEMINARUL 12

**S12.1** Să se arate că într-o parametrizare ortogonală a lui  $S$ , i.e.  $F = 0$ , avem:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[ \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)_v + \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right)_u \right] \quad (12.19)$$

unde indicele inferior indică derivarea parțială în raport cu cea variabilă.

**Rezolvare** Metoda I. Teorema Egregium dă următoarea formulă pentru curbura Gauss:

$$2\sqrt{EG - F^2}K = \left(\frac{FE_v - EG_u}{E\sqrt{EG - F^2}}\right)_u + \left(\frac{2EF_u - FE_u - EE_v}{E\sqrt{EG - F^2}}\right)_v \quad (12.20)$$

și din ipoteza  $F = 0$  avem relația cerută.

Metoda II (cu ecuații de structură). Avem:  $\omega^1 = \sqrt{E}du$ ,  $\omega^2 = \sqrt{G}dv$ ; deci ecuațiile de structură devin:

$$\begin{cases} -\frac{E_v}{2\sqrt{E}}du \wedge dv = \sqrt{G}\omega_1^2 \wedge dv \\ \frac{G_u}{2\sqrt{G}}du \wedge dv = \sqrt{E}du \wedge \omega_1^2 \end{cases}$$

ceea ce conduce la:

$$\omega_1^2 = \frac{1}{2} \left[ -\frac{E_v}{\sqrt{EG}}du + \frac{G_u}{\sqrt{EG}}dv \right].$$

Avem atunci:

$$d\omega_1^2 = -K\sqrt{EG}du \wedge dv = \frac{1}{2} \left[ \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)_v + \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right)_u \right] du \wedge dv$$

ceea ce dă formula cerută.

Alte formule pentru curbura Gauss:

1) dacă  $g = g_{11}(du^2 + dv^2)$  atunci:  $K = -\frac{\Delta(\ln g_{11})}{2g_{11}}$ ; coordonatele  $(u, v)$  se numesc *isotermale*=izotermice, în engleză *isothermal coordinates*,

2) dacă  $g = 2g_{12}dudv$  atunci:  $K = -\frac{1}{g_{12}}\frac{\partial^2 \ln g_{12}}{\partial u \partial v}$ .

**S12.2** Să se calculeze curbura Gauss dacă  $S$  este raportată la coordonate polare geodezice și să se integreze cazul  $K = -1$ .

**Rezolvare** Aplicăm exercițiul precedent și avem:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{G_r}{\sqrt{G}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{G}}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{G_r}{2\sqrt{G}}\right).$$

Dar ultima paranteză este exact  $\frac{\partial}{\partial r}\sqrt{G}$  și în concluzie:

$$K = -\frac{\partial_r^2 \sqrt{G}}{\sqrt{G}}. \quad (12.20)$$

Pentru a integra cazul  $K = -1$  căutăm  $\sqrt{G}(r, \varphi)$  de forma  $x(r)$  și avem ecuația diferențială ordinară:  $x'' = x$ . Datele inițiale (Cauchy) pentru această ecuație sunt:  $x(0) = 0$  și  $x'(0) = 1$ . Soluția unică este:  $x(r) = shr$  și deci:  $G(r, \varphi) = sh^2r$ .

**S12.3** Se cere curbura Gauss a unei suprafețe cu rețea Cebîșev.

**Rezolvare** Din relația (12.18) avem:

$$\sqrt{1 - F^2}K = \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{F_u}{\sqrt{1 - F^2}}\right) = \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{-\sin \varphi \cdot \varphi_u}{\sin \varphi}\right)$$

ceea ce dă exact relația (11.29):

$$K = -\frac{1}{\sin \varphi}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v}.$$

**S12.4** Se cere curbura Gauss a suprafeței de rotație  $S : x^2 + y^2 = f^2(z)$  și să se integreze cazul  $K = -1$ . Caz particular:  $S(O, R)$  cu  $f(u) = \sqrt{R^2 - u^2}$

**Rezolvare** Parametrizăm  $S$  astfel  $S : \varphi(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, u)$ . Avem:  $\varphi_u = (f' \cos v, f' \sin v, 1)$  și  $\varphi_v = (-f(u) \sin v, f(u) \cos v, 0)$  de unde rezultă:  $g = (1 + (f'(u))^2)du^2 + f^2(u)dv^2$ . Aplicând formula (12.18) obținem:

$$K = -\frac{f''(u)}{f(u)[1 + (f'(u))^2]^2}.$$

Prin urmare cazul  $K = -1$  conduce la ecuația diferențială:  $f'' = f(u)[1 + (f'(u))^2]^2$ .

Pentru sfera  $S(O, R)$  reobținem rezultatul cunoscut  $K = \frac{1}{R^2}$ .

Singurii simbolii Christoffel nenuli sunt:

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{f'f''}{1 + (f')^2}, \quad \Gamma_{12}^2 = \frac{f'}{f}, \quad \Gamma_{22}^1 = \frac{-ff'}{1 + (f')^2}.$$

**S12.5** Se cere curbura Gauss a suprafeței de rotație  $S : z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  și să se analizeze cazurile  $K = -1$  și  $K = 0$ .

**Rezolvare** Parametrizăm  $S$  astfel  $S : \varphi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, f(u))$  și deci:  $\varphi_u = (\cos v, \sin v, f'(u))$ ,  $\varphi_v = (-u \sin v, u \cos v, 0)$ . Rezultă:  $g = [1 + (f'(u))^2]du^2 + u^2dv^2$  și aplicând formula (12.17) avem:

$$K = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \frac{d}{du} \left( \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \right).$$

Cu notația  $\varphi(u) = \frac{1}{1+(f'(u))^2}$  avem:  $K = -\frac{\varphi'(u)}{2u}$ . Pentru  $K = -1$  putem integra  $\varphi(u) = u^2 + c$  de unde rezultă:  $f(u) = \int \sqrt{\frac{1}{u^2+c} - 1} du$ . Pentru  $c = 0$  găsim:

$$f(u) = \sqrt{1-u^2} - \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{1-u^2}) + \frac{1}{2} \ln(1 - \sqrt{1-u^2})$$

deci  $u \in (-1, 1)$ . Pentru  $K = 0$  avem  $\varphi = c = \text{constant}$ , deci  $f' = C_1 = \text{constant}$  de unde rezultă  $f(u) = C_1 u + C_2$ .

**S12.6** Fie  $S$  un deschis din planul euclidian  $\mathbb{R}^2$  cu forma I-a fundamentală *conformă* cu metrica euclidiană:  $g_{ij} = E\delta_{ij} = e^{2v}\delta_{ij}$ . Presupunem că  $E = E(r)$  i.e.  $v = v(r)$ ; spunem că  $g$  este *rotational simetrică*. Se cere curbura Gauss și să se analizeze cazul  $K = -1$ . Exemplu:  $E = \frac{4}{(1-r^2)^2}$ .

**Rezolvare** Cu relația (12.17) obținem:

$$K = -\frac{1}{2E^2} \left( E''(r) + \frac{1}{r} E'(r) \right)^2 = -\left( v''(r) + \frac{1}{r} v'(r) \right) e^{-2v}.$$

Cazul  $K = -1$  conduce la ecuația diferențială:  $v''(r) + \frac{1}{r} v'(r) = e^{2v(r)}$  iar pentru exemplu obținem:  $K = -32 \frac{(1+2r^2)^2}{(1-r^2)^4}$ .

**S12.7** Pentru suprafața Monge  $S : z = f(x, y)$  și punctul fixat  $P(x, y, f(x, y)) \in S$  să se arate că:

$$K(P) = (1 + \|\nabla f(x, y)\|^2)^{-2} \det \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^k} \right) (x, y).$$

**Rezolvare** Temă.

**S12.8** Se cere curbura sferei  $S(O, R)$  cu ecuații de structură.

**Rezolvare** Din  $g = R^2 du^2 + R^2 \cos^2 u dv^2$  rezultă:  $\omega^1 = R du$ ,  $\omega^2 = R \cos u dv$ . Ecuațiile de structură:

$$d\omega^1 = 0 = -\omega^2 \wedge \omega_1^2, \quad d\omega^2 = -R \sin u du \wedge dv = R du \wedge \omega_1^2$$

dau:  $\omega_1^2 = -\sin u du$ . Rezultă:

$$d\omega_1^2 = -\cos u du \wedge dv = -R^2 \cos u K du \wedge dv$$

cu rezultatul cunoscut:  $K = \frac{1}{R^2}$ .

**S12.9** Se cere curbura pseudosferei cu ecuații de structură.



**Rezolvare** Din exercițiul S9.11 avem metrica  $g = R^2 ctg^2 u du^2 + R^2 \sin^2 u dv^2$  și deci:  $\omega^1 = R ctg u du$ ,  $\omega^2 = R \sin u dv$ . A doua ecuație de structură dă:

$$d\omega^2 = R ctg u du \wedge dv = R \cos u du \wedge dv$$

adică:  $\omega_1^2 = \sin u du$ . Rezultă:

$$d\omega_1^2 = \cos u du \wedge dv = -R^2 \cos u K du \wedge dv$$

ceea ce dă rezultatul cunoscut:  $K = -\frac{1}{R^2}$ .

**S12.10** Se cere curbura metricii *warped*  $g = du^2 + f^2(u)dv^2$  cu ecuații de structură.

**Rezolvare** Din  $\omega^1 = du$ ,  $\omega^2 = f(u)dv$  rezultă a doua ecuație de structură:

$$d\omega^2 = f'(u)du \wedge dv = du \wedge \omega_1^2$$

ceea ce dă:  $\omega_1^2 = f'(u)dv$ . Prin urmare:

$$d\omega_1^2 = f'' du \wedge dv = -K f du \wedge dv$$

ceea ce implică:

$$K = -\frac{f''(u)}{f(u)}. \quad (12.21)$$

Pentru  $f = \sqrt{G}$  reobținem (12.20) adică metricile în coordonate polare geodezice. Pentru  $K = 1$  obținem ecuația diferențială  $f'' + f = 0$  cu soluția generală  $f_{A,B}(u) = A \cos u + B \sin u = A \cos(u + u_0)$ . Alegând  $A = 1$  și  $u_0 = 0$  reobținem metrica sferei  $S^2$ .

**S12.11** Se cere curbura metricii Poincaré  $g = \frac{1}{v^2} [du^2 + dv^2]$ ; a se vedea Exemplul 14.9.

**Rezolvare** Din  $\omega^1 = \frac{du}{v}$ ,  $\omega^2 = \frac{dv}{v}$  rezultă prima ecuație de structură:

$$d\omega^1 = -\frac{1}{v^2} dv \wedge du = -\frac{1}{v^2} dv \wedge \omega_1^2$$

ceea ce dă:  $\omega_1^2 = \frac{du}{v} = \omega^1$ . Prin urmare:

$$d\omega_1^2 = \frac{1}{v^2} du \wedge dv = -K \frac{1}{v^2} du \wedge dv$$

ceea ce dă:  $K = -1$  constant negativă!



## Cursul 13

# Curbe pe o suprafață: reperul Darboux

Fixăm suprafața regulată, orientabilă, scufundată  $S : \bar{r} = \bar{r}(u, v), (u, v) \in U \subseteq \mathbb{R}^2$ . De asemenea, fixăm o curbă  $C$  pe  $S$  dată de  $C : u^i = u^i(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ . Deci:

$$C : \bar{r}_C(t) = \bar{r}(u^i(t)), t \in I.$$

Pentru simplificarea calculelor vom presupune curba ca fiind parametrizată canonic.

Curba  $C$  fiind în spațiu îi atașăm, conform teoriei Frenet, reperul Frenet  $\{T, N, B\}$  și invarianții  $k, \tau$ . Dar, fiind pe  $S$  putem asocia lui  $C$  un nou reper care să facă legătura dintre  $C$  și  $S$ .

**Definiția 13.1** Numim *reperul Darboux* al perechii  $(C, S)$  reperul  $RD(\bar{r}_C(s)) = \{\bar{r}_C(s) : T(s), N_g(s), \bar{N}(s)\}$  unde versorul  $N_g$  se numește *normala tangențială* la curba  $C$  și este astfel ales încât reperul să fie pozitiv orientat.

Avem deci:

$$N_g(s) = \bar{N}(s) \times T(s). \quad (13.1)$$

Pentru a obține ecuațiile de mișcare ale reperului Darboux considerăm  $\theta(s)$  unghiul orientat dintre  $N(s)$  și  $\bar{N}(s)$ . Să observăm că versorii  $\bar{N}(s), N(s), B(s)$  sunt în același plan, normal la  $T(s)$ , iar ultimii doi sunt ortogonali. Rezultă atunci relația (în care renunțăm la argumentul  $s$  pentru simplificarea scrierii):

$$\bar{N} = \cos \theta N + \sin \theta B \quad (13.2)$$

și combinând aceste două relații avem:

$$N_g = \sin \theta N - \cos \theta B. \quad (13.3)$$

Relațiile (13.2 – 3) exprimă deci reperul Darboux în funcție de cel Frenet:

$$\begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta & -\cos \theta \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} \quad (13.4)$$

ceea ce conduce la primul set de ecuații de mișcare:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k \sin \theta & \cos \theta (\tau + \theta') & \sin \theta (\tau + \theta') \\ -k \cos \theta & -\sin \theta (\tau + \theta') & \cos \theta (\tau + \theta') \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}. \quad (13.5)$$

Dar, putem inversa relațiile (13.4):

$$\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 0 & -\cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ N \end{pmatrix}. \quad (13.6)$$

Obținem deci:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k \sin \theta & k \cos \theta \\ -k \sin \theta & 0 & \tau + \theta' \\ -k \cos \theta & -(\tau + \theta') & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix} \quad (13.7)$$

numite, bineînțeles, *ecuațiile Darboux* ale perechii  $(C, S)$

Renotăm:

$-k_g = k \sin \theta$  și o numim *curbura geodezică*,

$-k_n = k \cos \theta$ ,

$-\tau_g = \tau + \theta'$  și o numim *torsiunea geodezică*.

**Propoziția 13.2**  $\tilde{k}_n$  este tocmai curbura normală  $k_{P(s)}$  cu  $P(s)$  punctul generic pe curba dată.

**Demonstrație** Din a treia ecuație (13.5) avem:

$$\tilde{k}_n = - \left\langle \frac{d\bar{N}}{ds}, T \right\rangle.$$

Cum  $\langle T, \bar{N} \rangle = 0$  rezultă:

$$\tilde{k}_n = \left\langle \frac{dT}{ds}, \bar{N} \right\rangle = \left\langle \frac{d^2 \bar{r}}{ds^2}, \bar{N} \right\rangle$$

și comparând cu relațiile (9.11) rezultă:

$$\tilde{k}_n = II(P)(T, T) = k_{\bar{r}(s)}$$

deoarece  $T(s)$  este versor. Avem deci concluzia.  $\square$

Cazurile de egalitate pentru inegalitatea precedentă sunt precizate de:

Prin urmare putem scrie ecuațiile Darboux:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k_g & k_n \\ -k_g & 0 & \tau_g \\ -k_n & -\tau_g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N_g \\ \bar{N} \end{pmatrix}.$$

**S13.1 .**

**Rezolvare .**

**S13.2 .**

**Rezolvare .**

**S13.3 .**

**Rezolvare .**

**S13.4 .**

**Rezolvare .**

**S13.5 .**

**Rezolvare .**

**S13.6 .**

**Rezolvare .**

**S13.7 .**

**Rezolvare .**



# Cursul 14

## Geodezice

Fie suprafața  $S : \bar{r} = \bar{r}(u, v) = \bar{r}(u^1, u^2) = \bar{r}(u^i), (u^i) = (u^1, u^2) \in U \subseteq \mathbb{R}^2$ . Deci în orice punct al lui  $S$  avem reperul Gauss  $\{P(\bar{r}) : \bar{r}_1, \bar{r}_2, \bar{N}\}$ . Reamintim formula Gauss:

$$\bar{r}_{ij} = \Gamma_{ij}^k \bar{r}_k + b_{ij} \bar{N} \quad (FG)$$

unde  $b = (b_{ij})$  este forma a doua fundamentală iar  $\Gamma$  sunt simbolii Christoffel:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{ka} \left( \frac{\partial g_{aj}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{ia}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^a} \right).$$

Avem că  $g = (g_{ij})$  este forma întâia fundamentală a lui  $S$  iar  $g^{-1} = (g^{ij})$  este inversa matricii  $g$ .

Fixăm o curbă  $C$  pe  $S$  dată de  $C : u^i = u^i(t), t \in I \subseteq \mathbb{R}$ . Deci:

$$C : \bar{r}_C(t) = \bar{r}(u^i(t)), t \in I. \quad (14.1)$$

**Definiția 14.1** Curba  $C$  se numește *geodezică a lui  $S$*  dacă pentru orice  $t \in I$  avem:

$$\boxed{\ddot{\bar{r}}_C(t) \parallel \bar{N}(\bar{r}_C(t))} \quad (G)$$

adică în orice punct  $P$  al curbei  $C$  vectorul accelerație  $\ddot{\bar{r}}_C(P)$  este perpendicular pe planul tangent  $T_P S$ .

*Interpretare fizică* Rezultă că pentru un "locuitor" al lui  $S$  curba  $C$  nu are accelerație; altfel spus o particulă cu traiectoria  $C$  se mișcă cu viteza constantă de-a lungul lui  $C$  pe  $S$ .

Reamintim și Legea a II-a a dinamicii newtoniene: Forța = masa înmulțită cu accelerația,  $\bar{F} = m\bar{a}$ . Deci  $\bar{a} = 0$  este echivalent cu absența forței. În concluzie, un punct material în mișcare liberă (fără forțe) sau acționat de o forță perpendiculară mereu pe  $S$  are ca traiectorie o geodezică a lui  $S$ .

**Observația 14.2** Dacă  $S$  conține dreapta  $d$  atunci, cum  $\ddot{\bar{r}}$  este nul pentru o dreaptă, rezultă că  $d$  este geodezică pe  $S$ . Prin urmare, dreptele sunt geodezice ale planului euclidian și mai general, ale oricărei suprafețe riglate !

Să deducem ecuațiile geodezicelor. Din (13.1) avem:

$$\dot{\bar{r}}_C(t) = \bar{r}_i(u^j(t))\dot{u}^i(t), \quad (14.2)$$

$$\ddot{\bar{r}}_C(t) = \bar{r}_{ij}(u^a(t))\dot{u}^i(t)\dot{u}^j(t) + \bar{r}_k(u^a(t))\ddot{u}^k(t). \quad (14.3)$$

Introducând ecuațiile Gauss în (13.3) avem:

$$\ddot{\bar{r}}_C(t) = (\ddot{u}^k(t) + \Gamma_{ij}^k(u^a(t))\dot{u}^i(t)\dot{u}^j(t))\bar{r}_k(u^a(t)) + b_{ij}\bar{N} \quad (14.3)$$

și deci avem:

**Teorema 14.3** *Sistemul diferențial al geodezicelor este:*

$$\boxed{\ddot{u}^k(t) + \Gamma_{ij}^k(u^a(t))\dot{u}^i(t)\dot{u}^j(t) = 0} \quad (SG)$$

sau încă:

$$\begin{cases} \ddot{u}^1(t) + \Gamma_{ij}^1(u^a(t))\dot{u}^i(t)\dot{u}^j(t) = 0 \\ \ddot{u}^2(t) + \Gamma_{ij}^2(u^a(t))\dot{u}^i(t)\dot{u}^j(t) = 0. \end{cases} \quad (14.4)$$

#### Consecințe remarcabile 14.4

1. Din expresia simbolilor Christoffel rezultă că teoria geodezicelor aparține geometriei intrinseci a lui  $S$ . Altfel spus, geodezicele sunt obiecte intrinseci ale lui  $S$ .
2. Sistemul (SG) este neliniar deci rezolvarea lui explicită este foarte dificilă sau chiar imposibilă.
3. Știm de la Cursul de Ecuații Diferențiale că problema Cauchy are soluție unică. Avem deci:

**Teorema 14.5** *Fie punctul  $P_0(u_0^i) \in S$  fixat și vectorul tangent  $V \in T_{P_0}S$  cu  $\|V\| = 1$ . Atunci există  $\varepsilon = \varepsilon(P_0, V) > 0$  și o unică geodezică  $C$ ,  $\bar{r}_C : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$  parametrizată canonic și satisfăcând datelor inițiale:*

- 1)  $C(0) = P_0$ ,
- 2)  $\dot{\bar{r}}_C(0) = V$ .

Să studiem simbolii Christoffel. Ei sunt în număr de  $2^3 = 8$  dar avem o simetrie ce reduce numărul lor. Astfel, din simetria  $g_{ij} = g_{ji}$  a formei I-a fundamentale rezultă:

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k \quad (14.5)$$

ceea ce reduce numărul lor la 6 esențiali:  $\Gamma_{ij}^1, \Gamma_{ij}^2$  cu  $(i, j) \in \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ .

**Exemplul 14.6 (Planul)** Știm că dreptele din plan, parametrizate constant (!), sunt geodezice. În fapt, acestea sunt toate. În adevăr, putem considera planul ca fiind  $xOy$  deci  $\bar{r}(u^i) = (u^1, u^2, 0)$ ,  $(u^i) \in U = \mathbb{R}^2$ . Avem atunci  $g_{ij} = \delta_{ij}$  și deci  $\Gamma = 0$ . Sistemul geodezicelor devine  $\ddot{u}^i = 0$  cu soluția unică  $u^i(s) = u_0^i + sv_0^i$ . Acestea sunt dreptele ce trec prin  $P_0(u_0^1, u_0^2)$  și au versorul director  $V = (v_0^1, v_0^2)$ .

Un rezultat foarte important, ce apare ca rescriere a Interpretării fizice, este:

**Teorema 14.7** *Dacă  $C : \bar{r} = \bar{r}_C(t), t \in I \subset \mathbb{R}$  este o geodezică pe  $S$  atunci funcția  $t \in I \rightarrow \|\dot{\bar{r}}_C(t)\| \in \mathbb{R}$  este constantă.*

**Demonstrație**  $\frac{d}{dt}\|\dot{\bar{r}}_C(t)\|^2 = 2 < \ddot{\bar{r}}_C(t), \dot{\bar{r}}_C(t) > = 0$  deoarece  $\ddot{\bar{r}}_C(t) \perp \dot{\bar{r}}_C(t)$ .  $\square$

**Corolarul 14.8** *Fie  $C$  geodezica  $\bar{r}_C : (a, b) \in \mathbb{R} \rightarrow S$ .*

1. *Fie  $\varphi : (d, e) \rightarrow (a, b)$  o aplicație netedă ( $C^\infty$ ). Atunci  $\varphi \circ C$  este geodezică dacă și numai dacă există numerele reale  $m, n$  așa încât  $\varphi(t) = mt + n$ . Deci singurele reparametrizări ce*



invariază caracterul de geodezică sunt cele afine !

2. Presupunem că aplicația  $\tilde{r}_C$  este difeomorfism de la  $(a, b)$  la  $C(a, b) \subset \mathbb{R}^3$ . Fie  $\tilde{C} : (d, e) \rightarrow S$  cu  $\tilde{C}(d, e) \subset C(a, b)$ . Atunci  $\tilde{C}$  este geodezică dacă și numai dacă funcția  $t \in (d, e) \rightarrow \|\dot{\tilde{C}}(t)\|$  este constantă.

Natura variațională a geodezicelor Pe  $S$  avem  $(u^i)$  coordonatele unui punct iar un vector tangent oarecare are coordonatele  $(v^i)$ . Reamintim că mulțimea  $TS = \cup_{P \in S} TP S$  se numește *fibratul tangent al lui  $S$*  și un element al său are coordonatele  $(u^i, v^i)$ . O funcție  $L : TS \rightarrow \mathbb{R}$  se numește *Lagrangian* dacă este netedă admițând că știm faptul că pe  $TS$  se poate face uin calcul diferențial analog celui de pe  $S$ , variind doar dimensiunea:  $\dim S = 2$ ,  $\dim TS = 4$ . Unui Lagrangian  $i$  se asociază *ecuațiile Euler-Lagrange*:

$$\boxed{E_i(L) := \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial v^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial u^i} = 0.} \quad (EL)$$

Rezultatul fundamental al acestei teorii este faptul că geodezicele sunt soluțiile sistemului Euler-Lagrange pentru Lagrangianul *Energie* al metricii  $g$ :

$$E(g) = \frac{1}{2} g_{ij}(u^a) v^i v^j \quad (Eg)$$

iar în  $(EL)$  vom considera  $v^i = \dot{u}^i$ . Teorema 13.7 de parametrizare constantă a geodezicelor se reduce în acest cadru la *Conservarea energiei*:  $E(g)$  este integrală primă pentru sistemul Euler-Lagrange și drept consecință *reduce* cu 1 numărul ecuațiilor ce sunt necesare a fi studiate !

De asemeni, dacă forma a I-a fundamentală nu depinde de variabila  $u^i$  cu  $i \in \{1, 2\}$  atunci sistemul diferențial Euler-Lagrange admite integrala primă  $\frac{\partial L}{\partial v^i} = g_{ij}(u) v^j = \text{constant}$  !

**Exemplul 14.9 (Semiplanul superior)** Modelul Poincaré al *geometriei hiperbolice* are ca suport următoarea varietate 2-dimensională (care nu se poate realiza ca suprafață)  $H^2 = \{(u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2 : u^2 > 0\}$  înzestrată cu metrica:

$$g_h = \frac{1}{(u^2)^2} [(du^1)^2 + (du^2)^2]. \quad (14.6)$$

Energia acestei metrici este deci:

$$E(g_h) = \frac{1}{2(u^2)^2} [(v^1)^2 + (v^2)^2] \quad (14.7)$$

cu ecuațiile Euler-Lagrange:

$$\begin{cases} E_1(E(g_h)) = \frac{d}{dt} \left[ \frac{v^1}{(u^2)^2} \right] = 0 \\ E_2(E(g_h)) = \frac{d}{dt} \left[ \frac{v^2}{(u^2)^2} \right] - \frac{-1}{(u^2)^3} [(v^1)^2 + (v^2)^2] = 0. \end{cases} \quad (14.8)$$

Din prima ecuație avem integrala primă:

$$\dot{u}^1 = C_1 (u^2)^2 \quad (14.9)$$

cu  $C_1$  număr real arbitrar. În ecuația a doua după efectuarea derivării și eliminarea numitorului comun  $(u^2)^3$  avem:

$$\ddot{u}^2 u^2 - 2(\dot{u}^2)^2 + C_1^2 (u^2)^4 + (\dot{u}^2)^2 = 0 \quad (14.10)$$

adică:

$$\ddot{u}^2 u^2 - (\dot{u}^2)^2 + C_1^2 (u^2)^4 = 0 \quad (14.11)$$

Împărțim prin  $(u^2)^2$ :

$$\frac{\ddot{u}^2 u^2 - (\dot{u}^2)^2}{(u^2)^2} + C_1^2 (u^2)^2 = 0 \quad (14.12)$$

echivalent:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\dot{u}^2}{u^2} \right) + C_1 \dot{u}^1 = 0 \quad (14.13)$$

care se integrează:

$$\frac{\dot{u}^2}{u^2} + C_1 u^1 = C_2. \quad (14.14)$$

Înmulțim ultima ecuație cu  $(u^2)^2$ :

$$\dot{u}^2 u^2 + C_1 u^1 (u^2)^2 = C_2 (u^2)^2. \quad (14.13)$$

Vom scoate  $(u^2)^2$  din integrala primă (14.9) și aici discuția se împarte în două cazuri:

a)  $C_1 = 0$ ; rezultă din (14.9) că  $\dot{u}^1 = 0$ , deci  $u^1 = \text{constant} = u_0^1$  sunt geodezice. Acestea sunt drepte perpendiculare pe axa  $Ox$ .

b)  $C_1 \neq 0$ . Revenind la (14.13) avem:

$$u^2 \dot{u}^2 + u^1 \dot{u}^1 = \frac{C_2}{C_1} \dot{u}^1 \quad (14.14)$$

adică:

$$u^2 \dot{u}^2 + \dot{u}^1 (u^1 - u_0^1) = 0 \quad (14.15)$$

unde  $u_0^1 = \frac{C_2}{C_1}$ . Ultima ecuație se integrează:

$$(u^2)^2 + (u^1 - u_0^1)^2 = C_3 > 0 \quad (14.16)$$

care este un cerc cu centrul pe axa  $Ox$  în  $x_0 = u_0^1$ .

În concluzie, toate geodezicele lui  $(H^2, g_h)$  sunt:

- 1) semidrepte perpendiculare pe  $Ox$  situate în semiplanul superior,
- 2) semicercuri cu centrul pe  $Ox$  situate în semiplanul superior.

Să prezentăm o a doua metodă, cea care face apel la integrala Energiei și care înlocuiește calculele de după (14.9). Avem deci:

$$(\dot{u}^1)^2 + (\dot{u}^2)^2 = 1 \cdot (u^2)^2 \quad (14.17)$$

deci vom considera geodezice cu parametrizarea canonică. Folosind (14.9) cu  $C_1 \neq 0$  avem:

$$\frac{(du^1)^2}{(dt)^2} + \frac{(du^2)^2}{(dt)^2} = \frac{du^1}{C_1 dt} \quad (14.18)$$

și multiplicăm cu  $\frac{(dt)^2}{(du^1)^2}$  (deci considerăm doar geodezice cu  $u^1$  neconstant):

$$1 + \left( \frac{du^2}{du^1} \right)^2 = \frac{dt}{C_1 du^1} = \frac{1}{C_1^2 (u^2)^2}. \quad (14.19)$$

Înmulțim această ecuație cu  $(u^2)^2$  și notăm  $1/C_1^2$  cu  $R^2$ . Rezultă:

$$\left(u^2 \frac{du^2}{du^1}\right) = \sqrt{R^2 - (u^2)^2}$$

adică:

$$\frac{u^2 du^2}{\sqrt{R^2 - (u^2)^2}} = du^1$$

și integrând această ultimă relație avem:

$$-\sqrt{R^2 - (u^2)^2} = u^1 - u_0^1$$

ceea ce coincide cu (14.16) pentru  $R^2 = C_3 > 0$ .

**Exemplul 14.10 (Suprafețe de rotație).** Fie  $S$  o suprafață de rotație având pe  $Oz$  ca axă de rotație. Deci curba meridian este  $C_m : \bar{r}(u) = (\varphi(u), \psi(u))$  în planul  $xOz$ . Reamintim forma I-a fundamentală:

$$g = [(\varphi')^2 + (\psi')^2](du)^2 + \varphi^2(dv)^2. \quad (14.20)$$

Vom presupune că  $C_m$  este parametrizată canonic; deci  $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ . Energia acestei metrici este:

$$E(g) = \frac{1}{2}[(v^1)^2 + \varphi^2(u^1)(v^2)^2] \quad (14.21)$$

cu ecuațiile Euler-Lagrange:

$$\begin{cases} E_1(E(g)) = \frac{d}{dt}[v^1] - \varphi(u^1)\varphi'(u^1)(v^2)^2 = 0 \\ E_2(E(g)) = \frac{d}{dt}[\varphi^2(u^1)v^2] = 0. \end{cases} \quad (14.22)$$

Din a doua ecuație obținem *integrala primă Clairaut*:

$$\varphi^2(u^1)\dot{u}^2 = \text{constant}. \quad (14.23)$$

Rezultă că toate curbele meridian  $C_{m,u_0^2}$  parametrizate constant ( $\dot{u}^1 = v^1 = \text{const}$ ) deci cu  $u^2 = \text{constant} = u_0^2$  sunt geodezice. Curbele paralele  $u^1 = \text{constant} = u_0^1$  sunt geodezice dacă și numai dacă  $\varphi'(u_0^1) = 0$  !

**Exemplul 14.11 (Cilindrul circular drept)** Avem  $\varphi = \text{constant} = R$ ,  $\psi(u) = u$ . Se verifică imediat faptul că  $C_m$  este parametrizată canonic. Avem integrala primă Clairaut  $R^2\dot{u}^2 = \text{constant}$ , deci  $\dot{u}^2 = \text{constant} = a_2$  și deci putem integra  $u^2 = a_2 t + b_2$ . Cum  $\varphi' = 0$  prima ecuație (14.19) se reduce la  $\ddot{u}^1 = 0$  care se integrează complet:  $u^1 = a_1 t + b_1$ . În concluzie , geodezicele cilindrului sunt:

$$C : \bar{r}(t) = (R \cos(a_1 t + b_1), R \sin(a_1 t + b_1), a_2 t + b_2). \quad (14.24)$$

Dacă  $a_2 = 0$  obținem cercul paralel  $z = b_2 = \text{const}$ . Dacă  $a_1 = 0$  obținem generatoarea ce trece prin punctul  $(R \cos(b_1), R \sin(b_1), b_2)$ . Pentru  $a_1 \neq 0$  obținem o elice deoarece  $\bar{r}'$  are a treia componentă constant egală cu  $b_2$  !

**S14.1** Se dau numerele reale  $a, b$  și suprafața  $S$  cu parametrizarea globală  $(\mathbb{R}^2, \varphi)$ :

$$\varphi(u^1, u^2) = (a(u^1 + u^2), b(u^1 - u^2), u^1 u^2).$$

Să se arate că liniile (curbele) de coordonate pe  $S$  sunt geodezice.

**Rezolvare** Avem:  $\varphi_1(u^1, u^2) = (a, b, u^2)$ ,  $\varphi_2(u^1, u^2) = (a, -b, u^1)$  și deci:

$$\begin{cases} E = a^2 + b^2 + (u^2)^2 \\ F = a^2 - b^2 + u^1 u^2 \\ G = a^2 + b^2 + (u^1)^2. \end{cases}$$

Energia metricii  $g$  va fi:

$$E(g) = \frac{1}{2} \{ [a^2 + b^2 + (u^2)^2] (v^1)^2 \} + [a^2 - b^2 + u^1 u^2] v^1 v^2 + \frac{1}{2} \{ [a^2 + b^2 + (u^1)^2] \} (v^2)^2$$

și obținem ecuațiile Euler-Lagrange:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \{ [a^2 + b^2 + (u^2)^2] v^1 + (a^2 - b^2 + u^1 u^2) v^2 \} - [u^2 v^1 v^2 + u^1 (v^2)^2] \\ \frac{d}{dt} \{ (a^2 - b^2 + u^1 u^2) v^1 + [a^2 + b^2 + (u^1)^2] v^2 \} - [u^2 (v^1)^2 + u^1 v^1 v^2]. \end{cases}$$

Efectuând calculele obținem:

$$\begin{cases} 2u^2 v^1 v^2 + [a^2 + b^2 + (u^2)] \dot{v}^1 + (a^2 - b^2 + u^1 u^2) \dot{v}^2 = 0 \\ 2u^1 v^1 v^2 + (a^2 - b^2 + u^1 u^2) \dot{v}^1 + [a^2 + b^2 + (u^1)^2] \dot{v}^2 = 0. \end{cases}$$

Fie curba  $C : v = \text{const}$ , adică  $(u^1(t) = u_0^1 + \varepsilon, u^2(t) = u_0^2)$ . Avem deci  $(v^1(t) = 1, v^2(t) = 0)$  și sunt satisfăcute ultimele ecuații. Analog pentru  $C : u = \text{const}$  adică  $(u^1(t) = u_0^1, u^2(t) = u_0^2 + \varepsilon)$  i.e.  $(v^1(t) = 0, v^2(t) = 1)$ .

**S14.2** Să se studieze geodezicele elicoidului.

**Rezolvare** Avem metrica:  $g = \frac{1}{2} [du^2 + (u^2 + h^2)dv^2]$  deci energia:

$$E(g) = \frac{(v^1)^2}{2} + [(u^1)^2 + h^2] \frac{(v^2)^2}{2} = \frac{\dot{u}^2}{2} + (u^2 + h^2) \frac{\dot{v}^2}{2}.$$

Ecuațiile Euler-Lagrange sunt:

$$\begin{cases} E_1(E(g)) = \frac{d\dot{u}}{dt} - u\dot{v}^2 = 0 \\ E_2(E(g)) = \frac{d}{dt} [(u^2 + h^2)\dot{v}] = 0. \end{cases}$$

Prin urmare, a doua ecuație Euler-Lagrange generează integrala primă:

$$(u^2 + h^2)\dot{v} = C_1.$$

**S14.3** Să se studieze geodezicele lui  $S = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  cu metrica euclidiană folosind coordonatele polare.

**Rezolvare** Să aflăm mai întâi expresia metricii euclidiene în coordonate polare. Din:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

rezultă:

$$\begin{cases} dx = dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta \\ dy = dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta \end{cases}$$

și deci avem metrica:

$$g = dx^2 + dy^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$$

cu energia:

$$E(g) = \frac{1}{2}[(v^1)^2 + (u^1)^2(v^2)^2] = \frac{1}{2}[(\dot{u}^1)^2 + (u^1)^2(\dot{u}^2)^2] = \frac{1}{2}[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2].$$

Ecuatiile Euler-Lagrange sunt:

$$\begin{cases} E_1(E(g)) = \frac{d\dot{r}}{dt} - r\dot{\theta}^2 = 0 \\ E_2(E(g)) = \frac{d}{dt}[r^2\dot{\theta}] = 0. \end{cases}$$

Din a doua ecuație avem integrala primă:

$$r^2\dot{\theta} = C_1.$$

Pentru  $C_1 = 0$  adică  $\theta = \text{const}$  obținem drepte prin originea  $O$  !

**S14.4** Să se studieze geodezicele unei *metrici warped* i.e. a unei metrici de tipul:

$$g(r, \theta) = dr^2 + G(r)d\theta^2.$$

**Rezolvare** Avem:

$$E(g) = \frac{1}{2}[\dot{r}^2 + G\dot{\theta}^2]$$

cu ecuațiile Euler-Lagrange:

$$\begin{cases} E_1(E(g)) = \frac{d\dot{r}}{dt} - \frac{G'}{2}(\dot{\theta})^2 = 0 \\ E_2(E(g)) = \frac{d}{dt}[G\dot{\theta}] = 0. \end{cases}$$

Din a doua ecuație avem integrala primă:

$$G(r)\dot{\theta} = C_1.$$

**Exemple:** 1)  $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  cu metrica euclidiană în coordonate polare,  $G(r) = r^2$ ; vezi exercițiul 8.6.

2) elicoidul,  $G(r) = r^2 + h^2$ .

3) suprafețe de rotație cu curba meridian parametrizată canonic,  $G(r) = \varphi^2(r)$ . Astfel, sfera  $S(O, R)$  are  $\varphi(u) = R \cos u$ .

Vom deduce acum o altă ecuație diferențială pentru geodezice diferite de curbele  $u = \text{constant}$ . Avem:

$$\frac{dv}{du} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{du}{dt}} = \frac{\dot{v}}{\dot{u}} \quad (14.25)$$

respectiv:

$$\frac{d^2v}{du^2} = \frac{d}{du} \left( \frac{\dot{v}}{\dot{u}} \right) = \frac{1}{\frac{du}{dt}} \frac{d}{dt} \left( \frac{\dot{v}}{\dot{u}} \right) = \frac{1}{\dot{u}} \frac{\ddot{v}\dot{u} - \dot{v}\ddot{u}}{\dot{u}^2} = \frac{1}{\dot{u}^2} \ddot{v} - \frac{\dot{v}}{\dot{u}^3} \ddot{u}.$$

Înlocuim  $\ddot{u}$  și  $\ddot{v}$  cu expresia corespunzătoare din sistemul diferențial al geodezicilor:

$$\frac{d^2v}{du^2} = \frac{1}{\dot{u}^2} (-\Gamma_{11}^2 \dot{u}^2 - 2\Gamma_{12}^2 \dot{u}\dot{v} - \Gamma_{22}^2 \dot{v}^2) - \frac{\dot{v}}{\dot{u}^3} (-\Gamma_{11}^1 \dot{u}^2 - 2\Gamma_{12}^1 \dot{u}\dot{v} - \Gamma_{22}^1 \dot{v}^2)$$

adică, folosind (14.25):

$$\frac{d^2v}{du^2} = \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{du}\right)^3 + (2\Gamma_{12}^1 - \Gamma_{22}^2) \left(\frac{dv}{du}\right)^2 + (\Gamma_{11}^1 - 2\Gamma_{12}^2) \frac{dv}{du} - \Gamma_{11}^2 = 0 \quad (14.26)$$

care este noua ecuație diferențială a geodezicilor.

**Exemplu** Planul Poincaré are coeficienții Christoffel:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{v} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{12}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{v} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{v} \end{pmatrix}. \quad (14.27)$$

Atunci ecuația (14.26) devine:

$$v'' = \frac{1}{v}(v')^2 - \frac{1}{v}$$

care se poate scrie:

$$vv'' + (v')^2 = -1.$$

Ultima ecuație se integrează în raport cu variabila  $u$ :

$$vv' = u_0 - u$$

și deci:

$$(u - u_0) + (vv') = 0.$$

Și această ecuație se integrează:

$$\frac{1}{2}(u - u_0)^2 + \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}R^2.$$

Reobținem astfel semicercurile cu centrul  $(u_0, 0)$  pe axa  $Ox$ .

# Cursul 15

## Conexiuni liniare

Fixăm  $M^n$  o varietate diferentiabilă netedă de dimensiune  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Definiția 15.1** i) Numim *conexiune liniară pe  $M$*  o aplicație  $\nabla : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M)$ ,  $(X, Y) \rightarrow \nabla_X Y$  cu proprietățile:

CL1) este  $C^\infty(M)$ -liniară în primul argument:  $\nabla_{fX+gY}Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$ ,

CL2) este  $\mathbb{R}$ -liniară în al doilea argument:  $\nabla_X(\alpha Y + \beta Z) = \alpha\nabla_X Y + \beta\nabla_X Z$ ,

CL3) satisface identitatea Leibniz în al doilea argument:  $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$ ,  
pentru orice  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $f, g \in C^\infty(M)$  și orice  $X, Y, Z \in \mathcal{X}(M)$ .

ii) Pentru  $X \in \mathcal{X}(M)$  fixat aplicația  $\nabla_X : \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$ ,  $Y \rightarrow \nabla_X Y$  se numește *derivata covariantă relativ la  $X$* . Dacă  $\nabla_X Y = 0$  spunem că  $Y$  este  *$\nabla$ -covariant constant în raport cu  $X$* . Dacă  $\nabla_X Y = 0$  pentru orice  $X \in \mathcal{X}(M)$  spunem că  $Y$  este un câmp vectorial  *$\nabla$ -paralel* sau  *$\nabla$ -covariant constant*. Dacă  $\nabla$  este explicită din context nu mai scriem litera  $\nabla$  la aceste noțiuni.

**Observația 15.2** a) Fie câmpul vectorial nul  $0 \in \mathcal{X}(M)$ ; avem  $\nabla_0 X = \nabla_X 0 = 0$  pentru orice  $X \in \mathcal{X}(M)$ .

b) Din condiția CL3 avem că aplicația  $\nabla$  **nu este** câmp tensorial de tip  $(1, 2)$ ; pentru acest fapt ar fi trebuit condiția:  $\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y$  i.e.  $C^\infty(M)$ -liniaritatea și în al doilea argument.

c) Se arată imediat că aplicația  $\nabla$  este *locală* în ambele argumente i.e. dat punctul  $p \in M$  vectorul  $\nabla_X Y(p) \in T_p M$  depinde doar de  $X(p) \in T_p M$  și de valorile lui  $Y$  pe o vecinătate a lui  $p$ . Prin urmare, pentru un deschis  $U \subset M$  și  $X, Y \in \mathcal{X}(U)$  avem că  $\nabla_X Y \in \mathcal{X}(U)$

**Propoziția 15.3** *Există conexiuni liniare pe  $M$ .*

**Demonstrație** Se utilizează partiția unității asociată unui atlas dat pe  $M$  precum și faptul că există o conexiune liniară pe deschișii lui  $\mathbb{R}^n$ . În adevăr, fie deschișul  $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ; atunci  $X, Y \in \mathcal{X}(U)$  au expresia bf globală:  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ ,  $Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ . Atunci se verifică imediat că aplicația  $(X, Y) \rightarrow D_X Y := X(Y^j) \frac{\partial}{\partial x^j}$  este o conexiune liniară pe  $U$ .  $\square$

**Definiția 15.4** Conexiunea  $D$  introdusă anterior o numim *conexiunea euclidiană pe  $U$* .

În cele ce urmează vom da o explicație a denumirii acestei noțiuni foarte importantă din geometria varietăților diferentiabile. Fie  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$  o curbă netedă pe  $M$ . Aplicația netedă  $V : I \rightarrow TM$  o numim *câmp vectorial de-a lungul lui  $\gamma$*  dacă  $V(t) \in T_{\gamma(t)} M$  pentru orice  $t \in I$ . Fie  $\mathcal{X}(\gamma)$  mulțimea acestor aplicații.  $\mathcal{X}(\gamma)$  este nevidă deoarece *câmpul vectorial tangent*  $\gamma'$  aparține lui  $\mathcal{X}(\gamma)$ . Explicarea locală: fie harta locală  $h = (U, x^1, \dots, x^n)$  cu  $U \cap \gamma(I) \neq \emptyset$ . Pe deschișul  $U \cap \gamma(I)$  avem ecuațiile curbei  $\gamma$ :  $x^i = x^i(t)$ ,  $t \in I$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

Atunci:  $\gamma'(t) = \dot{x}^i(t) \frac{\partial}{\partial x^i} |_{\gamma(t)} \in T_{\gamma(t)}M$  unde  $\dot{x}^i = \frac{dx^i}{dt} = (x^i)'$  este derivata ordinară a funcției netede  $x^i$ .  $\mathcal{X}(\gamma)$  este  $C^\infty(M)$ -modul deoarece  $V \in \mathcal{X}(M)$  și  $f \in C^\infty(M)$  implică  $fV \in \mathcal{X}(M)$ . Dat  $Y \in \mathcal{X}(M)$  oarecare avem *restricția la  $\gamma$*  anume  $Y|_\gamma \in \mathcal{X}(\gamma)$ . Dăm următorul rezultat fără demonstrație:

**Propoziția 15.5** Fie conexiunea liniară  $\nabla$  și curba netedă  $\gamma$ . Atunci există o aplicație  $\frac{D}{dt} : \mathcal{X}(\gamma) \rightarrow \mathcal{X}(\gamma)$  unică relativ la proprietățile următoare:

$$\text{DC1) } \frac{D}{dt}(V + W) = \frac{D}{dt}V + \frac{D}{dt}W, \quad \text{DC2) } \frac{D}{dt}(fV) = f'V + f \frac{D}{dt}V,$$

$$\text{DC3) } \text{dacă } V \in \mathcal{X}(\gamma) \text{ este restricția lui } Y \in \mathcal{X}(M) \text{ atunci: } \left(\frac{D}{dt}V\right)(t) = \nabla_{\gamma'(t)}Y(\gamma(t)).$$

Expresia din membrul drept este în acord cu proprietatea lui  $\nabla$  de a fi local; a se vedea Observația 15.2c).

**Definiția 15.6** Aplicația  $\frac{D}{dt}$  o numim *derivata covariantă indusă de  $\nabla$  de-a lungul lui  $\gamma$* . Câmpul  $V \in \mathcal{X}(\gamma)$  îl numim *paralel de-a lungul lui  $\gamma$*  dacă  $\frac{D}{dt}V = 0$ .

**Observația 15.7** Propoziția precedentă spune că  $\frac{D}{dt}$  este un operator  $\mathbb{R}$ -liniar ce **nu este**  $C^\infty(M)$ -liniar! Mulțimea câmpurilor paralele de-a lungul lui  $\gamma$  este  $\text{Ker}\left(\frac{D}{dt}\right) = \mathbb{R}$ -subspațiu vectorial în  $\mathbb{X}(\gamma)$ .

**Propoziția 15.8** Fie conexiunea liniară  $\nabla$  și curba netedă  $\gamma$ . Fixăm  $t_0 \in I$  și vectorul tangent  $V_0 \in T_{\gamma(t_0)}M$ . Atunci există un unic câmp  $V \in \mathcal{X}(\gamma)$  ce este paralel de-a lungul lui  $\gamma$  și satisface  $V(t_0) = V_0$ .

**Demonstrație** Rezultă direct din existența și unicitatea soluției pentru Problema Cauchy.

□

**Definiția 15.9** Câmpul paralel  $V \in \mathcal{X}(\gamma)$  dat de rezultatul precedent se numește *transportul paralel al lui  $V_0$  de-a lungul lui  $\gamma$  indus de conexiunea liniară  $\nabla$* .

**Observația 15.10** Propoziția precedentă spune că aplicația  $P_{t_0}^\gamma : \text{Ker}\left(\frac{D}{dt}\right) \rightarrow T_{\gamma(t_0)}M$ ,  $V \rightarrow V_0$  este bijecție! Dar  $P_{t_0}^\gamma$  este operator  $\mathbb{R}$ -liniar și deci  $P_{t_0}^\gamma$  este izomorfism  $\mathbb{R}$ -liniar. Consecințe:

$$\text{i) } \dim \text{Ker}\left(\frac{D}{dt}\right) = \dim T_{\gamma(t_0)}M = n,$$

ii) aplicația  $P_{t_0, t_1}^\gamma : T_{\gamma(t_0)}M \rightarrow T_{\gamma(t_1)}M$ ,  $P_{t_0, t_1}^\gamma = P_{t_1}^\gamma \circ (P_{t_0}^\gamma)^{-1}$  este izomorfism de spații vectoriale reale fiind o compunere de izomorfisme liniare.

**Definiția 15.11** Izomorfismul  $P_{t_0, t_1}^\gamma$  se numește *transportul paralel de-a lungul lui  $\gamma$  de la  $t_0$  la  $t_1$  indus de conexiunea liniară  $\nabla$* .

Dat vectorul tangent  $v \in T_{\gamma(t_0)}M$  avem că  $P_{t_0, t_1}^\gamma(v) \in T_{\gamma(t_1)}M$  se obține considerând câmpul paralel  $(P_{t_0}^\gamma)^{-1}(v) \in \mathcal{X}(\gamma)$  și luând valoarea acestui câmp la momentul  $t_1$ .

*Proprietăți ale transportului paralel:*

$$\text{TP1) } (P_{t_0, t_1}^\gamma)^{-1} = P_{t_1, t_0}^\gamma, \quad \text{TP2) } T_{t_1, t_2}^\gamma \circ T_{t_0, t_1}^\gamma = P_{t_0, t_2}^\gamma,$$

TP3) conexiunea liniară  $\nabla$  se poate reconstitui din transportul paralel. Fie punctul  $p \in M$  fixat și  $X, Y \in \mathcal{X}(M)$  cu  $X(p) \neq 0$ . Fie  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  curba integrală a lui  $X$  cu  $\gamma(0) = p$ . Atunci:

$$\nabla_X Y(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left( P_{t, 0}^\gamma(Y(\gamma(t))) - Y(p) \right). \quad (15.1)$$

În cele ce urmează prezentăm expresia locală a unei conexiuni locale, posibilă datorită Observației 15.2c). Fie deci harta locală  $h = (U, x^1, \dots, x^n)$  și baza  $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right\}$  a lui  $\mathcal{X}(U)$ .



Cum câmpul vectorial  $\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} \in \mathcal{X}(U)$  rezultă că se descompune în baza dată: deci există un set de funcții netede  $\Gamma_{ij}^k \in C^\infty(U)$  pentru toți indicii  $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$  așa încât:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} \quad (15.2)$$

relație ce dă expresia locală a lui  $\nabla$ .

**Definiția 15.12** Funcțiile netede  $\Gamma_{ij}^k$  se numesc *coeficienții de conexiune* în harta dată.

Fie acum  $X, Y \in \mathcal{X}(U)$  oarecare. Avem  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$  și  $Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ . Rezultă:

$$\nabla_X Y = X^i \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left( Y^j \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = X^i \left[ \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} + \Gamma_{ij}^k Y^j \frac{\partial}{\partial x^k} \right] = X^i Y_{;i}^k \frac{\partial}{\partial x^k} \quad (15.3)$$

unde:

$$Y_{;i}^k = \frac{\partial Y^k}{\partial x^i} + \Gamma_{ij}^k Y^j. \quad (15.4)$$

Uneori, pentru simplificarea scrierii se utilizează notația  $Y_{;i}^j = \frac{\partial Y^i}{\partial x^j}$  și deci:

$$Y_{;i}^k = Y_{,i}^k + \Gamma_{ij}^k Y^j \quad (15.5)$$

ceea ce spune că  $\nabla$  apare ca o *deformare* a derivării uzuale (parțiale) având caracter geometric!

Putem scrie acum problema Cauchy a transportului paralel:  $X = \gamma'(t) = \dot{x}^i(t) \frac{\partial}{\partial x^i}$  și  $Y = V = V^j(t) \frac{\partial}{\partial x^j}$  este vectorul necunoscut. Avem pentru orice  $k \in \{1, \dots, n\}$ :

$$0 = X^i Y_{;i}^k = \dot{x}^i(t) \left[ \frac{\partial V^k}{\partial x^j}(t) + \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) V^j(t) \right] = \frac{dV^k}{dt}(t) + \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{x}^i(t) V^j(t) \quad (15.6)$$

la care adaugăm condiția inițială:  $V^k(t_0) = V_0^k$ .

## SEMINAR 15

**S15.1** Pe deschisul  $U \subset \mathbb{R}^2$  se dă conexiunea liniară  $\nabla$  având nenuli doar coeficienții:

$$\Gamma_{11}^1(x, y) = \frac{5}{x^2 + x - 6}, \quad \Gamma_{22}^2 = \frac{3}{y^2 + 5y + 4}$$

(deci  $U$  este planul  $\mathbb{R}^2$  fără punctele  $(-3, -4)$ ,  $(-3, -1)$ ,  $(2, -4)$ ,  $(2, -1)$ ) și curba  $\gamma(t) = (t^2, t+1)$ . Se consideră vectorul tangent  $V_0 = (5, 2) \in T_p U$  cu  $p = (0, 1)$ . Se cere vectorul tangent în  $q = (1, 2)$  obținut prin transportul paralel al lui  $V_0$  de-a lungul lui  $\gamma$ .

**Rezolvare** Avem  $p = \gamma(0)$ ,  $q = \gamma(1)$  și problema Cauchy:

$$\frac{dV^1}{dt}(t) + \frac{5}{(t^2)^2 + t^2 - 6} \cdot 2tV^1(t) = 0, \quad \frac{dV^2}{dt}(t) + \frac{3}{(t+1)^2 + 5(t+1) + 4} \cdot 1 \cdot V^2(t) = 0$$

cu data inițială ( $V^1(0) = 5$ ,  $V^2(0) = 2$ ). Prin integrare, cu funcția logaritm, obținem:

$$V^1(t) = a \frac{t^2 + 3}{t^2 - 2}, \quad V^2(t) = b \frac{t + 5}{t + 2}$$

cu  $a, b$  constante ce vor fi determinate din condiția inițială:  $-a\frac{3}{2} = 5, b\frac{5}{2} = 2$ . În concluzie:

$$V^1(t) = -\frac{10t^2 + 3}{3t^2 - 2}, \quad V^2(t) = \frac{4t + 5}{5t + 2}$$

și deci:  $V(1) = (\frac{40}{3}, \frac{8}{5})$ .

**S15.2** Pe varietatea  $M$  se dau  $k \geq 2$  conexiuni liniare  $\nabla^1, \dots, \nabla^k$  și funcțiile  $f_1, \dots, f_k \in C^\infty(M)$  așa încât:  $f_1 + \dots + f_k = \lambda$ . Definim:  $\nabla = f_1\nabla^1 + \dots + f_k\nabla^k$ . Să se arate că:

- i) dacă  $\lambda = 1$  atunci  $\nabla$  este conexiune liniară,
- ii) dacă  $\lambda = 0$  atunci  $\nabla$  este câmp tensorial de tip  $(1, 2)$ .

**Rezolvare** i) Se verifică definiția. ii) Se verifică  $C^\infty$ -biliniaritatea.

**S15.3** Pe  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  se dă conexiunea euclidiană  $D$ . Se cer  $\nabla_X Y$  și  $\nabla_Y X$  pentru:

$$X = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = \frac{x}{r}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{r}\frac{\partial}{\partial y} \quad (15.7)$$

unde  $r$  este raza polară:  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

**Rezolvare**  $\nabla_X Y = X(Y^1)\frac{\partial}{\partial x} + X(Y^2)\frac{\partial}{\partial y}$ . Avem:

$$X(Y^1) = X\left(\frac{x}{r}\right) = -y\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right) + x\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{r}\right) = -\frac{y}{r}, \quad X(Y^2) = X\left(\frac{y}{r}\right) = \frac{x}{r}$$

de unde rezultă:  $\nabla_X Y = \frac{1}{r}X$ . Analog:  $\nabla_Y X = Y(X^1)\frac{\partial}{\partial x} + Y(X^2)\frac{\partial}{\partial y}$  cu:

$$Y(X^1) = -\frac{y}{r}, \quad Y(X^2) = \frac{x}{r}$$

ceea ce dă:  $\nabla_Y X = \frac{1}{r}X$ .

**S15.4** .

**Rezolvare** .

**S15.5** .

**Rezolvare** .

**S15.6** .

**Rezolvare** .

**S15.7** .

**Rezolvare** .

## Cursul 16

# Torsiunea și curbura unei conexiuni liniare

Fixăm conexiunea liniară  $\nabla$  pe varietatea netedă  $M^n$ . Introducem două câmpuri tensoriale remarcabile asociate lui  $\nabla$ :

**Propoziția 16.1** Aplicația  $T : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$  dată de:

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] \quad (16.1)$$

este un câmp tensorial de tip  $(1, 2)$  pe  $M$ .

**Demonstrația** Trebuie verificată  $C^\infty(M)$ -bilinearitatea lui  $T$ . Dar observăm că  $T$  este antisimetrică:

$$T(X, Y) = -T(Y, X) \quad (16.2)$$

și prin urmare e suficient de arătat  $C^\infty(M)$ -liniaritatea în al doilea argument:

$$T(X, fY) = \nabla_X(fY) - \nabla_{fY}X - [X, fY] = X(f)Y + f\nabla_X Y - f\nabla_Y X - X(f)Y - f[X, Y] = fT(X, Y) \quad (16.3)$$

și deci avem concluzia cerută.  $\square$

**Definiția 16.2** Câmpul tensorial  $T \in \mathcal{T}_2^1(M)$  se numește *câmpul tensorial de torsiune* al lui  $\nabla$ . Pe scurt, îl numim *torsiunea* lui  $\nabla$ .

Pentru expresia locală a lui  $T$  fie harta locală  $h = (U, x^1, \dots, x^n)$  în care  $\nabla$  are coeficienții de conexiune  $\Gamma_{ij}^k$ . Componentele lui  $T$  în această hartă le notăm:

$$T\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = T_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} \quad (16.4)$$

astfel că pentru  $X, Y \in \mathcal{X}(M)$  cu expresiile  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ ,  $Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j}$  avem:

$$T(X, Y) = T_{ij}^k X^i Y^j \frac{\partial}{\partial x^k}. \quad (16.5)$$

Funcțiile  $T_{ij}^k$  sunt netede i.e.  $T_{ij}^k \in C^\infty(U)$  pentru orice  $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$ . Expresia lor rezultă imediat din:

$$T_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^i} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^i} - \left[ \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} - \Gamma_{ji}^k \frac{\partial}{\partial x^k} - 0 = \left( \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k \right) \frac{\partial}{\partial x^k}$$

ceea ce dă:

$$T_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k. \quad (16.6)$$

Această expresie conduce la următorul tip de conexiune liniară:

**Definiția 16.3**  $\nabla$  se numește *conexiune simetrică* dacă  $T = 0$  i.e.  $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ .

Având expresia locală (16.6) putem proba caracterul tensorial al lui  $T$  și prin comportarea la schimbări de hărți locale  $(U, x^a) \rightarrow (\tilde{U}, \tilde{x}^i)$  de forma:

$$\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^1, \dots, x^n) = \tilde{x}^i(x^a) \quad (16.7)$$

cu rangul matricii Jacobiene  $rank \left( \frac{\tilde{x}^i}{x^a} \right) = n$  ceea ce implică existența funcțiilor inverse:

$$x^a = x^a(\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^n) = x^a(\tilde{x}^i). \quad (16.8)$$

Schimbarea bazei canonice a lui  $\mathcal{X}(U)$ ,  $\frac{\partial}{\partial x^a} \rightarrow \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}$  este:

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i} = \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial}{\partial x^a} \quad (16.9)$$

deoarece  $\frac{\partial}{\partial x^a}$  sunt componentele unui câmp vectorial=câmp tensorial de tip  $(1,0)$ . Pentru schimbarea coeficienților de conexiune avem:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j} = \tilde{\Gamma}_{ij}^k \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^k} = \tilde{\Gamma}_{ij}^k \frac{\partial x^c}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial}{\partial x^c} \quad (16.10)$$

cu:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j} = \nabla_{\frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i}} \left( \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial}{\partial x^b} \right) = \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \left[ \frac{\partial^2 x^b}{\partial \tilde{x}^j \partial x^a} \frac{\partial}{\partial x^b} + \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \Gamma_{ab}^c \right] = \left( \frac{\partial^2 x^c}{\partial \tilde{x}^i \partial \tilde{x}^j} + \Gamma_{ab}^c \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^c}. \quad (16.11)$$

Comparând ultimele două relații avem formula de schimbare a coeficienților de conexiune la o schimbare de hărți:

$$\tilde{\Gamma}_{ij}^k \frac{\partial x^c}{\partial \tilde{x}^k} = \frac{\partial^2 x^c}{\partial \tilde{x}^i \partial \tilde{x}^j} + \Gamma_{ab}^c \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \quad (16.12)$$

iar prezența derivatei parțiale de ordinul doi din membrul drept arată faptul că  $\nabla$  nu este câmp tensorial de tip  $(1,2)$  așa cum s-a remarcat în Observația 15.2b)! În schimb, prin scăderea a două relații (16.12) cu a doua având rolul  $i \leftrightarrow j$  obținem:

$$\tilde{T}_{ij}^k \frac{\partial x^c}{\partial \tilde{x}^k} = \Gamma_{ab}^c \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} - \Gamma_{ab}^c \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^i}. \quad (16.13)$$

În ultimul termen din membrul stâng facem  $a \leftrightarrow b$  și rezultă:

$$\tilde{T}_{ij}^k \frac{\partial x^c}{\partial \tilde{x}^k} = T_{ab}^c \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \quad (16.14)$$

sau încă:

$$\tilde{T}_{ij}^k = \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^c} \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^i} \frac{\partial x^b}{\partial \tilde{x}^j} \quad (16.15)$$

ceea ce probează caracterul tensorial de tip  $(1,2)$  al lui  $T$ !

**Propoziția 16.4** Pe varietatea  $M$  există conexiuni liniare simetrice.

**Demonstrație** Am arătat în Cursul precedent că pe  $M$  există măcar o conexiune liniară  $\nabla$ . Fie atunci aplicația  $\tilde{\nabla} : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$  dată de:

$$\tilde{\nabla} := \nabla - \frac{1}{2}T \quad (16.16)$$

cu  $T$  torsiunea lui  $\nabla$ . Un calcul imediat arată că și  $\tilde{\nabla}$  este conexiune liniară. Vrem torsiunea sa:

$$\tilde{T}(X, Y) = \nabla_X Y - \frac{1}{2}(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]) - \nabla_Y X + \frac{1}{2}(\nabla_Y X - \nabla_X Y - [Y, X]) - [X, Y] = 0$$

ceea ce dă concluzia. De altfel, putem calcula coeficienții conexiunii  $\tilde{\nabla}$ :

$$\tilde{\Gamma}_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} = \tilde{\nabla} \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} = \nabla \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} - T\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \left(\Gamma_{ij}^k - \frac{1}{2}T_{ij}^k\right) \frac{\partial}{\partial x^k}$$

și deci:

$$\tilde{T}_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \frac{1}{2}(\Gamma_{ij}^k + \Gamma_{ji}^k) = \frac{1}{2}(\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k) \quad (16.17)$$

ceea ce arată din nou simetria lui  $\tilde{\nabla}$ .  $\square$

Inspirați de formula (16.16) ne punem problema generală diferenței a două conexiuni liniare:

**Propoziția 16.5** i) Fie  $\nabla$  și  $\tilde{\nabla}$  două conexiuni liniare pe  $M$ . Atunci  $A = \tilde{\nabla} - \nabla$  este un câmp tensorial de tip  $(1, 2)$  pe  $M$ .

ii) Reciproc, dacă  $\nabla$  este o conexiune liniară și  $A \in \mathcal{T}_2^1(M)$  atunci  $\tilde{\nabla} = \nabla + A$  este tot o conexiune liniară.

**Demonstrație** i) Trebuie verificată  $C^\infty(M)$ -biliniaritatea lui  $A$ . Avem:

$$\begin{cases} A(fX, Y) = \tilde{\nabla}_{fX} Y - \nabla_{fX} Y = f\tilde{\nabla}_X Y - f\nabla_X Y = fA(X, Y) \\ A(X, fY) = \tilde{\nabla}_X(fY) - \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y - X(f)Y - f\nabla_X Y = fA(X, Y). \end{cases}$$

ii) Se verifică imediat definiția din Cursul precedent.  $\square$

Introducem acum al doilea câmp tensorial anunțat:

**Propoziția 16.6** Aplicația  $R : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$  dată de:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z \quad (16.18)$$

este un câmp tensorial de tip  $(1, 3)$  pe  $M$ .

**Demonstrație** Trebuie verificată  $C^\infty(M)$ -liniaritatea în cele trei argumente. Avem antisimetria în primele două:

$$R(X, Y) \cdot = -R(Y, X) \cdot \quad (16.19)$$

deci e suficient de verificat  $C^\infty(M)$ -liniaritatea în ultimele două argumente.

$$R(X, fY)Z = \nabla_X(f\nabla_Y Z) - f\nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{X(f)Y + f[X, Y]} Z = X(f)\nabla_Y Z + fR(X, Y)Z - X(f)\nabla_Y Z$$

și la fel  $R(X, Y)fZ = fR(X, Y)Z$ .  $\square$

**Definiția 16.7** Câmpul tensorial  $R \in \mathcal{T}_3^1(M)$  se numește *câmpul tensorial de curbura* al lui  $\nabla$ . Pe scurt, îl numim *curbura* lui  $\nabla$ . Dacă  $R = 0$  spunem că  $\nabla$  este o *conexiune plată*.

Expresia locală a lui  $R$  este:

$$R \left( \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^k} = R_{ijk}^a \frac{\partial}{\partial x^a} \quad (16.19)$$

și deci pentru câmpurile vectoriale  $X, Y, Z = Z^k \frac{\partial}{\partial x^k}$  avem:

$$R(X, Y)Z = R_{ijk}^a X^i Y^j Z^k \frac{\partial}{\partial x^a}. \quad (16.20)$$

Funcțiile  $R_{ijk}^a$  sunt netede pe  $U$  și se determină din:

$$R_{ijk}^a \frac{\partial}{\partial x^a} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left( \Gamma_{jk}^u \frac{\partial}{\partial x^u} \right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \left( \Gamma_{ik}^u \frac{\partial}{\partial x^u} \right) = \left( \frac{\partial \Gamma_{jk}^a}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{ik}^a}{\partial x^j} + \Gamma_{jk}^u \Gamma_{iu}^a - \Gamma_{ik}^u \Gamma_{ju}^a \right) \frac{\partial}{\partial x^a}$$

adică:

$$R_{ijk}^a = \frac{\partial \Gamma_{jk}^a}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{ik}^a}{\partial x^j} + \Gamma_{jk}^u \Gamma_{iu}^a - \Gamma_{ik}^u \Gamma_{ju}^a. \quad (16.21)$$

Pentru a avea exmple de conexiuni plate introducem următorul tip de varietate:

**Definiția 16.8**  $M$  se numește *varietate paralelizabilă* dacă există  $n$  câmpuri vectoriale  $X_1, \dots, X_n$  așa încât pentru orice  $p \in M$  avem  $T_p M = \text{span}\{X_1(p), \dots, X_n(p)\}$  i.e.  $\{X_1(p), \dots, X_n(p)\}$  este bază în  $T_p M$ .

- Exemple 16.9** i)  $M = S^1$  cu  $X$ =câmpul vectorial tangent (unitar).  
 ii) Produsul de varietăți paralelizabile este varietate paralelizabilă. În particular, torul  $T^n = S^1 \times \dots \times S^1$  ( $n$  factori) este paralelizabil.  
 iii) Singurele sfere paralelizabile sunt  $S^0, S^1, S^3$  și  $S^7$  ce corespund mulțimii elementelor unitare în algebrele reale normate cu diviziune:  $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ =algebra cuaternionilor,  $\mathbb{O}$ =algebra octonionilor.  
 iv) Orice varietate 3-dimensională *orientabilă* este paralelizabilă.

**Propoziția 16.10** Dacă  $M$  este paralelizabilă atunci există pe  $M$  conexiuni plate.

**Demonstrație** Fie  $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}(M)$  date de definiție. Cosniderăm  $\nabla^{par}$  cu  $\nabla_{X_i}^{par} X_j = 0$  și extinsă apoi prin  $C^\infty(M)$ -liniaritate:

$$\nabla_{X=f^i X_i}^{par} (Y = g^j X_j) = X(g^j) X_j. \quad (16.22)$$

Se arată imediat că  $\nabla^{par}$  este conexiune liniară pe  $M$ ; se poate considera fiind analogă conexiunii euclidiene de pe  $\mathbb{R}^n$ . Cum  $R$  este câmp tensorial este suficient să arătăm că se anulează pe baza dată:

$$R(X_i, X_j)X_k = -\nabla_{[X_i, X_j]} X_k.$$

Dar  $[X_i, X_j]$  se descompune în această bază și deci  $[X_i, X_j] = C_{ij}^u X_u$  ceea ce conduce la  $R(X_i, X_j)X_k = 0$ .  $\square$

În ultima parte a acestui Curs extindem derivata covariantă indusă de  $\nabla$  pe toată algebra tensorială a lui  $M$ :

1) pe funcții netede,  $\nabla : \mathcal{X}(M) \times C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ ,  $(X, f) \rightarrow X(f)$ ; local  $X(F) = X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$

și observăm că această extindere este universală adică nu depinde de  $\nabla$ ,

2) pe 1-forme,  $\nabla : \mathcal{X}(M) \times \Omega^1(M) \rightarrow \Omega^1(M)$ ,  $(X, \theta) \rightarrow \nabla_X \theta$ . Deci pentru  $Y \in \mathcal{X}(M)$  avem  $(\nabla_X \theta)(Y) \in C^\infty(M)$  și vrem ca să avem identitatea Leibniz:

$$\nabla_X(\theta(Y)) = (\nabla_X \theta)(Y) + \theta(\nabla_X Y) \quad (16.23)$$

ceea ce conduce la definiția:

$$(\nabla_X \theta)(Y) := \nabla_X(\theta(Y)) - \theta(\nabla_X Y). \quad (16.24)$$

3) pe câmpuri tensoriale de tip  $(1, k)$  cu  $k \geq 1$ ,  $\nabla : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{T}_k^1(M) \rightarrow \mathcal{T}_k^1(M)$ ,  $(X, J) \rightarrow \nabla_X J$  cu acțiunea pe  $k$  câmpuri vectoriale:

$$(\nabla_X J)(X_1, \dots, X_k) = \nabla_X(J(X_1, \dots, X_k)) - \sum_{i=1}^k J(\dots \nabla_X X_i \dots). \quad (16.25)$$

În particular, pentru  $k = 1$  avem:

$$(\nabla_X J)Y = \nabla_X(J(Y)) - J(\nabla_X Y). \quad (16.26)$$

4) pentru câmpuri tensoriale de tip  $(0, k)$ ,  $\nabla : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{T}_k^0(M) \rightarrow \mathcal{T}_k^0(M)$ ,  $(X, g) \rightarrow \nabla_X g$  cu acțiunea pe  $k$  câmpuri vectoriale:

$$(\nabla_X g)(X_1, \dots, X_k) = X(g(X_1, \dots, X_k)) - \sum_{i=1}^k g(\dots \nabla_X X_i \dots). \quad (16.27)$$

În particular, pentru  $k = 2$  avem:

$$(\nabla_X g)(Y, Z) = X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z). \quad (16.28)$$

## SEMINAR 16

**S16.1** Considerăm conexiunea liniară  $\nabla$  și fie  $\{E_1, \dots, E_n\}$  o bază locală lui  $\mathcal{X}(M)$  pe deschisul  $U \subseteq M$ . Fie  $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$  co-baza duală i.e.  $\omega^i(E_j) = \delta_j^i$ . Dacă  $X, Y \in \mathcal{X}(U)$  atunci definim:

$$\nabla_X E_j = \omega_j^i(X)E_i, \quad T(X, Y) = T^i(X, Y)E_i, \quad R(X, Y)E_i = R_i^j(X, Y)E_j. \quad (16.29)$$

Să se arate că:

- i)  $\omega_j^i$  sunt 1-forme, numite *formele de conexiune* ale lui  $\nabla$  pe  $U$ ,
- ii)  $T^i$  sunt 2-forme, numite *formele de torsiune* ale lui  $\nabla$  pe  $U$ ,
- iii)  $R_i^j$  sunt 2-forme, numite *formele de curbură* ale lui  $\nabla$  pe  $U$ ,
- iv) toate aceste 1 și 2-forme satisfac *ecuațiile de structură* ale lui Cartan:

$$d\omega^i + \omega_k^i \wedge \omega^k = \frac{1}{2}T^i, \quad d\omega_j^i + \omega_k^i \wedge \omega_j^k = \frac{1}{2}R_j^i. \quad (16.30)$$

Se cere torsiunea pe baza dată  $\{E_i\}$  în funcție de constantele de structură  $\{c_{ij}^k\} \in C^\infty(U)$  date de:  $[E_i, E_j] = c_{ij}^k E_k$ .

**Rezolvare** Verificări imediate. Din:  $\nabla_{E_i} E_j = \omega_j^k(E_i) E_k$  rezultă:

$$T^k(E_i, E_j) = \omega_j^k(E_i) - \omega_i^k(E_j) - c_{ij}^k \quad (16.31)$$

relația cerută pentru torsiune.

**S16.2** În ipotezele problemei precedente presupunem că  $\nabla$  este simetrică. Să se arate că pentru orice  $\theta \in \Omega^1(M)$  avem:

$$d\theta = \frac{1}{2} \omega^k \wedge \nabla_{E_k} \theta \quad (16.32)$$

deci putem exprima diferențiala exterioară cu ajutorul unei conexiuni simetrice date.

**Rezolvare** Presupunem  $\theta = \theta^u E_u$ . Avem:

$$(\nabla_{E_i} \theta)(E_j) = E_i(\theta_j) - \omega_j^u(E_i) \theta_u \quad (16.33)$$

și deci:

$$(\omega^k \wedge \nabla_{E_k} \theta)(E_i, E_j) = (\nabla_{E_i} \theta)(E_j) - (\nabla_{E_j} \theta)(E_i) = E_i(\theta_j) - E_j(\theta_i) - (\omega_j^u(E_i) - \omega_i^u(E_j)) \theta_u.$$

Din (16.31) rezultă că ultima paranteză din membrul drept este  $c_{ij}^u$ . Avem și:

$$2d\theta(E_i, E_j) = E_i(\theta_j) - E_j(\theta_i) - c_{ij}^u \theta_u \quad (16.34)$$

de unde rezultă (16.32).

**S16.3** Fie  $f, g \in C^\infty(M)$  și conexiunile liniare  $\nabla$  și  $\bar{\nabla}$ . Atunci  $\tilde{\nabla} := f\nabla + g\bar{\nabla}$  este conexiune liniară dacă și numai dacă  $f + g = 1$ .

**Rezolvare** Verificări imediate.

**S16.4** Dacă  $g \in \mathcal{T}_2^0(M)$  este o metrică Riemanniană atunci conexiunea Levi-Cita este dată global prin *formula Koszul*:

$$2g(\nabla_X Y, Z) = X(g(Y, Z)) + Y(g(Z, X)) - Z(g(X, Y)) + g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) + g([Z, X], Y). \quad (16.35)$$

Caz particular:  $\{E_1, \dots, E_n\}$  este o bază locală ortonormată.

**Rezolvare** Procedeul Christoffel. Pentru cazul particular dat avem:

$$2g(\nabla_{E_i} E_j, E_k) = c_{ij}^k - c_{jk}^i + c_{ki}^j \quad (16.36)$$

unde  $\{c_{ab}^u\}$  sunt constantele de structură.

**S16.5** .

**Rezolvare** .

**S16.6** .

**Rezolvare** .

**S16.7** .

**Rezolvare** .



## Cursul 17

# Formule Ricci de comutare

Fixăm conexiunea liniară  $\nabla$  și câmpul vectorial  $Z \in \mathcal{X}(M)$ . Avem atunci derivata covariantă  $\nabla Z \in \mathcal{T}_1^1(M)$  definită prin  $\nabla Z : \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$ :

$$X \rightarrow (\nabla Z)(X) := \nabla_X Z \quad (17.1)$$

Continuăm încă un pas de aplicare a lui  $\nabla$  și obținem  $\nabla(\nabla Z) = \nabla^2 Z \in \mathcal{T}_2^1(M)$ :

$$(X, Y) \rightarrow \nabla^2 Z(X, Y) := (\nabla_X(\nabla Z))(Y) = \nabla_X((\nabla Z)Y) - (\nabla Z)(\nabla_X Y). \quad (17.2)$$

Evident procesul se poate continua dar apar complicații mari de calcul. *Formulele Ricci de comutare* au ca obiect comutativitatea câmpului tensorial  $\nabla^2 Z$ :

**Propoziția 17.1** *Avem formula Ricci de comutare:*

$$(\nabla^2 Z)(X, Y) - (\nabla^2 Z)(Y, X) = R(X, Y)Z - \nabla_{T(X, Y)} Z. \quad (17.3)$$

În particular, pentru  $\nabla$  conexiune simetrică avem:

$$(\nabla^2 Z)(X, Y) - (\nabla^2 Z)(Y, X) = R(X, Y)Z. \quad (17.4)$$

**Demonstrație** Din (17.2) rezultă formula completă a derivatei covariante de ordinul doi:

$$(\nabla^2 Z)(X, Y) = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_{\nabla_X Y} Z \quad (17.5)$$

și deci:

$$(\nabla^2 Z)(X, Y) - (\nabla^2 Z)(Y, X) = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_{\nabla_X Y} Z - \nabla_Y \nabla_X Z + \nabla_{\nabla_Y X} Z = R(X, Y)Z - \nabla_{T(X, Y)} Z$$

ceea ce dă concluzia.  $\square$

Să exprimăm local formula (17.3). Fie harta locală  $h = (U, x^1, \dots, x^n)$  și expresia locală a câmpurilor date:  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ ,  $Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j}$ ,  $Z = Z^k \frac{\partial}{\partial x^k}$ . Conform relației (15.3) avem că  $\nabla Z = Z^k_{;a} dx^a \otimes \frac{\partial}{\partial x^k}$  și deci  $\nabla^2 Z = Y^k_{;ab} dx^a \otimes dx^b \otimes \frac{\partial}{\partial x^k}$  unde:

$$Z^k_{;ab} \frac{\partial}{\partial x^k} = (\nabla^2 Z) \left( \frac{\partial}{\partial x^a}, \frac{\partial}{\partial x^b} \right). \quad (17.6)$$

Cu formula (17.2) rezultă:

$$Z^k_{;ab} \frac{\partial}{\partial x^k} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^a}} \left( \nabla Z \left( \frac{\partial}{\partial x^b} \right) \right) - \nabla Z \left( \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^a}} \frac{\partial}{\partial x^b} \right) = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^a}} \left( Z^k_{;b} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) - \nabla Z \left( \Gamma_{ab}^u \frac{\partial}{\partial x^u} \right) = \left( Z^k_{;b;a} - \Gamma_{ab}^u Z^k_{;u} \right) \frac{\partial}{\partial x^k}$$

de unde avem:

$$Z^k_{;ab} = Z^k_{;b;a} - \Gamma_{ab}^u Z^k_{;u}. \quad (17.7)$$

Prin urmare, avem diferența:

$$Z^k_{;ab} - Z^k_{;ba} = Z^k_{;b;a} - Z^k_{;a;b} - (\Gamma_{ab}^u - \Gamma_{ba}^u) Z^k_{;u}.$$

Dar diferența primilor doi termeni din membrul drept este  $R^k_{abu} Z^u$  și în concluzie avem exprimarea locală formulei Ricci de comutare:

$$Z^k_{;ab} - Z^k_{;ba} = R^k_{abu} Z^u - T_{ab}^u Z^k_{;u} \quad (17.8)$$

respectiv formula derivatei covariante de ordinul doi:

$$(\nabla^2 Z)(X, Y) = Z^k_{;ij} X^i Y^j \frac{\partial}{\partial x^k}. \quad (17.9)$$

Pentru conexiune simetrică avem cazul particular al formulei (17.8):

$$Z^k_{;ab} - Z^k_{;ba} = R^k_{abu} Z^u. \quad (17.10)$$

Încheiem acest Curs cu identitățile Bianchi. Acestea sunt valabile pentru orice conexiune dar pe acest caz general au o expresie complicată și de aceea vom considera doar  $\nabla$  simetrică:

**Propoziția 17.2** *Identitățile Bianchi pentru conexiunea simetrică  $\nabla$  sunt:*

$$\begin{cases} \sum_{cyclic} R(X, Y)Z := R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0 \\ \sum_{cyclic} (\nabla_X R)(Y, Z) \cdot := (\nabla_X R)(Y, Z) \cdot + (\nabla_Y R)(Z, X) \cdot + (\nabla_Z R)(X, Y) \cdot = 0. \end{cases} \quad (17.11)$$

**Demonstrație** i) În identitatea dată de anularea torsionii:

$$\nabla_Y Z - \nabla_Z Y = [Y, Z] \quad (17.12)$$

aplicăm  $\nabla_X$  și avem:

$$\nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_X \nabla_Z Y = \nabla_X [Y, Z]. \quad (17.13)$$

Sumăm ciclic această relație și obținem:

$$\sum_{cyclic} (R(X, Y)Z + \nabla_{[X, Y]} Z) = \sum_{cyclic} \nabla_Z [X, Y] \quad (17.14)$$

adică:

$$\sum_{cyclic} R(X, Y)Z = \sum_{cyclic} (\nabla_Z [X, Y] - \nabla_{[X, Y]} Z)$$

dar termenul din membrul drept este, aplicând (17.12), egal cu  $[Z, [X, Y]]$ . Prin urmare:

$$\sum_{cyclic} R(X, Y)Z = \sum_{cyclic} [Z, [X, Y]] = 0$$

datorită identității Jacobi în algebra Lie  $\mathcal{X}(M)$ .

ii) Derivata covariantă a câmpului tensorial de curbura  $R \in \mathcal{T}_3^1(M)$  este:

$$(\nabla_X R)(Y, Z)W := \nabla_X(R(Y, Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y, Z)\nabla_X W \quad (17.15)$$

și după modelul anterior se ajunge din nou la identitatea Jacobi.  $\square$

Expresia locală a identităților Bianchi este:

$$\begin{cases} R_{ijk}^a + R_{jki}^a + R_{kij}^a = 0 \\ R_{ijl;k}^a + R_{jkl;i}^a + R_{kil;j}^a = 0. \end{cases} \quad (17.16)$$

## SEMINAR 17

**S17.1** Fie conexiunile liniare  $\nabla, \tilde{\nabla}$  și câmpul tensorial diferență  $A := \tilde{\nabla} - \nabla \in \mathcal{T}_2^1(M)$ . Se cer diferențele:

i)  $\tilde{T} - T$ . Drept consecință a rezultatului i) se cere mulțimea conexiunilor  $\tilde{\nabla}$  ce au aceeași torsiune cu  $\nabla$ .

ii)  $\tilde{R} - R$  când  $T = 0$ . Caz particular:  $A$  este câmp tensorial paralel în raport cu  $\nabla$  i.e.  $\nabla A = 0$ .

**Rezolvare** i) Avem imediat:

$$(\tilde{T} - T)(X, Y) = \tilde{\nabla}_X Y - \tilde{\nabla}_Y X - \nabla_X Y + \nabla_Y X = A(X, Y) - A(Y, X). \quad (17.17)$$

Mulțimea cerută este mulțimea conexiunilor  $\tilde{\nabla}$  având pe  $A$  ca tensor simetric:  $A(X, Y) = A(Y, X)$  pentru orice  $X, Y \in \mathcal{X}(M)$ . ii) Avem:

$$\tilde{R}(X, Y)Z = \tilde{\nabla}_X(\nabla_Y Z + A(Y, Z)) - \tilde{\nabla}_Y(\nabla_X Z + A(X, Z)) - \nabla_{[X, Y]}Z - A([X, Y], Z)$$

adică:

$$\begin{aligned} (\tilde{R} - R)(X, Y)Z &= A(X, \nabla_Y Z) + \nabla_X A(Y, Z) + A(X, A(Y, Z)) - A(Y, \nabla_X Z) - \nabla_Y A(X, Z) - A(Y, A(X, Z)) - \\ &- A(\nabla_X Y, Z) + A(\nabla_Y X, Z) = (\nabla_X A)(Y, Z) - (\nabla_Y A)(X, Z) + A(X, A(Y, Z)) - A(Y, A(X, Z)). \end{aligned} \quad (17.18)$$

Dacă  $A$  este câmp tensorial paralel relativ la  $\nabla$  atunci:

$$(\tilde{R} - R)(X, Y)A = A(X, A(Y, Z)) - A(Y, A(X, Z)) \quad (17.19)$$

și deci, în aceste condiții avem  $\tilde{R} = R$  dacă și numai dacă  $A$  satisface "comutativitatea":  $A(X, A(Y, Z)) = A(Y, A(X, Z))$  pentru orice  $X, Y, Z \in \mathcal{X}(M)$ .

**S17.2** Fie conexiunea liniară  $\nabla$  având torsiunea  $T$ . Se definesc aplicațiile  $\nabla^t, \nabla^s : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$  prin:

$$\nabla_X^t Y := \nabla_Y X + [X, Y], \quad \nabla^s := \frac{1}{2}(\nabla + \nabla^t). \quad (17.20)$$

Se cere:

i) Arătați că  $\nabla^t$  și  $\nabla^s$  sunt conexiuni liniare.  $\nabla^t$  se numește *transpusa lui*  $\nabla$  iar  $\nabla^s$  se cheamă

conexiunea simetrică asociată lui  $\nabla$ ,

ii) torsiunile  $T^t$  și  $T^s$  respectiv  $(\nabla^t)^t$ ,

iii) să se arate că  $\nabla^t = \nabla$  (deci avem și  $\nabla^s = \nabla$ ) dacă și numai dacă  $T = 0$  i.e. conexiunea inițială este simetrică.

**Rezolvare** i) Se verifică imediat definiția pentru  $\nabla^t$ . Pentru  $\nabla^s$  aplicăm exercițiul S15.2i).  
ii)  $T^t(X, Y) = \nabla_X^t Y - \nabla_Y^t X - [X, Y] = \nabla_Y X - \nabla_Y^t X = \nabla_Y X - (\nabla_X Y + [X, Y]) = -T(X, Y)$ .  
Pentru  $\nabla^s$  avem:

$$T^s(X, Y) = \frac{1}{2} (\nabla_X Y + \nabla_X^t Y - \nabla_Y X - \nabla_Y^t X - [X, Y] - [X, Y]) = \frac{1}{2} (T + T^t)(X, Y) = 0$$

ceea ce justifică numele. Avem:  $(\nabla^t)^t X = \nabla_Y^t X + [X, Y] = (\nabla_X Y + [Y, X]) + [X, Y] = \nabla_X Y$ , deci  $(\nabla^t)^t = \nabla$ .

iii) Dacă  $\nabla^t = \nabla$  rezultă  $\nabla_Y X + [X, Y] = \nabla_X Y$  adică  $T = 0$ . Reciproc, din  $T = 0$  scriind relația precedentă rezultă  $\nabla = \nabla^t$ .

**S17.3** Pe varietatea  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0\}$  se consideră conexiunea  $\nabla$  având nenuli doar coeficienții:  $\Gamma_{11}^1 = -\frac{1}{x}$ ,  $\Gamma_{22}^2 = -\frac{1}{y}$ . Fie câmpurile vectoriale  $X = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}$ ,  $Y = y \frac{\partial}{\partial x}$  și 1-forma  $\omega = -y dx$ . Se cer:

i)  $\nabla_X Y$ ,  $\nabla_Y X$ ,  $\nabla_X \omega$ ,  $\nabla_Y \omega$ ,

ii) torsiunea și curbura lui  $\nabla$ .

**Rezolvare** i) Avem:

$$\nabla_X Y = x \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} Y - y \nabla_{\frac{\partial}{\partial y}} Y = x \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} (y \frac{\partial}{\partial x}) - y \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} (y \frac{\partial}{\partial x}) = x (\Gamma_{11}^1 y) \frac{\partial}{\partial x} - y (\frac{\partial}{\partial x}) = -y \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial x} = -2Y$$

$$\nabla_Y X = y \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} (x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}) = y \nabla_{\frac{\partial}{\partial x}} (x \frac{\partial}{\partial x}) = y (\frac{\partial}{\partial x} + \Gamma_{11}^1 \frac{\partial}{\partial x}) = y (\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}) = 0.$$

Formula pentru derivata covariantă pe 1-forme este:

$$\nabla_X \omega = \omega_{;k} dx^k = (X(\omega_k) - \Gamma_{ik}^a X^i \omega_a) dx^k \quad (17.21)$$

și deci:

$$\nabla_X (-y dx) = (X(-y) + \Gamma_{i1}^1 X^i y) dx = (y - \frac{1}{x} xy) dx = 0, \nabla_Y (-y dx) = (Y(-y) + \Gamma_{i1}^1 Y^i y) dx = -\frac{y^2}{x^2} dx.$$

ii) Torsiunea este anti-simetrică și deci:  $T_{ii}^a = 0$ . Pentru  $i \neq j$  avem  $T_{ij}^a = 0$  deoarece  $\Gamma_{ij}^a = 0$ . Analog  $R = 0$ .

**S17.4** Se cere torsiunea și curbura în dimensiune  $n = 1$ .

**Rezolvare** Deoarece  $n = 1$  singura componentă a torsiunii este  $T_{11}^1 = -T_{11}^1$  ceea ce implică  $T_{11}^1 = 0$ . Analog, singura componentă a curburii este  $R_{111}^1$  dar  $R_{111}^1 = -R_{111}^1$  de unde obținem:  $R_{111}^1 = 0$ . Deci torsiunea și curbura sunt nule.

**S17.5** Se consideră varietatea paralelizabilă  $M^n$  cu  $n \geq 2$  și o bază  $\{E_1, \dots, E_n\}$  a lui  $\mathcal{X}(M)$  ce dă paralelizarea. Se definesc aplicațiile  $\nabla^+, \nabla^0 : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$  date pe bază prin:

$$\nabla_{E_i}^+ E_j := [E_i, E_j], \quad \nabla_{E_i}^0 E_j := \frac{1}{2} [E_i, E_j]$$

ce se extind prin  $C^\infty(M)$ -liniaritate la conexiuni liniare. Se cere expresia acestor conexiuni liniare, torsiunile lor și conexiunea simetrică asociată.

**Rezolvare** Avem:

$$\begin{cases} \nabla_X^+ Y = \nabla_{X^i E_i} (Y^j E_j) = X^i \nabla_{E_i} (Y^j E_j) = X^i (X(Y^j) E_j + Y^j [E_i, E_j]) \\ \nabla_X^0 Y = X^i \nabla_{E_i} (Y^j E_j) = X^i (X(Y^j) E_j + \frac{1}{2} Y^j [E_i, E_j]). \end{cases} \quad (17.22)$$

Pe bază dată avem:

$$T^+(E_i, E_j) = [E_i, E_j], \quad T^0(E_i, E_j) = 0$$

și deci  $\nabla^0$  este simetrică iar  $T^+(X, Y) = X^i Y^j [E_i, E_j]$ . Cele două conexiuni au aceeași conexiune simetrică asociată:

$$\nabla_X^{+s} Y = \nabla_X^{0s} Y = \frac{1}{2} (X(Y^i) E_i + Y(X^i) E_i + [X, Y]). \quad (17.23)$$

**S17.6** Fie  $\{E_1, E_2, E_3\}$  sistemul de câmpuri vectoriale ce paralelizează  $\mathbb{R}^3$  și aplicația produs vectorial  $\times : \mathcal{X}(\mathbb{R}^3) \times \mathcal{X}(\mathbb{R}^3) : X \times Y = \sum_{i=1}^3 (X^{i+1} Y^{i+2} - X^{i+2} Y^{i+1}) E_i$  dacă  $X = X^i E_i, Y = Y^j E_j$  și indicii de sumare sunt considerați modulo 3.

i) Să se arate că  $\times \in \mathcal{T}_2^1(\mathbb{R}^3)$ ,

ii) Fie  $D$  conexiunea euclidiană pe  $\mathbb{R}^3$ :  $D_X Y = X(Y^j) E_j$  și  $\nabla = D + \frac{1}{2} \times$ . Să se arate că această conexiune are:

$$T = \times, \quad R(X, Y)Z = \frac{1}{4} (X \times Y) \times Z. \quad (17.24)$$

**Rezolvare** i)  $T(X, Y) = D_X Y - D_Y X - [X, Y] + \frac{1}{2} (X \times Y - Y \times X) = X \times Y$  deoarece  $D$  este simetrică. ii)  $R(X, Y)Z = \frac{1}{2} (D_X Y \times Z - D_Y X \times Z) + \frac{1}{4} (X \times (Y \times Z) - Y \times (X \times Z))$  și avem formula dublului produs vectorial:  $a \times (b \times c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$ .



## Cursul 18

# Seminar 8 (2021): Varietăți diferențiabile

### SEMINAR 8

**S8.1** Fie  $M$  o varietate diferențiabilă de dimensiune  $n \geq 1$  și  $D$  un deschis (nevid) din  $M$ . Atunci  $D$  este varietate diferențiabilă de aceeași dimensiune  $n$ . Prin urmare, *discul  $n$ -dimensional de rază  $R > 0$*  i.e.  $D^n(R) := \{x \in \mathbb{R}^n; \|x\|_n < R\}$  este varietate  $n$ -dimensională.

**Observație** Un alt deschis din  $\mathbb{R}^n$  ce este util uneori este  $\mathbb{R}^n \setminus \{O\}$  care pentru  $n = 2$  se numește *planul punctat*.  $\square$

**S8.2** Fixăm  $n \in \mathbb{N}^*$  și *sfera*  $S^n := \{\xi = (\xi^1, \dots, \xi^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \|\xi\|_{n+1}^2 := (\xi^1)^2 + \dots + (\xi^{n+1})^2 = 1\}$ . Să se arate că  $S^n$  cu topologia indusă din spațiul ambient  $\mathbb{R}^{n+1}$  este varietate diferențiabilă de dimensiune  $n$  construind un atlas cu  $2(n+1)$  hărți. Din acest moment  $S^n$  se va numi *sfera (unitate)  $n$ -dimensională*. Frontiera lui  $D^n(R)$  i.e.  $S^n(R)$  este de asemenea varietate  $n$ -dimensională.

**Rezolvare** Fixăm un indice  $i \in \{1, \dots, n+1\}$  și definim  $U_i^+ := \{\xi \in S^n; \xi^i > 0\}$ ,  $U_i^- := \{\xi \in S^n; \xi^i < 0\}$ . Fiind definite prin inegalități ambele mulțimi  $U_i^\pm$  sunt deschise în  $\mathbb{R}^{n+1}$  deci și în  $S^n$ . În mod evident familia tuturor  $U_i^\pm$ ,  $1 \leq i \leq n+1$  acoperă sfera  $S^n$  deoarece dat  $\xi \in S^n$  avem măcar un indice  $i$  a. î.  $\xi^i \neq 0$ . Definim:

a)  $\varphi_i^+ : U_i^+ \rightarrow D^n$ ,  $\varphi_i^+(\xi) = (\xi^1, \dots, \hat{\xi}^i, \dots, \xi^{n+1})$ ,

b)  $\varphi_i^- : U_i^- \rightarrow D^n$ ,  $\varphi_i^-(\xi) = (\xi^1, \dots, \hat{\xi}^i, \dots, \xi^{n+1})$ .

Am notat cu  $D^n$  *discul  $n$ -dimensional* i.e.  $D^n := \{u \in \mathbb{R}^n : \|u\|_n^2 < 1\}$  care este o varietate  $n$ -dimensională fiind un deschis din  $\mathbb{R}^n$  iar  $\hat{\phantom{x}}$  semnifică lipsa acelei cantități; vom folosi des această notație! Aplicațiile  $\varphi_i^\pm$  sunt continue și bijecții cu inversa:

c)  $(\varphi_i^\pm)^{-1} : D^n \rightarrow U_i^\pm$ ,  $(\varphi_i^\pm)^{-1}(u) = (u^1, \dots, u^{i-1}, \pm\sqrt{1 - \|u\|_n^2}, u^i, \dots, u^n)$ ,

care este tot continuă.

Considerăm atlasul  $\mathcal{A} = \{h_i := (U_i^\pm, \varphi_i^\pm); i = 1, \dots, n+1\}$  care are deci  $2(n+1)$  hărți.

I) Arătăm că  $\varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+)$  este deschis în  $\mathbb{R}^n$ ; analog se arată pentru  $\varphi_i^-(U_i^- \cap U_j^-)$ .

I.1) Pp.  $i < j$ . Fixăm  $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^{n+1}) \in U_i^+ \cap U_j^+$ . Avem  $\varphi_i^+(\xi) = (\xi^1, \dots, \hat{\xi}^i, \dots, \xi^j, \dots, \xi^{n+1})$  cu  $\xi^j$  pe poziția  $j-1$ . Prin urmare,  $\varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) = \{u \in \mathbb{R}^n; u^{j-1} > 0\}$  (=deschisă) deoarece  $\xi^j > 0$ !

I.2) Pp.  $j < i$ . Avem  $\varphi_i^+(\xi) = (\xi^1, \dots, \xi^j, \dots, \hat{\xi}^i, \dots, \xi^{n+1})$  cu  $\xi^j$  pe poziția  $j$ . Prin urmare,  $\varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) = \{u \in \mathbb{R}^n; u^j > 0\}$  (=deschisă).

II. Ultimul lucru pe care trebuie să-l arătăm este  $C^\infty$ -compatibilitatea hărților și din nou vom arăta doar compatibilitatea dintre  $h_i^+$  și  $h_j^+$  celelalte fiind analoage.

II.1  $i < j$ :

$$\varphi_j^+ \circ (\varphi_i^+)^{-1}(u) = (u^1, \dots, u^{i-1}, \sqrt{1 - \|u\|_n^2}, u^i, \dots, \hat{u}^j, \dots, u^n). \quad (1)$$

II.2  $j < i$ :

$$\varphi_j^+ \circ (\varphi_i^+)^{-1}(u) = (u^1, \dots, \hat{u}^j, \dots, u^{i-1}, \sqrt{1 - \|u\|_n^2}, u^i, \dots, u^n). \quad (2)$$

Aplicațiile (1) și (2) sunt evident netede i.e.  $C^\infty$  deci  $\mathcal{A}$  este atlasul unei structuri de varietate  $n$ -dimensională pe  $S^n$ .

**Observații** 1) Acest atlas al sferei spunem că a fost obținut prin *proiecții ortogonale!*  
2) Analog sfera  $S^n(R) := \{\xi = (\xi^1, \dots, \xi^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \|\xi\|_{n+1}^2 := (\xi^1)^2 + \dots + (\xi^{n+1})^2 = R^2\}$  este varietate  $n$ -dimensională. În aplicațiile (1), (2) înlocuim la radical 1 cu  $R^2$ . Refaceți singuri întreaga demonstrație pentru  $S^n(R)$ .  $\square$

**S8.3** Să se arate că aceeași structură de varietate a sferei  $S^n$  se poate obține dintr-un atlas cu doar 2 hărți! Acesta este de altfel numărul minim de hărți pentru orice varietate compactă!

**Rezolvare** Polul nord este  $N(0, \dots, 0, 1) \in S^n$  iar polul sud este  $S(0, \dots, 0, -1) \in S^n$ . Avem deschișii din sferă  $U_N = S^n \setminus \{N\}$ ,  $U_S = S^n \setminus \{S\}$  și deci  $S^n = U_N \cup U_S$ . Fie atlasul  $\mathcal{A} = \{h_N = (U_N, \varphi_N), h_S = (U_S, \varphi_S)\}$  care are exact 2 hărți și unde aplicația  $\varphi_{point} : U_{point} \rightarrow \mathbb{R}^n$  este dată de:  $\varphi_{point}(\xi) = u =$  intersecția dreptei (*point*) $\xi$  cu hiperplanul ecuatorial  $\mathbb{R}^n$ :  $\xi^{n+1} = 0$ ;  $point \in \{N, S\}$ . Am folosit axioma euclidiană ce spune că două puncte distincte (la noi *point* și  $\xi$ ) determină o dreaptă unică.

I) Ecuația dreptei  $N\xi$  din  $\mathbb{R}^{n+1}$ :

$$N\xi : \frac{x^1 - 0}{\xi^1 - 0} = \dots = \frac{x^n - 0}{\xi^n - 0} = \frac{x^{n+1} - 1}{\xi^{n+1} - 1}$$

intersectată cu  $x^{n+1} = 0$  va da:  $u = \frac{1}{1 - \xi^{n+1}}(\xi^1, \dots, \xi^n)$ .

II) Ecuația dreptei  $S\xi$  din  $\mathbb{R}^{n+1}$ :

$$S\xi : \frac{x^1 - 0}{\xi^1 - 0} = \dots = \frac{x^n - 0}{\xi^n - 0} = \frac{x^{n+1} + 1}{\xi^{n+1} + 1}$$

intersectată cu  $x^{n+1} = 0$  va da:  $u = \frac{1}{1 + \xi^{n+1}}(\xi^1, \dots, \xi^n)$ . Avem  $\varphi_N(U_N \cap U_S) = \varphi_S(U_N \cap U_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$  care este deschis în  $\mathbb{R}^n$ .

II.  $\varphi_{point}$  este continuă și bijecție cu inversa:

$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{1 + \|u\|_n^2}(2u, \|u\|_n^2 - 1), \quad \varphi_S^{-1}(u) = \frac{1}{1 + \|u\|_n^2}(2u, 1 - \|u\|_n^2). \quad (3)$$

Prin urmare,  $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} : \varphi_S(U_N \cap U_S) = \mathbb{R}^n \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  este:

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}(u) = \frac{1}{1 - \frac{1 - \|u\|_n^2}{1 + \|u\|_n^2}} \frac{2u}{1 + \|u\|_n^2} = \frac{u}{\|u\|_n^2} = \varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u) \quad (4)$$



care este evident netedă. Mai observăm că  $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} = \varphi_S \circ \varphi_N^{-1}$  este definită pe  $\mathbb{R}^n \setminus \{O\}$  cu valori în aceeași mulțime  $\mathbb{R}^n \setminus \{O\}$ .

Se arată imediat că oricare din cele 2 hărți este  $C^\infty$ -compatibilă cu oricare hartă a atlasului de la problema precedentă! Deci avem aceeași structură de varietate pe  $S^n$ !

- Observații** 1) Acest atlas al sferei spunem că a fost obținut prin *proiecții stereografice*!  
 2) Refaceți singuri întreaga demonstrație pentru  $S^n(R)$ .  
 3) Reamintim caracterizarea topologică (Weierstrass): o submulțime  $K$  din  $\mathbb{R}^m$  este compactă dacă și numai dacă este închisă și mărginită!  $\square$

**S8.4** Dacă  $n = 2$  atunci exprimați aplicația de compatibilitate (4) în numere complexe.

**Rezolvare**  $u \in \mathbb{R}^2$  îl renotăm ca de obicei  $z = x + iy$  cu  $x$  partea reală și  $y$  partea imaginară a numărului complex  $z \in \mathbb{C}$ . Deci la sfera 2-dimensională i.e. sfera uzuală (din spațiul fizic 3-dimensional) avem:

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \rightarrow w = \frac{z}{|z|^2} = \frac{1}{\bar{z}} =: \text{Inv}_{S^1}(z) \quad (5)$$

deoarece norma euclidiană a lui  $u = z$  este exact modulului numărului complex  $z$ ! Dar aplicația (5) este exact *inversiunea în raport cu cercul  $S^1$* !

Inversiunea  $\text{Inv}_{S^1}$  are ca *invariant exact biraportul a 4 puncte distincte  $x, y, z, w$*  i.e. numărul strict pozitiv:

$$(x, y; z, w) := \frac{|z - x|}{|y - z|} : \frac{|w - x|}{|y - w|} = \frac{|z - x||w - y|}{|z - y||w - x|}. \quad (6)$$

În adevăr:

$$(\text{Inv}_{S^1}(x), \text{Inv}_{S^1}(y); \text{Inv}_{S^1}(z), \text{Inv}_{S^1}(w)) := \frac{|\bar{x} - \bar{z}||\bar{y} - \bar{w}|}{|\bar{y} - \bar{z}||\bar{x} - \bar{w}|} = \frac{|\overline{x - z}||\overline{y - w}|}{|\overline{y - z}||\overline{x - w}|} = (x, y; z, w).$$

**S8.5** Să se arate că proiecția stereografică din  $P(-1, 0) \in S^1$  produce o parametrizare rațională a *cercului unitate  $S^1$* . Interpretare trigonometrică!

**Rezolvare** Fixăm  $t \in \mathbb{R}$ . Punctele  $P$  și  $(0, t) \in Oy$  sunt distincte deci determină o dreaptă unică  $d_t$ . Fie punctul  $\{(a, b) = (a(t), b(t))\} = S^1 \cap d_t$ . Avem:

$$d_t : \frac{x + 1}{0 + 1} = \frac{y - 0}{t - 0} \rightarrow y = t(x + 1).$$

Deci  $b = t(a + 1)$  și  $a^2 + b^2 = 1$  ceea ce dă  $t^2(1 + a)^2 = 1 - a^2$  i.e.  $t^2 = \frac{1-a}{1+a}$  cu soluția  $a = 1 - \frac{2t^2}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ .

În concluzie, avem parametrizarea cercului  $S^1$  mai puțin punctul  $P$ :

$$S^1 \setminus \{P\} : t \in \mathbb{R} \rightarrow \bar{r}(t) = \varphi^{-1}(t) = \left( \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2} \right) = (\cos x, \sin x) = (\xi^1, \xi^2) \quad (7)$$

cu inversa:

$$\varphi : S^1 \setminus \{P\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\xi^1, \xi^2) \rightarrow t = \frac{1 - \xi^1 + \xi^2}{1 + \xi^1 + \xi^2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}. \quad (8)$$

Prin urmare, pentru  $t = tg \frac{x}{2}$  reobținem cunoscutele (!) formule trigonometrice:

$$\cos x = \frac{1 - tg^2 \frac{x}{2}}{1 + tg^2 \frac{x}{2}}, \quad \sin x = \frac{2tg \frac{x}{2}}{1 + tg^2 \frac{x}{2}} \quad (9)$$

deci și formulele:

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x. \quad (10)$$

Relativ la relația (7) să observăm că punctul  $P$  corespunde trecerii la limită  $t \rightarrow \pm\infty$ ! Vom numi *trigonometric* acest atlas pe  $S^1 \setminus \{P\}$ .

**S8.6** Numim *grup Lie* un grup  $G$  ce este varietate și pentru care aplicația produs  $\cdot : G \times G \rightarrow G$  și aplicația de inversare  $x \in G \rightarrow x^{-1} \in G$  sunt ambele diferentiabile. Cel mai "amplu" grup Lie matriceal i.e. submulțime în algebra reală  $M_n(\mathbb{R})$  este  $GL(n, \mathbb{R})$ !

**Rezolvare**  $GL(n, \mathbb{R})$  este mulțimea tuturor matricilor inversabile  $S \in M_n(\mathbb{R})$ . Se verifică imediat că este grup relativ la înmulțirea matricilor; în fapt, este *grupul unităților* din inelul  $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ . Se numește *n-grupul linear matriceal*.

$GL(n, \mathbb{R})$  este deschis în  $M_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n^2}$  deoarece este contraimagină deschisului  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  prin aplicația continuă  $\det$ ! Deci,  $GL(n, \mathbb{R})$  este varietate de dimensiune  $n^2$ . Se verifică imediat că aplicațiile de grup sunt diferentiabile fiind aplicații raționale! Mai mult, aplicația determinant este o aplicație diferentiabilă! Exemplu:  $GL(1, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^*$ .

**S8.7** Să se arate că *n-grupul ortogonal*  $O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}); A^t \cdot A = A \cdot A^t = I_n\}$  este grup Lie. Analog, *n-grupul ortogonal special*  $SO(n) = \{A \in O(n); \det A = +1\}$ !

**Rezolvare** Avem imediat că  $O(n)$  este subgrup în  $GL(n, \mathbb{R})$  deoarece pentru  $A \in O(n)$  avem inversa  $A^{-1} = A^t$ . Reamintim descompunerea în sumă directă:

$$M_n(\mathbb{R}) = Sym(n) \oplus o(n) \quad (11)$$

cu  $Sym(n)$ =subspațiul vectorial al matricilor simetrice  $\simeq \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$  și  $o(n)$ =subspațiul vectorial al matricilor anti-simetrice  $\simeq \mathbb{R}^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ! Un fapt remarcabil este: dacă  $S \in o(n)$  atunci  $I_n \pm S \in GL(n, \mathbb{R})$  și încă:

$$(I_n + S)(I_n - S)^{-1} \in O(n)! \quad (12)$$

Orice matrice ortogonală  $A \in O(n)$  definește o *aplicație Cayley*:

$$g_A : o(n) = \mathbb{R}^{\frac{n(n-1)}{2}} \rightarrow O(n), \quad g_A(S) := (I_n + S)(I_n - S)^{-1}A. \quad (13)$$

Se arată imediat că  $g_A$  este bijecție pe imaginea  $U_A = Im(g_A)$  și fie  $\varphi_A = g_A^{-1}$ . Atunci  $\mathcal{A} = \{h_A = (U_A, \varphi_A); A \in O(n)\}$  constituie un atlas (cu o infinitate de hărți!) pe  $O(n)$ ! În concluzie:

$$\dim O(n) = \dim SO(n) = \frac{n(n-1)}{2}! \quad (14)$$

**Exemplu:**  $O(1) = \{\pm 1\}$  și  $SO(1) = \{+1\}$ .  $SO(2)$  este grup izomorf cu grupul cerc unitate ( $S^1 = \{z \in \mathbb{C}^*; |z| = 1\}, \cdot$ )=grupul numerelor complexe de modul 1 și este singurul  $SO(n)$  comutativ!

Pentru  $n = 2$  avem  $o(2) \ni S = S(t)$ :

$$S(t) = \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}^{\frac{2(2-1)}{2}} = \mathbb{R}$$

și deci:

$$I_2 - S(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ -t & 1 \end{pmatrix}, \det(I_2 - S(t)) = 1 + t^2 \geq 1, (I_2 - S(t))^{-1} = \frac{1}{1 + t^2} \begin{pmatrix} 1 & -t \\ t & 1 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

$$(I_2 + S(t))(I_2 - S(t))^{-1} = \frac{1}{1 + t^2} \begin{pmatrix} 1 - t^2 & -2t \\ 2t & 1 - t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \in SO(2). \quad (16)$$

Se poate trece la limită  $t \rightarrow \pm\infty$  în (16) și obținem  $-I_2 \in SO(2)$ .

**Observație**  $O(n)$  este *grupul de structură* al geometriei euclidiene  $n$ -dimensionale în termeni de  $G$ -structuri!  $SO(n)$  este grupul de structură al geometriei euclidiene *orientate* deoarece valoarea pozitivă  $+1 = \det A$  semnifică păstrarea orientării lui  $\mathbb{R}^n$  de către transformarea liniară  $A$ .  $\square$



## Cursul 19

# Seminar 9 (2021): Funcții diferențiabile

### SEMINAR 9

**S9.1** În spațiul  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  definim o relație  $\sim$  prin:  $x \sim y$  dacă există  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  a. î.  $y = \lambda x$ .  
i) Arătați că  $\sim$  este o relație de echivalență pe  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Mulțimea cât  $P^n(\mathbb{R}) := (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$  o numim *spațiul proiectiv*.

ii) Înzestrați  $P^n(\mathbb{R})$  cu o structură de varietate de dimensiune  $n$ . Din acest motiv puteți întâlni  $P^n(\mathbb{R})$  cu denumirea completă: *spațiul proiectiv  $n$ -dimensional*.

**Rezolvare** i) Temă individuală! ii) Pentru  $x \in \mathbb{R}^{n+1}$  notăm ca de obicei cu  $[x] \in P^n(\mathbb{R})$  clasa sa de echivalență. Pentru  $i \in \{1, \dots, n+1\}$  fie  $U_i := \{[x] \in P^n(\mathbb{R}); x^i \neq 0\}$ . Avem imediat că familia  $\{U_i; 1 \leq i \leq n+1\}$  acoperă pe  $P^n(\mathbb{R})$  și prin definiția unei topologii cât avem că  $U_i$  este deschisă; astfel aplicația de proiecție  $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow P^n(\mathbb{R})$  devine aplicație deschisă.

Definim  $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  prin:

$$\varphi_i([x]) := \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right).$$

Din definiția relației  $\sim$  avem buna definire:  $[x] = [y]$  implică  $\varphi_i([x]) = \varphi_i([y])$  deoarece la toate fracțiile date în membrul drept se va simplifica factorul de proporționalitate  $\lambda \neq 0$ . Se arată imediat că  $\varphi$  este surjectivă:  $\varphi_i(U_i) = \mathbb{R}^n$ . Fie indicii  $i \neq j$ ; deci  $U_i \cap U_j = \{[x] \in P^n(\mathbb{R}); x^i \cdot x^j \neq 0\}$ . Avem două cazuri:

I)  $i < j$ . Rezultă pentru  $[x] \in U_i \cap U_j$ :

$$\varphi_i([x]) = \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^j}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right)$$

iar componenta  $j-1$  i.e.  $\frac{x^j}{x^i}$  este nenulă. Deci:

$$\varphi_i(U_i \cap U_j) = \{y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n; y^{j-1} \neq 0\} \quad (1)$$

care este un deschis din  $\mathbb{R}^n$ .

II)  $i > j$ . Avem:

$$\varphi_i(U_i \cap U_j) = \{y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n; y^j \neq 0\}$$

care este deschis în  $\mathbb{R}^n$ .

Pentru a studia compatibilitatea hărților să observăm că:

$$\varphi_i^{-1}(y) = [y^1, \dots, y^{i-1}, 1, y^i, \dots, y^n].$$

I)  $i < j$ . Rezultă:

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(y) = \varphi_j([y^1, \dots, y^{i-1}, 1, y^i, \dots, y^n]) = \left( \frac{y^1}{y^{j-1}}, \dots, \frac{y^{i-1}}{y^{j-1}}, \frac{1}{y^{j-1}}, \frac{y^i}{y^{j-1}}, \frac{y^{j-2}}{y^{j-1}}, \dots, \frac{y^n}{y^{j-1}} \right)$$

care este aplicație de clasă  $C^\infty$ . Să observăm că are sens împărțirea cu  $y^{j-1}$  tocmai datorită relației (1)!

II)  $i > j$ . Se arată analog și avem concluzia dorită.

**S9.2** Inspirat de atlasul anterior al spațiului proiectiv  $n$ -dimensional să se construiască un nou atlas pe  $S^n$  cu  $2(n+1)$  hărți și compatibil cu cele din seminarul anterior.

**Rezolvare** Pentru  $i \in \{1, \dots, n+1\}$  fixat fie  $U_i^+ := \{\xi \in S^n; \xi^i > 0\}$  și  $U_i^- := \{\xi \in S^n; \xi^i < 0\}$ ; exact ca la problema S8.2. Definim  $\varphi_i^+ : U_i^+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ :

$$\varphi_i^+(\xi) = \left( \frac{\xi^1}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{i-1}}{\xi^i}, \frac{\xi^{i+1}}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{n+1}}{\xi^i} \right)$$

și avem că  $\varphi_i^+$  este bijecție cu inversa:

$$(\varphi_i^+)^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \|x\|_n^2}}(x^1, \dots, x^{i-1}, 1, x^i, \dots, x^n).$$

Analog definim  $\varphi_i^- : U_i^- \rightarrow \mathbb{R}^n$ :

$$\varphi_i^-(\xi) = \left( \frac{\xi^1}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{i-1}}{\xi^i}, \frac{\xi^{i+1}}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{n+1}}{\xi^i} \right)$$

și avem că  $\varphi_i^-$  este bijecție cu inversa:

$$(\varphi_i^-)^{-1}(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|x\|_n^2}}(x^1, \dots, x^{i-1}, 1, x^i, \dots, x^n).$$

Fie indicii  $i \neq j$  și  $\xi \in U_i^+ \cap U_j^+$ ; se arată la fel pentru indicele minus. Avem iar cele două cazuri:

I)  $i < j$  implică:

$$\varphi_i^+(\xi) = \left( \frac{\xi^1}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{i-1}}{\xi^i}, \frac{\xi^{i+1}}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^j}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{n+1}}{\xi^i} \right)$$

cu  $\frac{\xi^j}{\xi^i}$  pe poziția  $j-1$  ceea ce spune că:

$$\varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) = \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n; x^{j-1} > 0\}$$

care este evident deschis în  $\mathbb{R}^n$ .

I)  $i > j$  implică:

$$\varphi_i^+(\xi) = \left( \frac{\xi^1}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^j}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{i-1}}{\xi^i}, \frac{\xi^{i+1}}{\xi^i}, \dots, \frac{\xi^{n+1}}{\xi^i} \right)$$

cu  $\frac{\xi^j}{\xi^i}$  pe poziția  $j$  ceea ce spune că:

$$\varphi_i^+(U_i^+ \cap U_j^+) = \{x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n; x^j > 0\}$$

care este evident deschis în  $\mathbb{R}^n$ .

Pentru compatibilitatea hărților avem aceleași expresii pentru compuneri ca la spațiul proiectiv deci concluzia. Se arată din nou după un calcul nu foarte lung că orice hartă a acestui atlas este  $C^\infty$ -compatibilă cu cele două hărți obținute prin proiecții stereografice deci am reobținut aceeași structură de varietate pentru  $S^n$ .

**Observație** Acest atlas al sferei spunem că a fost obținut prin *proiecția centrală de centru*  $O$ .

**S9.3** În problema S8.3 am obținut aplicația schimbării de hărți ale atlasului dat de proiecții stereografice  $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} = \varphi_S \circ \varphi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$ :

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}(x) = \frac{x}{\|x\|_n^2} = \varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x). \quad (2)$$

Se cere Jacobianul acestei aplicații  $C^\infty$  într-un punct fixat  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$ .

**Rezolvare** Matricea Jacobiană se calculează imediat; pentru simplificarea scrierii am renunțat la indicele  $n$  al normei euclidiene:

$$D(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(x) = \frac{1}{\|x\|^4} \begin{pmatrix} \|x\|^2 - 2(x^1)^2 & -2x^1x^2 & \dots & -2x^1x^n \\ -2x^1x^2 & \|x\|^2 - 2(x^2)^2 & \dots & -2x^2x^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -2x^1x^n & -2x^2x^n & \dots & \|x\|^2 - 2(x^n)^2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

și prezentăm două metode de calcul al determinantului.

**Metoda 1** Fie matricea  $A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \in \text{Sym}(n) \cap \text{GL}(n, \mathbb{R})$  și vectorul  $u = (u_1, \dots, u_n)^t \in \mathbb{R}^n$ . Dat și scalarul real  $\lambda$  formăm o nouă matrice simetrică:

$$X = X(A, u, \lambda) := A + \lambda u \cdot u^t. \quad (4)$$

Atunci determinantul lui  $X$  este:

$$\det X = (1 + \lambda \|u\|_A^2) \det A, \quad \|u\|_A^2 = a^{ij} u_i u_j, \quad (a^{ij}) = A^{-1}. \quad (5)$$

Pentru matricea (3) exceptând fracția factor din față avem exact:  $A = \|x\|^2 I_n$ ,  $\lambda = -2$ ,  $u = x$ . Deci  $A^{-1} = \frac{1}{\|x\|^2} I_n$ ,  $\|u\|_A^2 = \frac{1}{\|x\|^2} \cdot \|x\|^2 = 1$  și  $\det A = (\|x\|^2)^n = \|x\|^{2n}$ . În concluzie:

$$\det D(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(x) = \frac{1}{(\|x\|^4)^n} \cdot (1 - 2 \cdot 1) \cdot \|x\|^{2n} = \frac{-1}{\|x\|^{2n}} < 0 \quad (6)$$

ceea ce spune că matricea  $D(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(x)$  aparține lui  $\text{GL}(n, \mathbb{R})$  (asta știam fiind matricea unui difeomorfism!) și schimbă orientarea spațiului  $\mathbb{R}^n$ !

**Metoda 2** Deoarece matricea  $X = D\dots$  (fără fracția factor din față) este simetrică și știm că orice matrice simetrică este diagonalizabilă vom calcula valorile proprii  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  și atunci

$\det X$  este produsul acestor valori proprii. Fie deci  $\lambda \in \mathbb{R}$  o valoare proprie și  $v \in S^{n-1}$  un versor propriu asociat lui  $\lambda$ ! Folosind asociativitatea produsului de matrici avem:

$$(\|x\|^2 I_n - 2x \cdot x^t) \cdot v = \lambda v \rightarrow (\|x\|^2 - \lambda)v = 2x \cdot (x^t \cdot v) = 2x \cdot (\langle x, v \rangle) = 2 \langle x, v \rangle x$$

deoarece  $x^t \cdot v = \langle x, v \rangle$ ! Rezultă că avem două cazuri:

I)  $v$  coliniar (sau paralel) cu  $x$  și atunci trecând la normă în relația precedentă avem:

$$|\|x\|^2 - \lambda| = 2|\langle x, v \rangle| \|x\|$$

cu unica soluție  $v = \frac{x}{\|x\|} \in S^{n-1}$ ,  $\lambda_1 = -\|x\|^2$ .

II)  $v \perp x$  cu unica soluție  $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = \|x\|^2$ .

În concluzie:  $\det X = (-\|x\|^2)\|x\|^2 \cdot \dots \cdot \|x\|^2 = -\|x\|^{2n}$  și reobținem rezultatul (6).

**S9.4** Pe sfera  $S^n$  definim funcția înălțime (height, în engleză)  $h : S^n \rightarrow [-1, 1]$ ,  $h(\xi) = \xi^{n+1}$ . Să se arate că cei doi poli sunt singurele puncte de extrem pentru  $h$ .

**Rezolvare** Vom folosi atlasul dat de proiecția stereografică și deci formulele din exercițiul **S8.3**:

$$h \circ \varphi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad u \rightarrow \frac{\|u\|^2 - 1}{1 + \|u\|^2}, \quad (7)$$

$$h \circ \varphi_S^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad u \rightarrow \frac{1 - \|u\|^2}{1 + \|u\|^2}. \quad (8)$$

Derivatele parțiale:

$$(h \circ \varphi_N^{-1})_{u^i} = \frac{2u^i(1 + \|u\|^2) - 2u^i(\|u\|^2 - 1)}{(1 + \|u\|^2)^2} = \frac{4u^i}{(1 + \|u\|^2)^2}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (9)$$

se vor anula doar în  $u = 0$  și  $\varphi_N^{-1}(0) = S$  care este în adevăr punct de minim pentru  $h$ :  $h(S) = -1$ .

Analog, derivatele parțiale:

$$(h \circ \varphi_S^{-1})_{u^i} = \frac{-2u^i(1 + \|u\|^2) - 2u^i(1 - \|u\|^2)}{(1 + \|u\|^2)^2} = \frac{-4u^i}{(1 + \|u\|^2)^2}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (10)$$

se vor anula doar în  $u = 0$  și  $\varphi_S^{-1}(0) = N$  care este în adevăr punct de maxim pentru  $h$ :  $h(N) = +1$ .

**S9.5** Aceeași problemă pentru funcția înălțime  $h : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$  dar folosind harta trigonometrică a problemei **S8.5**.

**Rezolvare** Avem:

$$h \circ \varphi^{-1} : t \in \mathbb{R} \rightarrow \frac{2t}{1 + t^2} \in \mathbb{R} \quad (11)$$

cu derivata:

$$(h \circ \varphi^{-1})'(t) = \frac{2(1 - t^2)}{(1 + t^2)^2}. \quad (12)$$

Deci punctele critice sunt date de  $t = \pm 1$  și avem:

$$\varphi^{-1}(\pm 1) = (0, \pm 1) = \{N, S\}$$



adică concluzia.

**S9.6** Să se studieze aplicația determinant  $\det : O(n) \rightarrow \{\pm 1\}$  în atlasul Cayley al problemei **S8.7**.

**Rezolvare** Avem  $\det \circ \varphi_A^{-1} = \det \circ g_A : o(n) \rightarrow \{\pm 1\}$ :

$$\det \circ g_A(S) = \det[(I_n + S)(I_n - S)^{-1}A] = \det(I_n + S)[\det(I_n - S)]^{-1} \det A = \det A = \pm 1. \quad (13)$$

În adevăr, pentru orice matrice anti-simetrică (!)  $S$  avem:

$$I_n - S = I_n + S^t = I_n^t + S^t = (I_n + S)^t \rightarrow \det(I_n - S) = \det(I_n + S) \quad (14)$$

deoarece determinantul oricărei matrici pătratice  $X$  coincide cu determinantul matricii transpuse  $X^t$ ! Formula (13) spune că funcția determinant este constantă în fiecare hartă  $h_A$  având valoarea  $\det A$ !

Pentru exemplul  $n = 2$  al problemei **S8.7** avem:  $\det(I_2 + S(t)) = \det(I_2 - S(t)) = 1 + t^2 \geq 1$ .

**S9.7** O aplicație importantă în Geometria Diferențială este **fibrarea Hopf**  $\pi : S^3 \rightarrow S^2(\frac{1}{2})$ :

$$(z, w) \in S^2 \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \pi(z, w) = (\pi_1(z, w), \pi_2(z, w)) = \left( \frac{1}{2}(|w|^2 - |z|^2), z\bar{w} \right) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C} \quad (15)$$

care este o submersie! Să se exprime această aplicație folosind harta  $h_N$  a lui  $S^3$ .

**Rezolvare** Avem  $z = \xi^1 + i\xi^2$  și  $w = \xi^3 + i\xi^4$  și deci:

$$\pi(z, w) = \left( \frac{1}{2}[(\xi^3)^2 + (\xi^4)^2 - (\xi^1)^2 - (\xi^2)^2], (\xi^1 + i\xi^2)(\xi^3 - i\xi^4) \right). \quad (16)$$

Folosind ecuațiile date de  $\varphi_N^{-1}$  i.e. (3) de la problema **S8.3** obținem după un calcul nu foarte complicat:

$$\pi_1 \circ \varphi_N^{-1}(u) = \frac{\|u\|^4 + 1 - 2[3(u^1)^2 + 3(u^2)^2 - (u^3)^2]}{2(1 + \|u\|^2)^2} \quad (17)$$

$$\pi_2 \circ \varphi_N^{-1}(u) = \frac{2[(2(u^1u^3 + u^2\|u\|^2 - u^2) + i(2u^2u^3 - u^1\|u\|^2 + u^1))]}{(1 + \|u\|^2)^2} \quad (18)$$

pentru orice  $u \in \mathbb{R}^3$ .

**S9.8** Revenim la matricea Jacobiană a Exercițiului 9.3 pentru cazul  $n = 2$  tratat în algebra numerelor complexe. Cu notația clasică  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  avem deci:

$$\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \rightarrow \frac{z}{|z|^2}$$

difeomorfism cu matricea Jacobiană:

$$D(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(z) = \frac{1}{|z|^4} \begin{pmatrix} |z|^2 - 2x^2 & -2xy \\ -2xy & |z|^2 - 2y^2 \end{pmatrix} \in \text{Sym}(2). \quad (19)$$

O matrice oarecare  $\Gamma \in \text{Sym}(2)$  de forma:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

este descrisă atât de tripletul  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  cât și de perechea  $(A, B) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ ,  $A$  numit *invariantul Hopf al lui  $\Gamma$* :

$$A = \frac{a - c}{2} - bi, \quad 2B = \text{Tr}\Gamma = a + c. \quad (20)$$

Se cer  $A$  și  $B$  pentru  $D(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(z)$ .

**Rezolvare** Avem  $B = 0$  i.e. matricea  $D(\varphi_N \circ (\varphi_S)^{-1})(z)$  este *traceless* sau *tracefree*. Mulțimea  $sl(n, \mathbb{R})$  a matricilor cu urma nulă este algebra Lie a  $n$ -grupului liniar special:

$$SL(n, \mathbb{R}) := \{\Gamma \in M_n(\mathbb{R}); \det \Gamma = +1\}, \quad \dim SL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1. \quad (21)$$

Invariantul Hopf este funcția:

$$A(z) = \frac{1}{2|z|^4} [(2y^2 - 2x^2) + 2xyi] = \frac{(y + ix)^2}{|z|^4}. \quad (22)$$

Dar  $\bar{z} = x - iy$  și deci  $i\bar{z} = y + ix$  de unde rezultă:

$$A(z) = \frac{(i\bar{z})^2}{(z\bar{z})^2} = \frac{-\bar{z}^2}{z^2\bar{z}^2} = -\frac{1}{z^2} \quad (23)$$

care este o funcție olomorfă în planul (= dreapta complexă) punctat!

**S9.9** Problema precedentă ridică problema găsirii de difeomorfisme cu matricea Jacobiană simetrică. Fie funcția netedă  $f : I \subseteq \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  și difeomorfismul  $F_f : D_d \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  de forma:

$$F_f = (F^1, \dots, F^n), \quad F^i(x) = x^i f(\|x\|^2), \quad i.e. \quad F_f(x) = f(\|x\|^2)x. \quad (24)$$

În termeni de câmpuri vectoriale putem spune că  $F_f$  este un câmp radial. Atunci matricea Jacobiană a lui  $F$  aparține lui  $Sym(n)$ . Să observăm că pentru inversabilitatea lui  $F_f$  trebuie să cerem ca funcția reală  $g(t) = tf^2(t) > 0$  să fie inversabilă așa încât funcția  $f \circ g^{-1} \neq 0$ .

**Rezolvare** Avem pentru  $i \neq j$ :

$$F_{x^j}^i = 2x^i x^j f'(\|x\|^2) = F_{x^i}^j. \quad (25)$$

Problema precedentă corespunde funcției  $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ ,  $f(t) = \frac{1}{t^2}$  care este evident netedă. Observația finală corespunde relațiilor:

$$y = f(\|x\|^2)x \rightarrow \|y\|^2 = f^2(\|x\|^2)\|x\|^2 \rightarrow x = \frac{y}{f \circ g^{-1}(\|y\|^2)}.$$

**S9.10** Pentru spațiul proiectiv  $P^1(\mathbb{R})$  cu atlasul dat în S9.1 se cere diferențiala  $D(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(x, y)$  renotând  $(y^1, y^2) = (x, y)$  în:

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y^1, y^2) = \left( \frac{1}{y^1}, \frac{y^2}{y^1} \right). \quad (25)$$

**Rezolvare** Avem  $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \{(x, y) \in \mathbb{R}; x \neq 0\} \rightarrow \{(x, y) \in \mathbb{R}; x \neq 0\}$ :

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(x, y) = \left( \frac{1}{x}, \frac{y}{x} \right)$$

cu diferențiala:

$$D(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(x, y) = \left( \begin{array}{cc} -\frac{1}{x^2} & 0 \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{array} \right) \rightarrow J(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(x, y) = -\frac{1}{x^3} \neq 0. \quad (260)$$

Se observă că matricea  $D(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(x, y)$  nu este simetrică!

## Cursul 20

# Seminar 10 (2021): Spațiul tangent și spațiul cotangent

### SEMINAR 10

**S10.1** Fixăm punctul  $P$  din varietatea 2-dimensională  $M$ . Să presupunem că  $P$  este în intersecția domeniilor a două hărți  $\varphi : P \in U \subseteq M \rightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\tilde{\varphi} : P \in \tilde{U} \subseteq M \rightarrow (\tilde{x}, \tilde{y}) \in \mathbb{R}^2$ . Se cere schimbarea bazelor asociate din spațiul tangent  $T_P M$  și spațiul cotangent  $T_P^* M$ .

**Rezolvare** În spațiul tangent avem bazele  $B = \{\frac{\partial}{\partial x}|_P, \frac{\partial}{\partial y}|_P\}$ ,  $\tilde{B} = \{\frac{\partial}{\partial \tilde{x}}|_P, \frac{\partial}{\partial \tilde{y}}|_P\}$ . La schimbarea de hărți:

$$\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap \tilde{U}) \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \tilde{\varphi}(U \cap \tilde{U}) \subseteq \mathbb{R}^2 : \tilde{x} = \tilde{x}(x, y), \quad \tilde{y} = \tilde{y}(x, y)$$

avem schimbarea de baze în  $T_P M$ :

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{x}}|_P = \frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}(P) \frac{\partial}{\partial x}|_P + \frac{\partial \tilde{y}}{\partial x}(P) \frac{\partial}{\partial \tilde{y}}|_P,$$

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{y}}|_P = \frac{\partial \tilde{x}}{\partial y}(P) \frac{\partial}{\partial x}|_P + \frac{\partial \tilde{y}}{\partial y}(P) \frac{\partial}{\partial \tilde{y}}|_P.$$

În spațiul cotangent  $T_P^* M$  avem bazele duale  $B^* = \{dx|_P, dy|_P\}$ ,  $\tilde{B}^* = \{d\tilde{x}|_P, d\tilde{y}|_P\}$ . Legea de schimbare a lor este:

$$d\tilde{x}|_P = \frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}(P) dx|_P + \frac{\partial \tilde{x}}{\partial y}(P) dy|_P, \quad d\tilde{y}|_P = \frac{\partial \tilde{y}}{\partial x}(P) dx|_P + \frac{\partial \tilde{y}}{\partial y}(P) dy|_P.$$

**S10.2** Considerăm punctul  $P$  în planul punctat  $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\} = \mathbb{C}^*$  în care am fixat un reper ortonormat  $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}\}$ . Punctul  $P$  aparține domeniului hărții carteziene  $P \rightarrow (x, y)$  date de  $\overrightarrow{OP} = x\bar{i} + y\bar{j}$ . Tot  $P$  aparține și domeniului hărții polare  $P \rightarrow (r, \varphi) \in (0, +\infty) \times [0, 2\pi]$ . Să se studieze schimbarea bazelor asociate din spațiul tangent  $T_P(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$  și spațiul cotangent  $T_P^*(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$ .

**Rezolvare** În spațiul tangent avem bazele  $B_{cart} = \{\frac{\partial}{\partial x}|_P, \frac{\partial}{\partial y}|_P\}$ ,  $B_{polar} = \{\frac{\partial}{\partial r}|_P, \frac{\partial}{\partial \varphi}|_P\}$ . Reamintim trecerea dintre cele două hărți:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0 \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x}. \end{cases} \quad (1)$$

Să observăm că toate funcțiile ce intervin sunt elementare deci netede și prin urmare cele două hărți (ambele globale pentru planul punctat!) sunt  $C^\infty$ -compatibile, deci induc aceeași structură de varietate! Avem expresia *vectorului tangent radial*:

$$\frac{\partial}{\partial r}|_P = \frac{\partial x}{\partial r}(P) \frac{\partial}{\partial x}|_P + \frac{\partial y}{\partial r}(P) \frac{\partial}{\partial y}|_P = \cos \varphi \frac{\partial}{\partial x}|_P + \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y}|_P = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x}|_P + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}|_P. \quad (2)$$

Analog *vectorul tangent unghiular* este:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi}|_P = \frac{\partial x}{\partial \varphi}(P) \frac{\partial}{\partial x}|_P + \frac{\partial y}{\partial \varphi}(P) \frac{\partial}{\partial y}|_P = -r \sin \varphi \frac{\partial}{\partial x}|_P + r \cos \varphi \frac{\partial}{\partial y}|_P = -y \frac{\partial}{\partial x}|_P + x \frac{\partial}{\partial y}|_P. \quad (3)$$

Deci:

$$B_{polar} = B_{cart} \cdot S, \quad S = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & -y \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x \end{pmatrix}, \quad \det S = \sqrt{x^2 + y^2} = r > 0.$$

Prin urmare:

$$B_{cart} = B_{polar} \cdot S^{-1}, \quad S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\frac{\sin \varphi}{r} & \frac{\cos \varphi}{r} \end{pmatrix}$$

ceea ce spune că:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (4)$$

În aceste ultime relații (și în cele ce urmează) am renunțat la indicele  $P$  pentru simplificarea scrierii!

În spațiul cotangent avem bazele duale  $B_{cart}^* = \{dx, dy\}$ ,  $B_{polar}^* = \{dr, d\varphi\}$ . Avem:

$$dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi = \cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi, \quad dr = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy \quad (5)$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{\partial y}{\partial \varphi} d\varphi = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi, \quad d\varphi = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy. \quad (6)$$

Formulele (5)-(6) sunt în acord cu *caracterul co-variant* al vectorilor co-tangenți și cu faptul că matricea  $S$  a schimbării de baze se scrie și:

$$S = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} \quad (7)$$

deci vedem componentele liniilor în componentele din (5) și (6)!

**Aplicația 1** Formulele (5)-(6) se pot aplica la forma I-a fundamentală=metrica Riemanniană a planului punctat:

$$g = I = dx^2 + dy^2 = (\cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi)^2 + (\sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi)^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2. \quad (8)$$

Mai general, dacă avem o metrică Riemanniană pe varietatea 2-dimensională  $M$  ce local se scrie:

$$g = dx^2 + f^2(x)dy^2 \quad (9)$$

cu  $f : I_d \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  netedă atunci spunem că  $g$  este o *metrică warped*. Și metrica sferei  $S^2$  (considerată ca suprafață de rotație!) respectiv a elicoidului sunt warped!

**Aplicația 2** Funcția de clasă  $C^1$ ,  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}$  o numim *rotațional-simetrică* sau *invariantă la rotații* dacă nu depinde de  $\varphi$ :  $\frac{\partial f}{\partial \varphi} = 0$ . Din relația (3) rezultă că invarianța la rotații se exprimă cartezian prin:

$$x f_y = y f_x \quad (10)$$

unde indicele inferior semnifică variabila de derivare! Putem verifica imediat caracterizarea (10) prin  $f = f(r) = F(x^2 + y^2)$  cu  $F \in C^1$ . Atunci relația (10) devine egalitatea  $x \cdot 2yF' = y \cdot 2xF'$  cu  $F'$  derivata lui  $F$ .

Este natural să ne întrebăm dacă mai există vreo semnificație a relației (10) în afara faptului că funcțiile rotațional-simetrice sunt *integrale prime* ale *câmpului vectorial unghiular*. Răspunsul este pozitiv și pentru formularea lui avem nevoie de *paranteza Poisson*  $\{\cdot, \cdot\} : C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}) \times C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$ :

$$\{f, g\} := f_x \cdot g_y - f_y \cdot g_x$$

ceea ce conduce la interpretarea dorită:

**Propoziție**  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$  este *rotațional-simetrică* dacă și numai dacă comută Poisson cu funcția distanță  $\mathcal{F}(x, y) = r^2 = x^2 + y^2$ :

$$\{f, \mathcal{F}\} = 0.$$

Demonstrația este imediată din calculul general:

$$\{f, \mathcal{F}\} = 2(yf_x - xf_y).$$

Deoarece paranteza Poisson este  $\mathbb{R}$ -biliniară și anti-simetrică rezultă că mulțimea funcțiilor rotațional-simetrice este un subspațiu real în algebra reală  $(C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}), +, \cdot, \cdot)$ . Sau altfel: mulțimea integralelor prime ale unui câmp vectorial arbitrar al varietății  $M$  constituie o subalgebră reală în  $C^\infty(M)$

**Aplicația 3** Laplacianul în coordonate polare și în derivatele complexe se calculează imediat:

$$\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}. \quad (11)$$

Pentru exemplul rotațional-simetric  $f = F(r^2)$  avem:

$$\Delta f = 4[r^2 F'' + F'] \quad (12)$$

Deci  $f$  este armonică i.e. aparține nucleului Laplacianului dacă și numai dacă  $F = F(t)$  satisface ecuația diferențială:

$$tF'' + F' = 0 = (tF')' \quad (13)$$

care are soluția generală  $F(t) = C_1 \ln t + C_2$  cu  $C_1$  și  $C_2$  constante reale. Prin urmare, o funcție rotațional-simetrică armonică are expresia generală:

$$f(x, y) = C_1 \ln(x^2 + y^2) + C_2 \quad (14)$$

ceea ce spune că mulțimea funcțiilor rotațional-simetrice armonice este un spațiu vectorial real 2-dimensional cu baza canonică  $\{f_1 \equiv 1, f_2 = \ln(x^2 + y^2) = 2 \ln r\}$ . Curbele de nivel constant  $f_2 = c \in \mathbb{R}$  ale lui  $f_2$  sunt cercurile concentrice, centrate în originea  $O$ :

$$x^2 + y^2 = e^c > 0 \quad (15)$$

iar câmpul vectorial *gradient*  $\nabla f_2 = \frac{2}{x^2+y^2}(x, y)$  având direcția *radială*  $(x, y)$  este ortogonal acestor cercuri i.e. este perpendicular pe tangentele la cercuri!

**Temă** Exprimați Laplacianul 3-dimensional  $\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  în coordonate sferice și cilindrice. Vă va fi util la Ecuațiile Fizicii Matematice: ecuația Laplace, ecuația căldurii, ecuația undelor!

**Aplicația 4** Endomorfismul (tensorul) Kronecker  $I \in \mathcal{T}_1^1(C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})) : T_P M \rightarrow T_P M$  are expresia carteziană:

$$I = dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} + dy \otimes \frac{\partial}{\partial y}$$

cu  $\otimes$  *produsul tensorial*. Componentele acestui tensor sunt exact *simboliul Kronecker*  $\delta_j^i$ :  $\delta_1^1 = \delta_2^2 = 1$ ,  $\delta_2^1 = \delta_1^2 = 0$ ! Acest fapt justifică și notația: matricea asociată lui  $I$  în baza  $B_{cart}$  este exact matricea unitate  $I_2$ :

$$I \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) = dx \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial x} + dy \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial y} = 1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} + 0 \cdot \frac{\partial}{\partial y},$$

$$I \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) = dx \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial x} + dy \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial y} = 0 \cdot \frac{\partial}{\partial x} + 1 \cdot \frac{\partial}{\partial y}.$$

Un calcul nu foarte lung dă faptul remarcabil al expresiei comune (!) în coordonatele polare:

$$I = dr \otimes \frac{\partial}{\partial r} + d\varphi \otimes \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Acest rezultat este în acord cu legea schimbării matricii unui endomorfism la o schimbare de baze:  $S^{-1} \cdot I_2 \cdot S = I_2$ !

**10.3** Să se utilizeze formulele exercițiului anterior în analiza complexă.

**Rezolvare** Fie numărul complex  $z \in \mathbb{C}^*$  cu scrierea trigonometrică și exponențială:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}. \quad (16)$$

Derivatele parțiale din Analiza Complexă sunt:

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad (17)$$

Aplicând formulele (4) rezultă:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left[ (\cos \varphi - i \sin \varphi) \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \varphi + i \cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-\varphi)}}{2r} \frac{\partial}{\partial \varphi} = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \left[ \frac{\partial}{\partial r} - \frac{i}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right], \quad (18)$$

unde, pentru a obține ultimul egal, am înlocuit  $t = \frac{\pi}{2}$  în formula lui Euler:

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (19)$$

Analog se obține (sau prin conjugarea relației anterioare!):

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{e^{i\varphi}}{2} \left[ \frac{\partial}{\partial r} + \frac{i}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right]. \quad (20)$$

O identitate utilă are loc relativ la *vectorul Euler*, prin adunarea relațiilor (18) și (20):

$$E := r \frac{\partial}{\partial r} = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} = z \frac{\partial}{\partial z} + \bar{z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}}.$$

Fie  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) = f(z, \bar{z})$  de clasă  $C^1$ . Reamintim că  $f$  este holomorfă dacă nu depinde de  $\bar{z}$  i.e.  $f_{\bar{z}} = 0$  ceea ce se reduce la *ecuațiile Cauchy-Riemann* (CR):

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} = f' = u_x + iv_x. \quad (21)$$

În coordonate polare ecuațiile CR se exprimă astfel:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\varphi, \quad u_\varphi = -r v_r. \quad (22)$$

**Exemplul 1** Funcția  $f(z) = \ln z = \ln(re^{i\varphi}) = \ln r + i\varphi$  este holomorfă:  $u = \ln r = \frac{1}{2} f_2$ ,  $v = \varphi$  satisfac ecuațiile CR (22)! Sau înlocuim direct în (20):

$$\frac{\partial \ln z}{\partial \bar{z}} = \frac{e^{i\varphi}}{2} \left[ \frac{1}{r} + \frac{i}{r} \cdot i \right] = 0. \quad (23)$$

Reamintim că dacă  $f$  este holomorfă atunci componentele sale  $u, v$  sunt funcții armonice, numite *conjugate*. Reobținem că funcția logaritmică din formula (14) este armonică, fiind conjugată cu funcția  $\varphi := \arctg \frac{y}{x}$ ! În adevăr, avem:

$$\varphi_{xx} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = -\varphi_{yy}. \quad (24)$$

**Exemplul 2** Funcția  $f(z) = z^2$  este holomorfă cu  $u = x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\varphi$ ,  $v = 2xy = r^2 \sin 2\varphi$ . Se verifică imediat formula derivatei din (21):  $f'(z) = 2z = u_x + iv_x = 2x + i(2y)$ .

**Exemplul 3** Funcția lui Joukowski (matematician rus)  $J : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $J(z) = z + \frac{1}{z}$  este holomorfă. Această funcție transformă cercul  $\mathcal{C}(O, r > 1)$  în elipsa  $E(a, b) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$  cu semiaxa mare  $a = r + \frac{1}{r}$  și semiaxa mică  $b = r - \frac{1}{r}$ !

**Contraexemplu** Funcția de schimbări de hărți stereografice pe  $S^2$  din problema **S8.4**,  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $f(z) = \frac{1}{\bar{z}}$  evident că **nu este** holomorfă!

**TEMĂ** Fie funcția holomorfă  $f = u + iv$  și suprafețele grafic asociate  $Gr(u) : z = u(x, y)$ ,  $Gr(v) : z = v(x, y)$ . Să se arate că  $Gr(u)$  and  $Gr(v)$  **au aceeași curbura Gaussiană**:

$$K_f = - \left[ \frac{|f''|}{1 + |f'|^2} \right]^2 \leq 0. \quad (25)$$

Dacă nu reușiți pe cazul general atunci tratați cazul funcțiilor armonice conjugate de la Exemplul 2:  $u(x, y) = x^2 - y^2$ ,  $v(x, y) = 2xy$ :

$$K(x, y) = - \frac{4}{[1 + 4(x^2 + y^2)]^2} < 0. \quad (26)$$

□

**S10.4** Să se studieze analog endomorfismului Kronecker endomorfismul  $\mathcal{T}_1^1(C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})) \ni J : T_P M \rightarrow T_P M$  dat de:

$$J = dx \otimes \frac{\partial}{\partial y} - dy \otimes \frac{\partial}{\partial x}. \quad (26)$$

**Rezolvare** Avem:

$$J \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) = dx \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial y} - dy \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial x} = 1 \cdot \frac{\partial}{\partial y} - 0 \cdot \frac{\partial}{\partial x},$$

$$J \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) = dx \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial y} - dy \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial x} = 0 \cdot \frac{\partial}{\partial y} - 1 \cdot \frac{\partial}{\partial x}$$

și de aici obținem imediat că:

$$J^2 = -I. \quad (27)$$

Din acest motiv  $J$  se numește *structura (aproape complexă) a planului punctat*. În coordonate polare avem:

$$J = \frac{1}{r} dr \otimes \frac{\partial}{\partial \varphi} - r dr \otimes \frac{\partial}{\partial r} \quad (28)$$

și se observă imediat legătura cu ecuațiile Cauchy-Riemann polare date de relația (22).



## Cursul 21

# Seminar 11 (2021): Fibratul tangent și fibratul cotangent

### SEMINAR 11

**S11.1** Fie  $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$  de clasa  $C^\infty$  și punctul fixat  $x \in \mathbb{R}^{n+m}$ . Diferențiala lui  $F$  în  $x$  este aplicația liniară  $dF(x) : T_x \mathbb{R}^{n+m} \simeq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow T_{F(x)} \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^m$ . Spunem că  $F$  este submersie în  $x$  dacă  $dF(x)$  este surjectivă adică  $\text{rang} dF(x) = m$ . Fie  $c \in \text{Im}(F) \subseteq \mathbb{R}^m$  o valoare a lui  $F$  și  $M := F^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^{n+m}$  a.î.  $F|_M$  este submersie în orice punct. Atunci  $M$  este subvarietate regulată de dimensiune  $n$  a lui  $\mathbb{R}^{n+m}$  și pentru  $x \in M$  fixat avem o exprimare extrinsecă a spațiului tangent  $T_x M = \text{nucleul operatorului liniar } dF(x) : T_x \mathbb{R}^{n+m} \simeq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow T_{F(x)} \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^m$ . Să se studieze  $S^n(R)$  și  $T_\xi S^n(R)$  pentru  $\xi \in S^n(R)$  arbitrar.

**Rezolvare** Fie  $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$F(x) = \|x\|_{n+1}^2 - R^2. \quad (1)$$

Această funcție este netedă și are diferențiala:

$$dF(x) : T_x \mathbb{R}^{n+1} \simeq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow T_{F(x)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$$

dată de matricea linie  $2(x^1, \dots, x^{n+1}) = 2x \in M_{1, n+1}(\mathbb{R})$ . Dacă  $\xi \in S^n(R)$  atunci matricea  $2\xi$  are măcar o componentă nenulă și deci  $\text{rang} dF(\xi) = 1 = \dim \mathbb{R}$ . Prin urmare  $F|_{S^n(R)}$  este submersie cu:

$$dF(\xi)(u) = 2 \langle \xi, u \rangle_{n+1} \quad (2)$$

ceea ce spune că  $S^n(R)$  este subvarietate regulată a lui  $\mathbb{R}^{n+1}$  având dimensiunea  $(n+1) - 1 = n$ . Spațiul tangent la sferă are exprimarea extrinsecă:

$$T_\xi S^n(R) = (\text{span}\{\xi\})_{n+1}^\perp = \{u \in \mathbb{R}^{n+1}; u \perp \xi\} \quad (3)$$

adică rezultatul cunoscut din spațiul fizic: raza unei sfere este perpendiculară pe planul tangent!

**Consecință** Fie  $\xi \in S^2(R) \subset \mathbb{R}^3$  și vectorii  $u, v \in T_\xi S^2(R) \subset T_\xi \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ , necoliniari; deci  $\|u \times v\| > 0$ . Avem atunci:

$$\xi = \pm R \frac{u \times v}{\|u \times v\|}.$$

**S11.2** Fie punctul  $\xi = (\xi^1, \xi^2) \in M := S^1 \setminus \{P\}$  identificat cu numărul complex  $\xi_{\mathbb{C}} := \xi^1 + i\xi^2$ . Vectorul  $\mathbb{R}^2 \ni X_{\xi} := (-\xi^2, \xi^1) = i \cdot \xi_{\mathbb{C}}$  aparține planului tangent  $T_{\xi}M$  conform exprimării extrinseci (13):  $X_{\xi} \perp \xi$ . Se cere expresia intrinsecă a lui  $X_{\xi}$  în atlasul trigonometric al problemei **S8.5**.

**Rezolvare** Expresia intrinsecă a lui  $X_{\xi}$  este:

$$X_{\xi} = A(\xi(t)) \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{\xi(t)}, \quad A = X_{\xi}(t). \quad (4)$$

Deci coeficientul  $A$  este:

$$\begin{aligned} A(\xi) &= \left( -\xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^1} \Big|_{\xi} + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^2} \Big|_{\xi} \right) (t) = -\xi^2 \frac{\partial t}{\partial \xi^1} (\xi) + \xi^1 \frac{\partial t}{\partial \xi^2} (\xi) = \\ &= (-\xi^2) \cdot \frac{-(1 + \xi^1 + \xi^2) - (1 - \xi^1 + \xi^2)}{(1 + \xi^1 + \xi^2)^2} + \xi^1 \cdot \frac{(1 + \xi^1 + \xi^2) - (1 - \xi^1 + \xi^2)}{(1 + \xi^1 + \xi^2)^2} = \\ &= \frac{2\xi^2 + 2(\xi^1)^2 + 2(\xi^2)^2}{(1 + \xi^1 + \xi^2)^2} = \frac{2(1 + \xi^2)}{(1 + \xi^1 + \xi^2)^2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Ca funcție de  $t \in \mathbb{R}$  avem:

$$A(t) = \frac{2 \left( 1 + \frac{2t}{1+t^2} \right)}{\left( 1 + \frac{1+2t-t^2}{1+t^2} \right)^2} = \frac{2(1+t)^2(1+t^2)}{[2(1+t)]^2} = \frac{1+t^2}{2} \quad (6)$$

și deci expresia finală intrinsecă a lui  $X_{\xi} = (-\xi^2, \xi^1) = (-\sin x, \cos x) \in T_{\xi}(S^1 \setminus \{P\})$ ,  $\xi = (\cos x, \sin x)$  este:

$$X_{\xi} = -\xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^1} \Big|_{\xi} + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^2} \Big|_{\xi} = \frac{1+t^2}{2} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_x, \quad t = tg \frac{x}{2}. \quad (7)$$

În concluzie  $X_{\xi}$  este exact unicul vector din baza spațiului tangent indusă de harta trigonometrică!

**S11.3** Fie  $\xi = (\xi^1, \xi^2, \xi^3, \xi^4) \in M := S^3 \setminus \{N\}$  oarecare și vectorii din spațiul  $\mathbb{R}^4$ :

$$X_{\xi} := (-\xi^2, \xi^1, -\xi^4, \xi^3), \quad Y_{\xi} := (-\xi^3, \xi^4, \xi^1, -\xi^2), \quad Z_{\xi} := (-\xi^4, -\xi^3, \xi^2, \xi^1). \quad (8)$$

Acești vectori (ce sunt versori în  $\mathbb{R}^4$ ) aparțin planului tangent  $T_{\xi}M$  conform exprimării extrinseci (3):  $X_{\xi}, Y_{\xi}, Z_{\xi} \perp \xi$ . Se cere expresia intrinsecă a acestor vectori tangenți în harta stereografică  $h_N = (U_N, \varphi_N)$  folosind punctul  $\varphi_N(\xi) = u \in \mathbb{R}^3$ .

**Rezolvare** Mai întâi vom discuta schimbarea bazelor din spațiul tangent chiar pentru  $S^n \setminus \{N\}$ . Fie indicele  $i \in \{1, \dots, n\}$ . În spațiul tangent dat avem:

$$\frac{\partial}{\partial \xi^i} \Big|_{\xi} = \frac{\partial u^1}{\partial \xi^i} (\xi) \frac{\partial}{\partial u^1} \Big|_u + \dots + \frac{\partial u^n}{\partial \xi^i} (\xi) \frac{\partial}{\partial u^n} \Big|_u = \frac{1}{1 - \xi^{n+1}} \frac{\partial}{\partial u^i} \Big|_u. \quad (9)$$

Analog obținem:

$$\frac{\partial}{\partial \xi^{n+1}} \Big|_{\xi} = \frac{1}{(1 - \xi^{n+1})^2} \left[ \xi^1 \frac{\partial}{\partial u^1} + \dots + \xi^n \frac{\partial}{\partial u^n} \right]. \quad (10)$$

Prin urmare, exprimarea bazei extrinseci din  $T_\xi S^N$  în funcție de baza intrinsecă este:

$$\frac{\partial}{\partial \xi^i} |_\xi = \frac{1 + \|u\|^2}{2} \frac{\partial}{\partial u^i} |_u, \quad \frac{\partial}{\partial \xi^{n+1}} |_\xi = \frac{1 + \|u\|^2}{2} \left[ u^1 \frac{\partial}{\partial u^1} + \dots + u^n \frac{\partial}{\partial u^n} \right]. \quad (11)$$

Prin urmare:

$$\begin{aligned} X_\xi &= -\xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^1} |_\xi + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^2} |_\xi - \xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^3} |_\xi + \xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^4} |_\xi = \\ &= -\frac{2u^2}{1 + \|u\|^2} \frac{1 + \|u\|^2}{2} \frac{\partial}{\partial u^1} |_u + \frac{2u^1}{1 + \|u\|^2} \frac{1 + \|u\|^2}{2} \frac{\partial}{\partial u^2} |_u - \frac{\|u\|^2 - 1}{1 + \|u\|^2} \frac{1 + \|u\|^2}{2} \frac{\partial}{\partial u^3} |_u + \\ &\quad + \frac{2u^3}{1 + \|u\|^2} \frac{1 + \|u\|^2}{2} \left[ u^1 \frac{\partial}{\partial u^1} |_u + u^2 \frac{\partial}{\partial u^2} |_u + u^3 \frac{\partial}{\partial u^2} |_u \right] = \dots \end{aligned}$$

Expresia finală a acestor vectori tangenți este:

$$X_\xi = (-u^2 + u^1 u^3) \frac{\partial}{\partial u^1} |_u + (u^1 + u^2 u^3) \frac{\partial}{\partial u^2} |_u - \frac{1}{2} [(u^1)^2 + (u^2)^2 - (u^3)^2 - 1] \frac{\partial}{\partial u^3} |_u, \quad (12)$$

$$Y_\xi = (-u^3 - u^1 u^2) \frac{\partial}{\partial u^1} |_u + \frac{1}{2} [(u^1)^2 - (u^2)^2 + (u^3)^2 - 1] \frac{\partial}{\partial u^2} |_u + (u^1 - u^2 u^3) \frac{\partial}{\partial u^3} |_u, \quad (13)$$

$$Z_\xi = \frac{1}{2} [(u^1)^2 - (u^2)^2 - (u^3)^2 + 1] \frac{\partial}{\partial u^1} |_u + (-u^3 + u^1 u^2) \frac{\partial}{\partial u^2} |_u + (u^2 + u^1 u^3) \frac{\partial}{\partial u^3} |_u. \quad (14)$$

**Temă** Dacă  $\xi \in S^3 \setminus \{S\}$  obțineți expresia acestor vectori tangenți folosind harta  $h_S = (U_S, \varphi_S)$ .

**S11.4** În probleme **S11.2** versorul tangent în  $\xi$  la cercul unitate  $S^1$  s-a exprimat  $X_\xi = i \cdot \xi$ . Se cere aceeași exprimare pentru cei 3 versori tangenți la  $S^3$  din problema **S11.3**.

**Rezolvare** Spațiul vectorial  $\mathbb{R}^4$  se identifică cu algebra reală  $\mathbb{H}$  a cuaternionilor via:

$$\xi \in \mathbb{R} \leftrightarrow \xi = \xi^1 + \xi^2 i + \xi^3 j + \xi^4 k \in \mathbb{H}, \quad (15)$$

cu  $\{i, j, k\}$  unitățile complexe. Avem atunci imediat:

$$X_\xi = i \cdot \xi, \quad Y_\xi = j \cdot \xi, \quad Z_\xi = k \cdot \xi. \quad (16)$$

Ca și vectori tanenți la curbe pe sferă avem că acești versori sunt tangenți în  $t = 0$  la curbele:

$$\begin{cases} C_i : t \in \mathbb{R} \rightarrow (\cos t + i \sin t) \cdot \xi \in S^3, \\ C_j : t \in \mathbb{R} \rightarrow (\cos t + j \sin t) \cdot \xi \in S^3, \\ C_k : t \in \mathbb{R} \rightarrow (\cos t + k \sin t) \cdot \xi \in S^3. \end{cases} \quad (17)$$

Vom verifica doar faptul că  $C_i$  este pe sfera  $S^3$  pentru celelalte două curbe calculul fiind similar. Avem imediat:

$$C_i(t) = (\xi^1 \cos t - \xi^2 \sin t) + i(\xi^2 \cos t + \xi^1 \sin t) + j(\xi^3 \cos t - \xi^4 \sin t) + k(\xi^4 \cos t + \xi^3 \sin t) \quad (17)$$

și suma pătratelor parantezelor rotunde dă exact  $\|\xi\|_4^2 = 1$ .

**Observația 1** Vectorii tangenți  $X_\xi, Y_\xi, Z_\xi$  sunt chiar linear independenți deoarece:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} -\xi^2 & \xi^1 & -\xi^4 & \xi^3 \\ -\xi^3 & \xi^4 & \xi^1 & -\xi^2 \\ -\xi^4 & -\xi^3 & \xi^2 & \xi^1 \end{pmatrix}$$

este mai mic strict decât 3 dacă și numai dacă  $\xi = 0$  care nu aparține sferei  $S^3$ . În concluzie, cei 3 vectori constituie chiar o bază în  $T_\xi S^3$ !

**Observația 2** În spațiul ambiant  $\mathbb{R}^4$  avem că  $X_\xi, Y_\xi, Z_\xi$  sunt toți versori datorită apartenenței lui  $\xi$  la sfera  $S^3$ . În problema anterioară am obținut expresia lor intrinsecă folosind harta  $h_N$ . Să presupunem acum că baza lui  $T_\xi U_N$  natural asociată hărții  $h_N$  i.e.  $\left\{ \frac{\partial}{\partial u^1} | u, \frac{\partial}{\partial u^2} | u, \frac{\partial}{\partial u^3} | u \right\}$  ar fi ortonormată și să calculăm norma lui  $X_\xi$  folosind expresia intrinsecă (12):

$$\|X_\xi\|_{intrinsic}^2 = (-u^2 + u^1 u^3)^2 + (u^1 + u^2 u^3)^2 + \frac{1}{4} [(u^1)^2 + (u^2)^2 - (u^3)^2 - 1]^2 = \dots = \left( \frac{1 + \|u\|^2}{2} \right)^2. \quad (18)$$

Prin urmare, pentru a obține că  $X_\xi, Y_\xi, Z_\xi$  sunt și intrinsec versori (!) vom defini ca produs scalar pe fiecare spațiu tangent:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle |_{T_x S^n(R)} = \frac{4R^2}{(R^2 + \|u\|^2)^2} \langle \cdot, \cdot \rangle_{euclidian}. \quad (19)$$

Cu alte cuvinte, metrica Riemanniană=prima formă fundamentală a sferei  $S^n(R)$  ca hipersuprafață în  $\mathbb{R}^{n+1}$  este *conform euclidiană*:

$$g_{S^n(R)}(u) = \frac{4R^2}{(R^2 + \|u\|^2)^2} g_{euclidian}, \quad g_{ij}(S^n(R), u) = \frac{4R^2}{(R^2 + \|u\|^2)^2} \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (20)$$

**S11.5** Fie  $M^n = F^{-1}(0) \subset \mathbb{R}^{n+1}$  hipersuprafață regulată în  $\mathbb{R}^{n+1}$  definită de funcția netedă  $F \in C^\infty(\mathbb{R}^{n+1})$  ce este submersie pe  $M$ . Dat  $x \in M$  să se exprime extrinsec spațiul tangent  $T_x M \subset T_x \mathbb{R}^{n+1} \simeq \mathbb{R}^{n+1}$  folosind *vectorul gradient al lui F*:

$$\nabla F(x) = (F_1, \dots, F_{n+1})^t(x) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad F_i := \frac{\partial F}{\partial x^i}, \quad 1 \leq i \leq n+1. \quad (21)$$

**Rezolvare** Conform problemei **S11.1** avem  $T_x M = \ker dF(x)$  dar matricea linie a operatorului liniar  $dF(x)$  este exact transpusa matricii coloană a lui  $\nabla F(x)$ . În concluzie avem exprimarea extrinsecă:

$$T_x M = (\text{span}\{\nabla F(x)\})^\perp = \{u \in \mathbb{R}^{n+1}; \langle \nabla F(x), u \rangle_{n+1} = 0\}. \quad (22)$$

**S11.6** Fie vectorul  $x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ . Datorită formulei (22) suntem interesați de descompunerea în sumă directă:

$$\mathbb{R}^m = \text{span}\{x\} \oplus (\text{span}\{x\})^\perp; \quad \dim : m = 1 + (m-1). \quad (23)$$

Să se studieze această descompunere utilizând spațiile vectoriale matriceale  $Sym(m)$  și  $o(m)$  și să se aplice la hipersuprafețe regulate din  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

**Rezolvare** Vectorul nenul  $x$  considerat ca matrice coloană  $(m, 1)$  definește două aplicații:

$$\text{sym}(x; \cdot) : \mathbb{R}^m \simeq M_{m,1}(\mathbb{R}) \rightarrow Sym(m), \quad o(x; \cdot) : \mathbb{R}^m \simeq M_{m,1}(\mathbb{R}) \rightarrow o(m)$$

date de:

$$\text{sym}(x; y) := \frac{1}{\|x\|^2} (x \cdot y^t + y \cdot x^t), \quad o(x; y) := \frac{1}{\|x\|^2} (x \cdot y^t - y \cdot x^t). \quad (24)$$

Deoarece  $\text{sym}(x; x) = \frac{2}{\|x\|^2} x \cdot x^t$  avem că descompunerea (23) se exprimă prin:

$$\text{span}\{x\} = \mathbb{R} \cdot x = \{\lambda x; \lambda \in \mathbb{R}\}, \quad (\text{span}\{x\})^\perp = \text{Im}(I_m - \frac{1}{2}\text{sym}(x; x)) \quad (25)$$

i.e. vectorul oarecare  $u \in \mathbb{R}^m$  are descompunerea unică:

$$u = u_x^\parallel + u_x^\perp, \quad u_x^\parallel := \frac{\langle x, u \rangle}{\|x\|^2} x, \quad u_x^\perp = (I_m - \frac{1}{2}\text{sym}(x; x))(u). \quad (26)$$

De aici obținem și formula *reflecției față de hiperplanul*  $\pi(x)$  ce are pe  $x$  ca normală:

$$R_{\pi(x)} : u \in \mathbb{R}^m \rightarrow u - \frac{2 \langle x, u \rangle}{\|x\|^2} x \in \mathbb{R}^m, \quad u + R_{\pi(x)}(u) = 2u_x^\perp. \quad (27)$$

**Aplicația 1** Folosind formalismul problemei **S11.5** avem exprimarea extrinsecă a spațiului tangent al unei hipersuprafețe:

$$T_x M = \text{Im}(I_{n+1} - \frac{1}{2}\text{sym}(\nabla F(x); \nabla F(x))). \quad (28)$$

O a doua exprimare a subspațiului  $(\text{span}\{x\})^\perp$  este dată de:

**Propoziție**  $(\text{span}\{x\})^\perp = o(m) \cdot x$  i.e. dat  $y \in \mathbb{R}^m$  avem  $y \in (\text{span}\{x\})^\perp$  dacă și numai dacă există  $A \in o(m)$  a.î.  $y = A \cdot x$ .

**Demonstrație Suficiența** Presupunem că  $y = A \cdot x$  cu  $A \in o(m)$ . Avem imediat:

$$\langle x, y \rangle = \langle x, A \cdot x \rangle = \langle A^t \cdot x, x \rangle = \langle -A \cdot x, x \rangle = -\langle x, A \cdot x \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle = 0.$$

*Necesitatea* Vom arăta că dacă  $y \in (\text{span}\{x\})^\perp$  atunci  $o(x, y)(x) = -y$  de unde rezultă concluzia deoarece  $-o(x; y) \in o(m)$ . În adevăr, din  $y \in (\text{span}\{x\})^\perp$  rezultă:

$$o(x; y)(x) = \frac{1}{\|x\|^2} [x \cdot (y^t \cdot x) - y \cdot (x^t \cdot x)] = \frac{1}{\|x\|^2} [0 \cdot x - \|x\|^2 \cdot y] = -y$$

folosind  $y^t \cdot x = \langle x, y \rangle = 0$  și  $x^t \cdot x = \|x\|^2$ .

**Aplicația 2** A doua exprimare extrinsecă a spațiului tangent al unei hipersuprafețe este:

$$T_x M = o(n+1) \cdot \nabla F(x). \quad (29)$$

**S11.7** Să se aplice formulele anterioare la  $\xi \in S^n(R) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ .

**Rezolvare** Deoarece  $\nabla F(\xi) = 2\xi$  avem exprimările extrinseci:

$$T_\xi S^n(R) = \text{Im}(I_{n+1} - 2\text{sym}(\xi; \xi)) = o(n+1) \cdot \xi. \quad (30)$$

**Caz particular**  $n = 1$  Știm expresia generală a spațiului vectorial  $o(2)$  din problema **S8.7**:

$$A = A(t) = \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix} = tJ$$

cu  $J$  structura aproape complexă a planului din problema **S10.4**. În concluzie:

$$T_\xi S^1(R) = \mathbb{R} \cdot J(\xi) = \mathbb{R} \cdot (i\xi) = \mathbb{R} \cdot (-\xi^2, \xi^1). \quad (31)$$

Obținem deci și o exprimare a fibratului tangent ca varietate 2-dimensională:

$$TS^1(R) = \cup_{\xi \in S^1(R)} (\mathbb{R} \cdot (-\xi^2, \xi^1)) = \{Rt(-\sin x, \cos x) \in \mathbb{R}^2; (x, t) \in \mathbb{R}^2\}. \quad (32)$$

**S11.8** Având în vedere formula (29) să se exprime vectorii tangenți  $X_\xi, Y_\xi, Z_\xi$  folosind  $o(4)$ .

**Rezolvare** Avem:

$$X_\xi = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \xi, Y_\xi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \xi, Z_\xi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \xi \quad (33)$$

și toate cele 3 matrici aparțin spațiului vectorial  $o(4)$ . Deci vectorul generic  $u \in T_\xi S^3$  are expresia  $u = u(a, b, c) := aX_\xi + bY_\xi + cZ_\xi$  cu  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  și:

$$u(a, b, c) = \begin{pmatrix} 0 & -a & -b & -c \\ a & 0 & -c & b \\ b & c & 0 & -a \\ c & -b & a & 0 \end{pmatrix} \cdot \xi. \quad (34)$$

Dacă identificăm prima coloană cu cuaternionul (pur complex)  $C_1 = q := ai + bj + ck$  avem că celelalte coloane sunt:

$$C_2 = q \cdot i, \quad C_3 = q \cdot j, \quad C_4 = q \cdot k. \quad (35)$$

În concluzie, fibratul tangent al sferei  $S^3$  este varietatea 6-dimensională:

$$TS^3 = \{(q, q \cdot i, q \cdot j, q \cdot k) \cdot \xi; q \in \{0\} \times \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{H}, \xi \in S^3 \subset \mathbb{R}^4 = \mathbb{H}\}. \quad (36)$$

**S11.9** Pentru  $n \in \mathbb{N}^*$  să se caracterizeze sfera unitară de dimensiune impară  $S^{2n-1}$  folosind produsul scalar Hermitian  $\langle \cdot, \cdot \rangle_H: \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ :

$$\langle z, w \rangle_H := z^1 \bar{w}^1 + \dots + z^n \bar{w}^n, \quad z = (z^1, \dots, z^n) \in \mathbb{C}^n, \quad w = (w_1, \dots, w^n) \in \mathbb{C}^n. \quad (37)$$

**Rezolvare** Avem:

$$\langle w, z \rangle_H = \overline{\langle z, w \rangle_H}, \quad \langle z, z \rangle_H = |z^1|^2 + \dots + |z^n|^2 \quad (38)$$

de unde rezultă:

$$S^{2n-1} = \{z \in \mathbb{C}^n; \langle z, z \rangle_H = 1\} \quad (39)$$

și pentru  $\xi \in S^{2n-1} \subset \mathbb{C}^n$  avem exprimarea extrinsecă a spațiului vectorial tangent:

$$T_\xi S^{2n-1} = \{z \in \mathbb{C}^n; \Re(\langle z, \xi \rangle_H) = 0\}. \quad (40)$$

Deoarece partea reală a unui număr complex coincide cu partea reală a conjugatului său obținem o *dualitate extrinsecă* a spațiilor tangente unitare specifică sferei: dacă  $z \in T_\xi S^m \cap S^m$  atunci și  $\xi \in T_z S^m \cap S^m$  pentru orice  $m \in \mathbb{N}^*$ !

## Cursul 22

# Seminar 12 (2021): Aplicația liniară tangentă și aplicația liniară cotangentă

### SEMINAR 12

**S12.1** Fie varietatea  $M^n$  și punctul  $p \in M$  oarecare. Pentru aplicația netedă  $1_M : M \rightarrow M$  se cere  $T1_M(p) = d1_M(p) : T_pM \rightarrow T_pM$  și  $T^*1_M(p) : T_p^*M \rightarrow T_p^*M$ .

**Rezolvare** Fixăm pe  $M$  harta locală  $h = (U, \varphi)$  cu  $p \in U$ . Atunci exprimarea locală a funcției date este:

$$\varphi \circ 1_M \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n : x \rightarrow x.$$

Prin urmare  $\varphi \circ 1_M \circ \varphi^{-1} = 1_{\varphi(U)}$  și deci:

$$T1_M(p) = 1_{T_pM}, \quad T^*1_M(p) = 1_{T_p^*M}.$$

**S12.2** Se cere aplicația liniară tangentă  $dF$  asociată funcției netede (și holomorfe)  $F : \mathbb{C}^* = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $F(z) = z^2$ . Generalizare:  $F(z) = z^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  cu  $n \geq 2$ .

**Rezolvare** În coordonate polare aplicația  $F(r, \varphi) = (\tilde{r}, \tilde{\varphi}) := (r^2, 2\varphi)$  are Jacobianul:

$$JF(r, \varphi) = \begin{pmatrix} 2r & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \text{diag}(r, 1). \quad (1)$$

Prin urmare, folosind și formulele din exercițiul **S10.2** avem:

$$dF(r, \varphi) \left( \frac{\partial}{\partial r} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{r}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{\varphi}} \right) \cdot 2 \text{diag}(r, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2r \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} = 2\sqrt{\tilde{r}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} = \frac{2}{\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} \left( \tilde{x} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + \tilde{y} \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right).$$

$$dF(r, \varphi) \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{r}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{\varphi}} \right) \cdot 2 \text{diag}(r, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \frac{\partial}{\partial \tilde{\varphi}} = 2 \left( -\tilde{y} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + \tilde{x} \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right).$$

În coordonate carteziene aplicația  $F(x, y) = (\tilde{x}, \tilde{y}) := (x^2 - y^2, 2xy)$  are Jacobianul:

$$JF(x, y) = 2 \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}. \quad (2)$$

$$dF(x, y) \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{x}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right) \cdot 2 \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{x}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \left( x \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + y \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right).$$

$$dF(x, y) \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{x}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right) \cdot 2 \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{x}}, \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right) \cdot \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = 2 \left( -y \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + x \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right).$$

Ultimele două relații se pot exprima și prin:

$$dF(x, y) \left( \frac{\partial}{\partial x} \right) = 2\sqrt{\tilde{r}} \left( \cos \frac{\tilde{\varphi}}{2} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + \sin \frac{\tilde{\varphi}}{2} \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right), \quad dF(x, y) \left( \frac{\partial}{\partial y} \right) = 2\sqrt{\tilde{r}} \left( -\sin \frac{\tilde{\varphi}}{2} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} + \cos \frac{\tilde{\varphi}}{2} \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \right).$$

Pentru generalizare tratăm doar prima parte a problemei: din  $F(r, \varphi) = (\tilde{r}, \tilde{\varphi}) := (r^n, n\varphi)$  rezultă  $JF(r, \varphi) = n \operatorname{diag}(r^{n-1}, 1)$ . Rezultă:

$$dF(r, \varphi) \left( \frac{\partial}{\partial r} \right) = nr^{n-1} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} = n\tilde{r}^{\frac{n-1}{n}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}}, \quad dF(r, \varphi) \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) = n \frac{\partial}{\partial \tilde{\varphi}}.$$

**S12.3** Fixăm  $a \in \mathbb{R}^*$  și vectorul  $b \in \mathbb{R}^n$ . Fie aplicația netedă  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $F(x) = ax + b$ . Dat  $p \in \mathbb{R}^n$  se cere  $dF(p) : T_p \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \rightarrow T_{\tilde{p}} \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$ .

**Rezolvare** Avem  $\tilde{p} = ap + b$  și Jacobianul aplicației date este:

$$JF(x) = aI_n, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Prin urmare avem:

$$dF(p) \left( u^1 \frac{\partial}{\partial p^1} \Big|_p + \dots + u^n \frac{\partial}{\partial p^n} \Big|_p \right) = \left( \frac{\partial}{\partial \tilde{p}^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \tilde{p}^n} \right) \cdot aI_n \cdot \begin{pmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^n \end{pmatrix} = a \left( u^1 \frac{\partial}{\partial \tilde{p}^1} \Big|_{\tilde{p}} + \dots + u^n \frac{\partial}{\partial \tilde{p}^n} \Big|_{\tilde{p}} \right).$$

**S12.4** Fie funcția netedă  $f : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $f(z) = z^2$  i.e.  $f(e^{ix}) = e^{2ix}$ . Să se studieze această funcție în atlasul trigonometric al problemei **S8.5**.

**Rezolvare** În harta trigonometrică avem  $f_\varphi := \varphi \circ f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\} \rightarrow \mathbb{R}$  dată de:

$$t \rightarrow \varphi^{-1} \left( \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) = (\cos x, \sin x) \xrightarrow{f} (\cos 2x, \sin 2x) \xrightarrow{\varphi} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{2t}{1-t^2}.$$

Semnificația eliminării valorii  $t = \pm 1$  de la numitorul ultimei fracții este dat de faptul că  $\varphi^{-1}(\pm 1) = (0, \pm 1) = \pm i$  și  $f(\pm i) = P(0, -1)$  punctul scos din deschisul domeniu al hărții trigonometrice!

Avem:

$$(f_\varphi)'(t) = 2 \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} > 0$$

ceea ce spune că  $f_\varphi$  este funcție strict crescătoare.



**S12.5** Fie funcția netedă  $f : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $f(z) = i \cdot z$  i.e.  $f(e^{ix}) = e^{i(x+\frac{\pi}{2})}$ . Să se studieze această funcție în atlasul trigonometric al problemei **S8.5**.

**Rezolvare** În harta trigonometrică avem  $f_\varphi := \varphi \circ f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  dată de:

$$\begin{aligned} t \xrightarrow{\varphi^{-1}} \left( \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) &= (\cos x, \sin x) \xrightarrow{f} \left( \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right) \xrightarrow{\varphi} \frac{\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} = \\ &= \frac{\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2}} = \frac{1+t}{1-t}. \end{aligned}$$

Semnificația eliminării valorii  $t = 1$  de la numitorul ultimei fracții este dat de faptul că  $\varphi^{-1}(1) = (0, 1) = i$  și  $f(i) = P(0, -1)$  punctul scos din deschisul domeniu al hărții trigonometrice!

Avem:

$$(f_\varphi)'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$$

ceea ce spune că  $f_\varphi$  este funcție strict crescătoare.

**S12.6** Fie  $U$  deschis nevid din  $\mathbb{R}^n$  și funcția  $f \in C^\infty(U)$ . Hessiana lui  $f$  este aplicația  $H^f : U \rightarrow \text{Sym}(n)$  dată de  $H^f(x) = (H_{ij}^f(x))_{i,j=1,\dots,n}$  cu:

$$H_{ij}^f := \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} = H_{ji}^f. \quad (3)$$

Se cere Hessiana funcției *pătratul normei euclidiene* i.e. a funcției  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,  $f(x) = \|x\|^2$ .

**Rezolvare** Avem imediat  $H^f(x) = 2I_n$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}^n$ . Deci considerată ca aplicație Hessiana lui  $f$  este constantă.

**S12.7** Fie aplicația netedă  $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ ,  $F(x) = -x$  a cărei restricție  $\mathcal{A} = F|_{S^n} : S^n \rightarrow S^n$  o numim *aplicația antipodală*. Să se studieze această aplicație în atlasul dat de proiecțiile stereografice din cei doi poli.

**Rezolvare** În raport cu cele două hărți avem  $\varphi_N \circ \mathcal{A} \circ \varphi_S^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  dată de:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n \ni u \xrightarrow{\varphi_S^{-1}} \frac{1}{1+\|u\|_n^2} (2u, 1-\|u\|_n^2) &\xrightarrow{\mathcal{A}} \frac{1}{1+\|u\|_n^2} (-2u, \|u\|_n^2-1) \xrightarrow{\varphi_N} \\ &= \frac{1}{1-\frac{\|u\|_n^2-1}{\|u\|_n^2+1}} \cdot -\frac{2u}{1+\|u\|_n^2} = -u. \end{aligned}$$

Prin urmare,  $\mathcal{A}$  este aplicație netedă și deoarece:

$$d(\varphi_N \circ \mathcal{A} \circ \varphi_S^{-1})(u) : T_u \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \rightarrow T_{-u} \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$$

este:

$$d(\varphi_N \circ \mathcal{A} \circ \varphi_S^{-1})(u) = -I_n \in GL(n, \mathbb{R})$$

pentru orice  $u \in \mathbb{R}^n$  avem că  $\mathcal{A}$  este chiar un difeomorfism al sferei  $S^n$  cu  $\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}$  și diferențiala:

$$d(\varphi_N \circ \mathcal{A} \circ \varphi_S^{-1})(u)(X_u \in T_u \mathbb{R}^n) = -X_{-u} \in T_{-u} \mathbb{R}^n.$$

**S12.8** Să se studieze aplicația antipodală pe cercul  $S^1 \setminus \{P(-1, 0)\}$  folosind atlasul trigonometric.

**Rezolvare** Expresia locală  $\mathcal{A}_\varphi := \varphi \circ \mathcal{A} \circ \varphi^{-1}$  lui  $\mathcal{A}$  în harta trigonometrică este:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^* \ni t &\rightarrow \varphi^{-1} \left( \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) \rightarrow \mathcal{A} \left( \frac{t^2-1}{1+t^2}, \frac{-2t}{1+t^2} \right) \rightarrow \varphi \frac{1 - \frac{t^2-1}{t^2+1} - \frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{t^2-1}{t^2+1} - \frac{2t}{1+t^2}} = \\ &= \frac{t^2 + 1 - t^2 + 1 - 2t}{t^2 + 1 + t^2 - 1 - 2t} = \frac{2(1-t)}{2t(t-1)} = -\frac{1}{t}. \end{aligned}$$

Să observăm că punctul  $\tilde{t} = 0$  se duce prin  $\varphi^{-1}$  în  $(1, 0)$  care prin aplicația antipodală  $\mathcal{A}$  se duce exact în punctul  $P$  pe care nu-l considerăm! Prin urmare,  $\mathcal{A}$  este aplicație netedă cu diferențiala:

$$d(\mathcal{A}_\varphi)(t) = (\mathcal{A}_\varphi)'(t) = \frac{1}{t^2} > 0$$

Deci  $\mathcal{A}$  este chiar difeomorfism pe  $S^1 \setminus \{P, 1 = (1, 0)\}$  cu  $\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}$  și  $\mathcal{A}_\varphi$  funcție strict crescătoare.

Reamintim că pentru parametrizarea trigonometrică  $(\cos x, \sin x)$  a lui  $S^1$  avem  $t = tg \frac{x}{2}$ . Deci  $\mathcal{A}_\varphi(t) = \tilde{t} = -\frac{1}{t}$  cu  $\tilde{t} = tg \frac{\tilde{x}}{2}$ . Rezultă:

$$tg \frac{\tilde{x}}{2} = -\frac{1}{tg \frac{x}{2}} = -ctg \frac{x}{2}$$

și această ecuație trigonometrică în  $\tilde{x}$  are soluțiile:

$$\frac{\tilde{x}}{2} = \frac{x}{2} \pm \frac{\pi}{2} \rightarrow \tilde{x} = x \pm \pi.$$

Rezultă  $\mathcal{A}(\cos x, \sin x) = (\cos \tilde{x}, \sin \tilde{x}) = (\cos(x \pm \pi), \sin(x \pm \pi)) = -(\cos x, \sin x)$  exact cum era de așteptat!

**S12.9** Să se studieze  $n$ -grupul ortogonal  $O(n)$  ca subvarietate regulată în  $M_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n^2}$ .

**Rezolvare** Funcția  $F : M_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow Sym(n) = \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$ ,  $F(X) = X^t \cdot X - I_n$  este evident netedă (fiind polinomială de gradul 2) și avem  $O(n) = F^{-1}(O_n)$  cu  $O_n =$ matricea nulă. Fixăm  $X \in M_n(\mathbb{R})$  și calculăm  $dF(X) : T_X M_n(\mathbb{R}) \simeq M_n(\mathbb{R}) \rightarrow T_{F(X)} Sym(n) \simeq Sym(n)$ :

$$\begin{aligned} dF(X)(A) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [F(X + tA) - F(X)] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(X + tA)^t \cdot (X + tA) - X^t \cdot X] = \\ &= A^t \cdot X + X^t \cdot A = X^t \cdot A + (X^t \cdot A)^t. \end{aligned} \quad (3)$$

Să arătăm că  $dF(X)$  este surjectivă pe  $O(n)$ : pentru  $X \in O(n)$  și  $B \in Sym(n)$  ecuația matriceală  $dF(X)(A) = B = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}B^t$  cu necunoscuta  $A$  are soluția unică:

$$X^t \cdot A = \frac{1}{2}B \rightarrow A = \frac{1}{2}X \cdot B.$$

Prin urmare  $F|_{O(n)}$  este submersie și deci  $O(n)$  este subvarietate regulată în  $M_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n^2}$  de dimensiune:  $n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ , exact ceea ce știam din problema **S8.7**. Mai mult, spațiul tangent în elementul neutru al acestui grup Lie este:

$$T_{I_n} O(n) = \ker dF(I_n) = o(n) \quad (4)$$

înlocuind  $X = I_n$  în formula (3). Pentru  $X \in O(n)$  arbitrar avem:

$$T_X O(n) = X \cdot o(n). \quad (5)$$

**S12.10** Fie  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $F(u, v) = (x, y, z) := (u+v, u^2-v^2, 2uv)$ ; avem  $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ . Fie  $\theta \in \Omega^1(\mathbb{R}^3)$ ,  $\theta = \alpha dx + \beta dy + \gamma dz$  i.e. pentru orice  $\tilde{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  avem  $\theta(\tilde{p}) = \alpha(\tilde{p})dx|_{\tilde{p}} + \beta(\tilde{p})dy|_{\tilde{p}} + \gamma(\tilde{p})dz|_{\tilde{p}} \in T_{\tilde{p}}^*\mathbb{R}^3$ . Dat  $p = (u, v) \in \mathbb{R}^2$  cu  $F(p) = \tilde{p}$  se cere  $F_p^*[\theta(\tilde{p})] \in T_p^*\mathbb{R}^2$ .

**Soluție**  $F^*\theta = \alpha(\tilde{p}(p))d(u+v)|_p + \beta(\tilde{p}(p))d(u^2-v^2)|_p + \gamma(\tilde{p}(p))d(2uv)|_p = [\alpha(u, v) + 2\beta(u, v)u + 2\gamma(u, v)v]du|_p + [\alpha(u, v) - 2\beta(u, v)v + 2\gamma(u, v)u]dv|_p$ .



## Cursul 23

# Seminar 13 (2021): Algebra Lie a câmpurilor vectoriale

### SEMINAR 13

$$\mathfrak{X}(M^n) \ni X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j} \rightarrow [X, Y] := [X, Y]^k \frac{\partial}{\partial x^k}, \quad [X, Y]^k := X(Y^k) - Y(X^k).$$

**S13.1** Fie varietatea 1-dimensională  $M$  și  $A, B \in \mathfrak{X}(M)$  cu expresia locală  $A = a(x) \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $B = b(x) \frac{\partial}{\partial x}$  cu  $a$  și  $b$  funcții nenule. În ce condiții aceste câmpuri vectoriale comută?

**Rezolvare** Avem:  $[A, B] = [a(x)b'(x) - b(x)a'(x)] \frac{\partial}{\partial x}$  și deci  $[A, B] = 0$  dacă și numai dacă  $ab' = a'b$ . Putem scrie această condiție sub forma:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b}$$

și prin integrare rezultă proporționalitatea celor două funcții:  $b(x) = Ca(x)$  cu  $C > 0$  o constantă.

**S13.2** Fie varietatea  $\mathbb{C}^* = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  și câmpurile vectoriale  $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$  exprimate în relațiile (4) din problema **S10.2** în funcție de câmpurile vectoriale  $\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \varphi}$ . Să se verifice pe această cale comutarea  $[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}] = 0$ .

**Rezolvare** Avem:

$$\begin{aligned} \left[ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right] &= \left[ \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] = \\ &= \cos \varphi \left( -\frac{\cos \varphi}{r^2} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{\sin \varphi}{r} \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ &+ \sin \varphi \left( -\frac{\sin \varphi}{r^2} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{\cos \varphi}{r} \left( -\sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) = 0. \end{aligned}$$

**S13.3** Invers, folosind expresia câmpurilor vectoriale  $\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \varphi}$  în funcție de câmpurile vectoriale  $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$  să se verifice comutarea  $[\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \varphi}] = 0$ .

**Rezolvare** Avem:

$$\begin{aligned} \left[ \frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] &= \left[ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}, -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right] = \\ &= y \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial y} - x \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial y} + \\ &\quad + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} = 0. \end{aligned}$$

În adevăr, coeficienții câmpurilor vectoriale  $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$  sunt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} : -\frac{y}{r} + \frac{y^3}{r^3} + \frac{x^2 y}{r^3} &= \frac{-y + y}{r} = 0, \\ \frac{\partial}{\partial y} : \frac{x}{r} + \frac{-y^2 x}{r^3} + \frac{-x^3}{r^3} &= \frac{x - x}{r} = 0. \end{aligned}$$

**S13.4** Conform problemei **S11.3** pe sfera  $S^3$  avem câmpurile vectoriale globale:

$$\begin{cases} X := -\xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^1} + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^2} - \xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^3} + \xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^4}, \\ Y := -\xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^1} + \xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^2} + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^3} - \xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^4}, \\ Z := -\xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^1} - \xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^2} + \xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^3} + \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^4}. \end{cases} \quad (1)$$

Să se arate că  $\{X, Y, Z\}$  formează o subalgebră Lie a algebei Lie  $\mathfrak{X}(S^3)$ .

**Rezolvare** Avem:

$$[X, Y] = -\xi^2 \frac{\partial}{\partial \xi^3} + \xi^1 \left( -\frac{\partial}{\partial \xi^4} \right) + \xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^1} + \xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^2} + \xi^3 \frac{\partial}{\partial \xi^2} + \xi^4 \frac{\partial}{\partial \xi^1} - \xi^1 \frac{\partial}{\partial \xi^4} + \xi^2 \left( -\frac{\partial}{\partial \xi^3} \right) = -2Z. \quad (2)$$

Prin permutări circulare obținem:

$$[Y, Z] = -2X, \quad [Z, X] = -2Y \quad (3)$$

și deci avem concluzia: croșetul Lie a oricăror două din cele 3 câmpuri vectoriale aparține lui  $\text{span}\{X, Y, Z\}$ .

**S13.5** O matrice oarecare  $A \in M_n(\mathbb{R})$  definește câmpul vectorial liniar  $V_A \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$  prin:

$$V_A(x) = (A \cdot x)^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x = (a_j^i x^j) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x, \quad x = (x^1, \dots, x^n)^t \in \mathbb{R}^n, \quad A = (a_j^i)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Să se arate că mulțimea câmpurilor vectoriale liniare pe  $\mathbb{R}^n$  constituie o subalgebră Lie în algebra Lie  $(\mathfrak{X}(\mathbb{R}^n), [\cdot, \cdot])$  anti-izomorfă cu algebra Lie  $(L(GL(n, \mathbb{R})) = gl(n, \mathbb{R}) = M_n(\mathbb{R}), [\cdot, \cdot])$  i.e.:

$$[V_A, V_B] = -V_{[A, B]}, \quad [A, B] := A \cdot B - B \cdot A. \quad (4)$$

**Rezolvare** Avem:

$$[V_A, V_B] = a_j^i x^j \left( b_i^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right) - b_j^i x^j \left( a_i^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right) = -[(a_i^k b_j^i - b_i^k a_j^i) x^j] \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_x =$$

$$= -([A, B]_j^k x^j) \frac{\partial}{\partial x^i} = -V_{[A, B]}.$$

Câmpul vectorial Euler  $E \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$  este:

$$E := x^i \frac{\partial}{\partial x^i} = V_{I_n} \quad (5)$$

și avem:  $[\frac{\partial}{\partial x^a}, E] = \frac{\partial}{\partial x^a}$  pentru  $1 \leq a \leq n$ . Mai mult, deoarece matricea unitate comută cu orice altă matrice avem că pentru orice câmp vectorial liniar  $[V_A, E] = 0$ .

**S13.6** Pentru  $n = 2$  am scris expresia lui  $E$  în coordonate polare și coordonate complexe în problema **S10.3**. Se cer câmpurile  $[\frac{\partial}{\partial r}, E]$  și  $[\frac{\partial}{\partial \varphi}, E]$  și expresiile acestor paranteze Lie în coordonate carteziene.

**Rezolvare** Deoarece  $[\frac{\partial}{\partial r}, E = r \frac{\partial}{\partial r}] = \frac{\partial}{\partial r}$  rezultă:

$$\left[ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}, x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right] = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}.$$

Analog din  $[\frac{\partial}{\partial \varphi}, E = r \frac{\partial}{\partial r}] = 0$  rezultă:

$$\left[ -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right] = 0.$$

**Temă** Efectuați direct în coordonate carteziene calculul ultimelor două formule!

**S13.7** Să se reobțină croșetele Lie din problema **S13.4** scriind  $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(S^3)$  ca pe câmpuri vectoriale liniare și folosind formula (4).

**Rezolvare** În problema **S11.8** am scris  $X, Y, Z$  ca fiind:  $X = V_A, Y = V_B, Z = V_C$ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avem imediat:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = C$$

și folosind anti-simetria acestor matrici:

$$B \cdot A = (-B^t) \cdot (-A^t) = B^t \cdot A^t = (A \cdot B)^t = C^t = -C$$

ceea ce spune că:

$$[A, B] = C - (-C) = 2C \rightarrow [X, Y] = [V_A, V_B] = -V_{[A, B]} = -V_{2C} = -2V_C = -2Z$$

adică relația (2). Prin permutări circulare obținem (3).

**S13.8** Fie  $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ ,  $X = yz \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $Y = zx \frac{\partial}{\partial y}$ ,  $Z = xy \frac{\partial}{\partial z}$ . Să se verifice pe aceste câmpuri vectoriale *identitatea Jacobi*:

$$[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0. \quad (6)$$

**Rezolvare** Avem:

$$[X, Y] = yz \frac{\partial}{\partial y} - zx \frac{\partial}{\partial x} = z^2 \left( y \frac{\partial}{\partial y} - x \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

Prin permutări circulare avem și:

$$[Y, Z] = x^2 \left( z \frac{\partial}{\partial z} - y \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad [Z, X] = y^2 \left( x \frac{\partial}{\partial x} - z \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Prin urmare:

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z] &= [yz^2 \frac{\partial}{\partial y} - xz^2 \frac{\partial}{\partial x}, xy \frac{\partial}{\partial z}] = \\ &= yz^2 x \frac{\partial}{\partial z} - xz^2 y \frac{\partial}{\partial z} - xy 2yz \frac{\partial}{\partial y} + xy 2xz \frac{\partial}{\partial x} = 2x^2 yz \frac{\partial}{\partial x} - 2xy^2 z \frac{\partial}{\partial y}. \end{aligned} \quad (7)$$

Prin permutări circulare avem:

$$[[Y, Z], X] = 2xy^2 z \frac{\partial}{\partial y} - 2xyz^2 \frac{\partial}{\partial z}, \quad [[Z, X], Y] = -2x^2 yz \frac{\partial}{\partial x} + 2xyz^2 \frac{\partial}{\partial z}. \quad (8)$$

Adunăm (7) cu cele două relații (8) și obținem zero.

**S13.9** Aceeași cerință ca la problema anterioară dar pentru câmpurile vectoriale:

$$X = yz \frac{\partial}{\partial x}, \quad Y = \alpha zx \frac{\partial}{\partial y}, \quad Z = \beta xy \frac{\partial}{\partial z}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

**Rezolvare TEMĂ!**

**S13.10** Fie varieta  $\mathbb{R}$ . Câmpurile vectoriale  $X = \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $Y = x \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $Z = x^2 \frac{\partial}{\partial x}$  constituie o reprezentare a algebrei Lie  $sl(2, \mathbb{R})$ .

**Rezolvare** Avem:

$$[X, Y] = X, \quad [Y, Z] = Z, \quad [Z, X] = -2Y.$$



## Cursul 24

# Seminar 14 (2021): Fluxul unui câmp vectorial

### SEMINAR 14

**S14.1** Se cere fluxul câmpului vectorial unghiular  $\frac{\partial}{\partial\varphi} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$  dat de formula (3) din problema **S10.2**:

$$\frac{\partial}{\partial\varphi} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}.$$

Să se arate că acest câmp vectorial este invariabil de grupul său 1-parametric  $(\phi_t)_t$ .

**Rezolvare** Avem sistemul diferențial cu data inițială  $x(0) = x_0, y(0) = y_0$ :

$$\begin{cases} \dot{x} := \frac{dx}{dt} = -y \\ \dot{y} := \frac{dy}{dt} = x. \end{cases}$$

Derivând prima ecuație din nou rezultă:

$$\ddot{x} = -x$$

despre care știm soluția generală:  $x(t) = A \cos t + B \sin t$  și din datele inițiale avem:  $A = x(0) = x_0, B = \dot{x}(0) = -y_0$  și deci:

$$x(t) = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad y(t) = y_0 \cos t + x_0 \sin t.$$

În concluzie, fluxul câmpului vectorial unghiular este:

$$\phi_t : p(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \tilde{p}(x \cos t - y \sin t, y \cos t + x \sin t) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$$

pentru orice  $t \in \mathbb{R}$  deci câmpul vectorial unghiular este complet. Avem legea de conservare:

$$x^2(t) + y^2(t) = x(0)^2 + y(0)^2 = R^2, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

În coordonate polare avem sistemul diferențial:

$$\begin{cases} \dot{r} = 0 \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}$$

cu soluția:  $r(t) = \text{constant} = R > 0$ ,  $\varphi(t) = t \in [0, 2\pi]$ ; deci curbele integrale ale câmpului vectorial unghiular sunt cercuri centrate în origine.

Să mai observăm că sistemul diferențial în coordonate carteziene este liniar:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -J \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

cu  $J$ =structura aproape complexă a planului punctat din problema **S10.4**.

Difeomorfismului  $\phi_t$  al varietății  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  îi asociem aplicația liniară tangentă  $(\phi_t)_{*,p} : TpM \rightarrow T_{\bar{p}}M$  dată de matricea sa Jacobiană:

$$\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \in SO(2)$$

și deci:

$$(\phi_t)_{*,p}(X_p) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\bar{p}} \\ y_{\bar{p}} \end{pmatrix} = X_{\bar{p}}$$

ceea ce arată invarianța lui  $X$  la acțiunea grupului 1-parametric  $(\phi_t)_t \in \mathbb{R}$ .

**S14.2** Se cere fluxul câmpului vectorial Euler  $E \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2 \setminus \{O\})$ :

$$E = r \frac{\partial}{\partial r} = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}.$$

Să se arate că acest câmp vectorial este invariant de grupul său 1-parametric  $(\phi_t)_t$ .

**Rezolvare** Avem sistemul diferențial cu data inițială  $x(0) = x_0$ ,  $y(0) = y_0$ :

$$\begin{cases} \dot{x} := \frac{dx}{dt} = x \\ \dot{y} := \frac{dy}{dt} = y, \end{cases}$$

cu soluția  $x(t) = x_0 e^t$ ,  $y(t) = y_0 e^t$ . Deci fluxul lui  $E$  este:

$$\phi_t : p(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \tilde{p}(e^t(x, y)) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$$

pentru orice  $t \in \mathbb{R}$  și deci  $E$  este câmp vectorial complet. Avem legea de conservare (pentru  $x(0) \neq 0$ ):

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{y(0)}{x(0)}, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

În coordonate polare avem sistemul diferențial:

$$\begin{cases} \dot{r} = r \\ \dot{\varphi} = 0 \end{cases}$$

cu soluția  $r(t) = r_0 e^t$ ,  $\varphi(t) = \text{constant} = \varphi_0$ ; deci curbele integrale ale lui  $E$  sunt dreptele prin origine (dar fără  $O$ ) de pantă  $\varphi_0$ .

Difeomorfismului  $\phi_t$  al varietății  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$  îi asociem aplicația liniară tangentă  $(\phi_t)_{*,p} : TpM \rightarrow T_{\bar{p}}M$  dată de matricea sa Jacobiană:

$$\begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = e^t I_2$$

și deci:

$$(\phi_t)_{*,p}(E_p) = e^t I_2 \cdot \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix} = e^t(x_p, y_p) = \begin{pmatrix} x_{\bar{p}} \\ y_{\bar{p}} \end{pmatrix} = X_{\bar{p}}$$

ceea ce arată invarianța lui  $E$  la acțiunea grupului 1-parametric  $(\phi_t)_t \in \mathbb{R}$ .

**S14.3** Să se verifice comutarea  $\left[\frac{\partial}{\partial\varphi}, E = r\frac{\partial}{\partial r}\right] = 0$  prin comutarea fluxurilor asociate:

$$\phi_t^{\frac{\partial}{\partial\varphi}} \circ \phi_s^E = \phi_s^E \circ \phi_t^{\frac{\partial}{\partial\varphi}}.$$

**Rezolvare** Avem:

$$(x, y) \xrightarrow{\phi^{\frac{\partial}{\partial\varphi}}} (x \cos t - y \sin t, y \cos t + x \sin t) \xrightarrow{\phi^E} e^s(x \cos t - y \sin t, y \cos t + x \sin t).$$

Analog:

$$(x, y) \xrightarrow{\phi^E} e^s(x, y) \xrightarrow{\phi^{\frac{\partial}{\partial\varphi}}} e^s(x \cos t - y \sin t, y \cos t + x \sin t)$$

și se observăm că avem același rezultat final.

**S14.4** Este *complet* orice câmp vectorial  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ ?

**Rezolvare** Fie  $X = x^2 \frac{\partial}{\partial x}$  și  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Curba integrală a lui  $X$  prin  $x_0$  este soluția unică a problemei Cauchy:

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = x_0.$$

Din  $\dot{x}/x^2 = 1$  prin integrare avem:

$$-\frac{1}{x(t)} = t + C$$

cu  $C$  constanta de integrare. Prin urmare:

$$x(t) = -\frac{1}{t + C}, \quad x_0 = -\frac{1}{C}$$

ceea ce spune că trebuie să considerăm doar  $x_0 \neq 0$  și avem:

$$C = -\frac{1}{x_0}$$

ceea ce dă soluția finală:

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}.$$

Datorită expresiei de la numitor această curbă nu este definită în  $\tilde{t} = \frac{1}{x_0}$  deci câmpul vectorial  $X$  **nu** este complet. În concluzie, răspunsul problemei este negativ!

**Observație** Dacă varietatea  $M$  este compactă atunci orice câmp vectorial pe  $M$  este complet!

**S14.5** Se cere fluxul câmpului vectorial  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ :

$$X = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}.$$

**Rezolvare** Avem sistemul diferențial:

$$\dot{x} = x, \quad \dot{y} = -y, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

cu soluția:

$$x(t) = e^t x_0, \quad y(t) = e^{-t} y_0$$

ceea ce dă legea de conservare:

$$x(t)y(t) = x_0 y_0 = C$$

ceea ce spune că curbele integrale ale lui  $X$  sunt hiperbole echilatre:  $xy = C$ .

**S14.6 .**

**Rezolvare .**

**S14.7 .**

**Rezolvare .**

# Bibliografie

- [1] M. Abate; F. Tovena, *Curves and Surfaces*, Springer, 2012.
- [2] M. Anastasiei; M. Crâșmăreanu, *Lectures on geometry (Curves and surfaces)* (in Romanian), 200 p., Ed. Tehnopress, Iași. 2005.
- [3] M. Crâșmăreanu, *Curves and surfaces: Problem Book* (in Romanian), 101 p., Ed. Cermi, Iași, 2003.
- [4] A. Fédenko et coll., *Recueil d'exercices de géométrie différentielle*, Mir, Moscou, 1982.
- [5] S. Montiel; A. Ros, *Curves and Surfaces*, Graduate Studies in Mathematics vol. 69, A.M.S., 2005.
- [6] V. Rovenski, *Modeling of curves and surfaces with MATLAB®*, Springer, 2010.

# Index

- aplicația Gauss a unei suprafețe, 57
- aria și volumul sferei, 54
- aria unui compact pe o suprafață, 50
- astroida, 5
- atlas, 32
  
- banda lui Möbius, 37
- banda lui Möbius, parametrizarea, 67
- bază Frenet pentru o curbă, 10
- bază ortogonală, 43
- bază ortonormată, 10, 43
- baza canonică din  $\mathbb{R}^n$ , 10
  
- câmp covariant constant, 75
- câmp scalar pe o suprafață, 69
- câmp tensorial de tip  $(0, 2)$  pe o suprafață, 46
- câmp vectorial covariant constant, 97
- câmp vectorial de-a lungul unei curbe, 9, 98
- câmp vectorial normal la o suprafață, 37
- câmp vectorial paralel, 97
- câmp vectorial pe o suprafață, 70
- câmp vectorial tangent la o suprafață, 37
- câmpul vectorial binormal, 13
- câmpul vectorial normal la curbe în plan, 11
- câmpul vectorial tangent al cercului, 9
- câmpul vectorial tangent al unei curbe, 9
- cardioida, 17
- catenoidul, 61
- cercul unitate, 2
- cicloida, 5
- cilindru generalizat, 34
- cilindrul circular drept, 60
- coeficienții locali ai unei conexiuni, 99
- con generalizat, 34
- conexiune liniară, 97
- conexiune liniară plată, 104
- conexiune liniară simetrică, 102
- conexiunea Levi-Civita, 70
- conexiunea liniară euclidiană, 97
  
- conul circular, 61
- convenția de notare a matricilor, 10
- coordonate locale pe o suprafață, 32
- criteriu de orientabilitate a suprafețelor, 37
- croșetul Lie, 72
- curbă, 1
- curbă în poziție generală, 10
- curbă în plan, 2
- curbă în spațiu, 2
- curbă biregulată, 10
- curbă Frenet, 10
- curbă parametrică, 1
- curbă parametrizată canonic, 3
- curbă parametrizată unitar, 3
- curbă plană, 2
- curbă regulată, 3
- curba directoare a unei suprafețe riglate, 34
- curbe în plan în coordonate polare, 6
- curbe coordonate pe o suprafață, 32
- curbe parametrizate echivalente, 2
- curbura în coordonate polare, 16
- curbura astroidei, 16
- curbura cicloidei, 15
- curbura curbelor implicite, 16
- curbura elipsei, 14
- curbura geodezică, 86
- curbura graficelor, 16
- curbura hiperbolei, 15
- curbura lemniscatei, 16
- curbura medie a unei suprafețe, 64
- curbura normală a unei suprafețe, 63
- curbura spiralei logaritmice, 16
- curbura totală a unei suprafețe, 64
- curbura unei conexiuni liniare, 104
- curbura unei curbe în plan, 12
- curburile principale ale unei suprafețe, 63
- curburile unei curbe în  $\mathbb{R}^n$ , 11
  
- derivata covariantă indusă de o conexiune, 98

- derivata covariantă pe o suprafață, 70  
 derivata direcțională a unui câmp scalar, 69  
 derivata direcțională a unui câmp vectorial, 70  
 difeomorfism între intervale reale, 2  
 difeomorfism între suprafețe, 52  
 diferențiala unei aplicații între varietăți, 52  
 diferențiala unei aplicații netede, 35  
 direcțiile principale ale unei suprafețe, 64  
 distanța euclidiană, 19  
 ecuația explicită a unei suprafețe, 32  
 ecuația Gauss, 78  
 ecuația implicită a unei suprafețe, 38  
 ecuația Laplace pe o suprafață, 75  
 ecuația parametrică a unei curbe, 1  
 ecuațiile Codazzi, 78  
 ecuațiile Darboux, 86  
 ecuațiile Frenet, 25  
 ecuațiile fundamentale ale teoriei suprafețelor, 78  
 elice generalizată, 27  
 elice relativ la o direcție, 26  
 elicea circulară, 21  
 elicoidul, 46  
 elipsoidul, 47  
 expresia câmpului vectorial normal la o curbă în plan, 12  
 formă biliniară, 43  
 formă pozitiv definită, 43  
 formă simetrică, 43  
 forma a II-a fundamentală, 58  
 forma I-a fundamentală, 44  
 formula Gauss, 70  
 formula schimbării de variabilă în integrale, 4  
 formula Weingarten, 77  
 formule Ricci de comutare, 107  
 formulele fundamentale ale teoriei suprafețelor, 77  
 funcție armonică pe o suprafață, 75  
 funcție netedă între suprafețe, 51  
 funcție netedă pe o suprafață, 69  
 generatoarea unei suprafețe riglate, 34  
 geodezică pe o suprafață, 89  
 geometria euclidiană  $n$ -dimensională, 19  
 geometria intrinsecă a unei suprafețe, 49  
 geometria unei curbe, 2  
 geometria unei suprafețe, 32  
 gradientul unei funcții netede, 38  
 grupul izometriilor unei suprafețe, 52  
 grupul liniar general, 44  
 hartă globală, 32  
 hartă locală, 32  
 hiperboloidul cu două pânze, 47  
 hiperboloidul cu o pânză, 47  
 hiperplan, 26  
 identități Bianchi, 108  
 identitatea Lagrange a calculului vectorial, 45  
 imersie, 31  
 invariant al unei curbe, 2  
 invariantul Lancret, 26  
 izometrie, 19  
 izometrie între suprafețe, 52  
 lungimea cercului de rază oarecare, 7  
 lungimea curbilor în coordonate polare, 6  
 lungimea de arc a unei curbe, 4  
 lungimea graficului unei funcții, 5  
 lungimea unei curbe, 4  
 mărime geometrică a unei curbe, 2  
 matrice ortogonală, 20  
 matricea Jacobiană, 31  
 matricea unitate de ordin  $n$ , 43  
 metrică warped, 95  
 metrica planului ca metrică warped, 54  
 mulțime compactă, 63  
 normala la o suprafață, 37  
 normala tangențială, 85  
 operatorul shape, 57  
 operatorul Weingarten, 57  
 paraboloidul eliptic, 47  
 paraboloidul hiperbolic, 47  
 parametrizare locală, 32  
 parametrizarea canonică a cercului, 4  
 parametru natural pe o curbă, 3  
 parametru pe curbă, 1  
 parametrul canonic pe o curbă, 3  
 planele ca suprafețe, 32  
 planul osculator la o curbă, 28

- planul tangent la o suprafață, 36  
 produs scalar, 43  
 produsul scalar euclidian, 43  
 proprietate geometrică a unei curbe, 2  
 proprietate intrinsecă a unei suprafețe, 49  
 pseudosfera, 60  
 punct hiperbolic pe o suprafață, 64  
 punct critic pentru o funcție netedă, 38  
 punct eliptic pe o suprafață, 64  
 punct inflexionar al unei curbe în plan, 12  
 punct parabolic pe o suprafață, 64  
 punct planar pe o suprafață, 64  
 punct regulat al unei curbe, 3  
 punct singular al unei curbe, 3  
 punct umbilical pe o suprafață, 64
- rețea Cebîșev, 74  
 regula Einstein de sumare, 10  
 relație de echivalentă, 2  
 reparametrizarea unei curbe, 2  
 reper Frenet într-un punct al curbei, 10  
 reperul Gauss al unei suprafețe, 37  
 repreul Darboux, 85
- schimbări de hărți locale pe o varietate, 102  
 schimbare de parametru pe curbe, 2  
 sfera de rază  $R$  centrată în origine, 47  
 sfera unitate, 33  
 sfera unitate  $n$ -dimensională, 26  
 sferele ca suprafețe regulate, 39  
 simbolii Christoffel, 71  
 simbolul Kronecker, 10  
 sistem de  $n$  vectori negativ orientat, 10  
 sistem de  $n$  vectori orientat pozitiv, 10  
 sisteme de vectori contrar orientate, 10  
 sisteme de vectori la fel orientate, 10  
 spațiul euclidian  $n$ -dimensional, 19  
 spațiul tangent la o cuadrică: dedublarea, 41  
 spațiul vectorial tangent la o suprafață, 36  
 spirala logaritmică, 6  
 spirala lui Arhimede, 7  
 subspațiul vectorial generat de un sistem de vectori, 10  
 suprafață de nivel, 38  
 suprafață de rotație, 60  
 suprafață minimală, 64  
 suprafață Monge, 32  
 suprafață neorientabilă, 37  
 suprafață orientabilă, 37  
 suprafață plată, 64  
 suprafață regulată, 32  
 suprafață riglată, 34  
 suprafața Enneper, 46  
 suprafețe difeomorfe, 52
- tensor de tip  $(0, 2)$  pe un spațiu vectorial, 44  
 tensorul de curbura al unei suprafețe, 72  
 teorema de existență și unicitate a bazei Frenet, 10  
 teorema Egregium, 78  
 torsiunea geodezică, 86  
 torsiunea unei conexiuni liniare, 101  
 torul, 60  
 transport paralel indus de o conexiune, 98
- unghiul dintre două curbe pe o suprafață, 50
- vârf al unei curbe în plan, 12  
 valoare critică pentru o funcție netedă, 38  
 valoare regulată pentru o funcție netedă, 38  
 varietate paralelizabilă, 104  
 vectori și valori proprii, 64  
 vectori coliniari, 10  
 versorul normalei la o suprafață, 37